






5428/c.



Bibliothèque
du Boissier .f.





Dessiné & Gravé par F. N. Martinet, Dessinateur de M^{rs} les Ducs de la Rochefoucauld, & l'Esprit.

ORNITHOLOGIA

SIVE

SYNOPSIS METHODICA

SISTENS AVIUM DIVISIONEM IN ORDINES,
Sectiones, Genera, Species, ipsarumque Varietates.

*CUM ACCURATA CUJUSQUE SPECIEI
descriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium,
Nominibus eis ab ipsis & Nationibus impositis, Nomi-
nibusque vulgaribus.*

A D. BRISSON, Regiæ Scientiarum Academiæ Socio.

Opus Figuris æneis adornatum.

VOLUMEN II.



P A R I S I I S,

AD RIPAM AUGUSTINORUM,

Apud C. L. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam,
ad Insigne S^{ta}. Genovefæ, & S^{ti}. Joannis in Deserto.

M. DCC. LX.

CUM APPROBATIONE, ET PRIVILEGIO REGIS.

ORNITHOLOGIE

O U

M É T H O D E

CONTENANT LA DIVISION DES OISEAUX
en Ordres, Sections, Genres, Especes & leurs Variétés.

*A LAQUELLE ON A JOINT UNE DESCRIPTION
exacte de chaque Espece, avec les Citations des Auteurs
qui en ont traité, les Noms qu'ils leur ont donnés, ceux
que leur ont donnés les différentes Nations, & les Noms
vulgaires.*

Par M. BRISSON, de l'Académie Royale des Sciences.

Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce.

T O M E I I.



A P A R I S,

QUAY DES AUGUSTINS,

Chez CL. JEAN-BAPTISTE BAUCHE, Libraire, à l'Image Sainte
Geneviève & S. Jean dans le Désert.

M. DCC. LX.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.





REGNUM LE REGNE
ANIMALE. ANIMAL.

CLASSIS III. CLASSE III.

ORDO IV. ORDRE IV.

AVES LES OISEAUX

Digitis quatuor, membranis destitutis, tribus scilicet anticis, uno postico, omnibus circiter usque ad exortum discretis: cruribus ad calcaneum usque plumosis: & rostro conico-elongato donatæ.

Qui ont quatre doigts, dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon: & le bec en cone allongé.

QUONIAM hujus Ordinis Avium digitus trium anticorum medius ab exortu ad primum usque articulum cum extimo arctè cohæret (*vide Vol. I. Tab. I. fig. 3*).
Tome II.

TOUS les Oiseaux de cet Ordre ont celui du milieu des trois doigts antérieurs étroitement uni avec l'extérieur depuis son origine jusqu'à la première articulation (*voyez Tom. I. Pl. I. fig. 3*).
A

Les uns ont les plumes de la b  se du bec tourn  es en-devant & couvrant les narines : & les autres ont les plumes de la b  se du bec tourn  es en-arri  re, & laissant les narines    d  couvert. Je les divise en deux sections. Dans la premiere sont ceux dont les plumes de la b  se du bec sont tourn  es en-devant & couvrent les narines (*voyez Tom. I. Pl. V. fig. 3*), comme le *Coracias*, le *Corbeau*, la *Pie*, le *Geay*, le *Casse-noix* : & dans la seconde ceux dont les plumes de la b  se du bec sont tourn  es en-arri  re & laissent les narines    d  couvert (*voyez Tom. I. Pl. V. fig. 4, 5 & 6*), comme le *Rollier*, le *Troupiale*, l'*Oiseau-de-Paradis*.

Alia   plumis donantur ad basin rostri antrorsum incumbuntibus, naresque tegentibus : alia   plumis ad basin rostri retrorsum versis ; naribusque detectis pr  dit   sunt. In duas sectiones dividuntur. Prima continet eas quarum plum   basis rostri antrorsum incumbunt, naresque tegunt (*vide Vol. I. Tab. V. fig. 3*), ut *Coracia*, *Corvus*, *Pica*, *Garrulus*, *Nucifraga* : secunda illas quarum plum   basis rostri retrorsum vertuntur, naresque detectas relinquunt (*vide Vol. I. Tab. V. fig. 4, 5 & 6*), ut *Galgulus*, *Icterus*, *Manucodiata*.

SECTION I.

Ceux dont les plumes de la b  se du bec sont tourn  es en-devant & couvrent les narines.

IL y a dans cette section cinq genres d'Oiseaux. Les uns ont le bec un peu courb   en arc, comme le *Coracias* : d'autres ont le bec droit & dont le bout est un peu tourn   vers le bas ; & parmi ceux-ci les uns ont les plumes de la queue    peu pr  s d'  gale longueur, comme le *Corbeau* : & les autres ont les

SECTIO I.

E   quarum plum   basis rostri antrorsum incumbunt, naresque tegunt.

QUINQUE generibus Avium constituitur h  c sectio. Alia   rostro donantur parumper arcuato, ut *Coracia* : alia   rostro recto, apice deorsum inclinante ; inter quas alia   rectricibus gaudent   qualis fer   longitudinis, ut *Corvus* : alia   rectricibus intermediis multo

LES OISEAUX; *Classe III. Ordre IV.*

3

longioribus, ut *Pica*: aliæ tandem rostro recto, quarum quædam mandibulis donantur æqualibus, ut *Garulus*: quædam verò mandibulâ superiore longiore & obtusâ, ut *Nucifraga*.

rieure plus longue que l'inférieure & obtuse, comme le *Casse-noix*.

plumes du milieu de la queue beaucoup plus longues que les latérales, comme la *Pie*: d'autres enfin ont le bec tout-à-fait droit. De ces derniers les uns ont les deux mandibules égales, comme le *Geay*: & les autres ont la mandibule supé-

XIII.

Genus Coraciæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Rostrum conico-elongatum, parumper arcuatum:

Plumæ basis rostri antrorsum incumbentes, narsæ tegentes.

XIII.

Le genre du Coracias.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Le bec en cône allongé, un peu courbé en arc:

Les plumes de la base du bec tournées en-devant & couvrant les narines.

* * I. LE CORACIAS.

Voyez Pl. I. Fig. 1.

Coracia nigra ad violaceum inclinans; rectricibus nigris, superne ad viride inclinantibus; rostro, pedibusque rubris. . . .
CORACIA.

Coracia. Jonst. Avi. pag. 26. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVI.

Coracias. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 766. hujus icon satis accurata pag. 768.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Coracias , five Pyrrhacorax. *Willugh. Ornith. pag. 86. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIX.*

Coracias, Pyrrhacorax etiam dicta. *Raj. Syn. Avi. pag. 40. N°. A. 6.*

Coracias Aristotelis; Pyrrhacorax. *Charlet. Exer. pag. 75. N°. 5.*

Charlet. Onomazt. pag. 68. N°. 5.

Gracculi tertium genus. *Gesn. Avi. pag. 522, in qua icon non satis accurata.*

Gracculus Coracias , rostro & pedibus rutilis. *Gesn. icon. Avi. pag. 26 , in qua eadem icon.*

Cornix rostro , pedibusque rubris. *Klein. Avi. pag. 60. N°. 11.*

Gallorum Chouette , aut Choucas. *Bell. Obs. pag. 17.*

Chouette ou Chouca rouge. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 287 ; avec une très-mauvaise figure pag. 288.*

Choucas aux pieds & bec rouges ; Choquar ; Chouette rouge. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 70 a , dans laquelle est la même figure.*

Corneille ou Choucas de Cornouaille. *Alb. Tom. II. pag. 17 ; avec une figure assez bonne , si la queue n'étoit pas si longue , Pl. 24.*

Les Grecs l'appellent Κορακίας ; Κοράνη φοινικέρυκος. *Bel.*

Les Grecs modernes , Σκουραπολα. *Bell.*

Les Picards , CRAVE. *Bell.*

Les Italiens , SPELVIER. *Bel. Aldrov.*

Les Italiens aux environs de Belinzone , PASON. *Bel. Aldrov.*

Les Boulonnois , TACCOLA. *Bel. Aldrov. TATULA. Aldrov.*

Les Grisons , ZORL. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Vallesans , qui parlent Savoyard , CHOQUAR ou CHOUETTE. *Aldrov.*

Les Allemands , TAHA. *Gesn. STEIN-TULEN. Gesn. Aldrov.*

Les Bavares , STEIN-TAHEN. *Gesn. Aldrov.*

Les Habitans de la Comté d'Etschlandt , STEIN-KRAEE. *Gesn.*

Les Anglois , CORNISH-CHOUGH. *Willugh. Raj. Charlet. Alb. CRONWALL-KAE. Sibbald.*

On l'appelle dans la province de Cornouaille KILLEGREW. *Charlet.*

Il est un peu moins gros qu'une Corneille. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a vingt-cinq lignes de long ; sa queue cinq pouces six

Cornici paululum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quindecim pollices & tres lineas æquat , & ad extremos ungues tredecim pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque viginti quinque lineas longum est ; cauda

quinque pollices & sex lineas ; pes unum pollicem & lineas decem ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum sex lineis : laterales paulò sunt breviores ; posticus verò laterales longitudine nonnihil superat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum octo pollicum & trium linearum ; alæ verò complicatæ ad novem linearum distantiam ultra caudæ extremitatem protrahuntur. Caput, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ nigræ ad violaceum inclinantes. Alarum tectrices minores concolores. Quæ verò caudam superne & infernè obtegunt, alarumque tectrices majores nigræ sunt ad viride vergentes. Remiges superne eodem imbuuntur colore in latere exteriori tantum, in latere autem interiori, sicut & subtus in utroque latere, sunt penitus nigræ. Rectrices superne ex nigro ad viride inclinant, infernè verò sunt totaliter nigræ, absque ulla viridis mixtura. Rostrum, pedesque rubent ; ungues nigri. Habitat in *Alpibus*, unde in *museum Reaumurianum* missa ab *Eminentissimo Cardinale de Tencin*.

lignes ; son pied un pouce dix lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a deux pieds huit pouces trois lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à neuf lignes au-delà du bout de la queue. La tête, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les petites couvertures des aîles sont d'un noir tirant sur le violet. Les grandes couvertures des aîles & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un noir tirant sur le verd. Les plumes de l'aîle sont noires en-dessous ; & en-dessus elles sont noires du côté intérieur, & leur côté extérieur est d'un noir tirant sur le verd. Celles de la queue sont en-dessus de cette dernière couleur, & en-dessous elles sont tout-à-fait noires. Le bec & les pieds sont rouges ; & les ongles noirs. On le trouve sur les *Alpes*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. le Cardinal de Tencin*.

2. LE CORACIAS HUPÉ.

Coracia cristata, nigra ad viride inclinans; rectricibus subtus nigris; rostro, pedibusque rubris . . . CORACIA CRISTATA.

Corvus sylvaticus. *Gesn. Avi. pag. 351*, in qua hujus icon non satis accurata.

Gesn. icon. Avi. pag. 22, in qua eadem icon.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 270, in qua hujus icon à Gesnero mutuata.

Jonst. Avi. pag. 95. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 47.

Corvus sylvaticus Gesneri, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 306.*

Corvus Alpinus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 245.*

Corvus Alpinus, seu *Corvus sylvaticus nocturnus* Schwenckfeldii. *Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 375.*

Phalacrocorax ex Illyrio missus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 267. hujus icon non satis accurata pag. 268.*

Phalacrocorax Aldrovandi. *Jonst. Avi. pag. 95. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 47.*

Upupa montana. *Klein. Avi. pag. 111. N°. 16.*

Arquata sylvatica nigra. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IX. sp. 2.*

Corneille de bois des cantons Suisses. *Alb. Tom. III. pag. 7*; avec une figure mal coloriée Pl. 16.

Les Lorrains l'appellent CORNEILLE DE MER. *Gesn. Aldrov.*

Les Italiens, CORVO SPILATO. *Gesn. Aldrov. CORVO SPELATO. Aldrov.*

Les Italiens aux environs du Lac Majeur, CORVO MARINO. *Gesn. Aldrov.*

Les Italiens qui habitent l'Istrie, CORVO SELVATICO. *Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, ALP-RAPPE; WALD-RAPPE; NACHT-RABE. *Schwenck. WALD-RABE. Rzac. STEIN-RABE. Schwenck. Rzac.*

Les Bavares, CLAUSZ-RAPP. *Gesn. Aldrov. Willugh.*

Les Stiriens, CLAUSZ-RAPP. *Gesn. Aldrov. Willugh.*

Les Suisses, WALD-RAPP; STEIN-RAPP. *Gesn. Aldrov. Willugh. Schwenck. Alb.*

Les Polonois, KRUK LESNY; KRUK NOCNY. *Rzac.*

Les Anglois, WOOD CROW FROM SWITZERLAND. *Alb.*

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur d'une Poule. Tout son corps est couvert de plumes, qui au premier coup-d'œil paroissent noires; mais si on les examine avec plus d'attention, & sur-tout au soleil,

Magnitudine & crassitie Gallinam circiter æquat. In toto corpore pennis vestitur nigris, si eminus videas; sin propius, ad solem præsertim, cum viridi permixtæ videntur. Pennæ occipitii

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre IV.* 7

cæteris longiores sunt, & cristam retrò dependentem efformant. Remiges infernè nigræ; superne in latere interiore nigræ, in latere verò exteriori ex nigro ad viride inclinant. Rectrices superne ex nigro ad viride vergentes, subtus nigræ. Cauda non longa. Rostrum rubicundum, longiusculum: pedes obscurè rubent. In altis arcium destructarum muris nidificat. Bina aut terna ova parit. Habitat in montibus *Helvetiæ*.

élevés des anciennes tours. Il pond deux ou trois œufs pour chaque couvée. On le trouve sur les montagnes de *Suisse*.

XIV.

Genus Corvinum.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Rostrum conico-elongatum, rectum; apice deorsum inclinante:

Plumæ basis rostri antrorsum incumbentes, narsque tegentes:

Rectrices æqualis ferè longitudinis.

XIV.

Le genre du Corbeau.

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Le bec en cône allongé, droit; & son bout un peu tourné vers le bas:

Les plumes de la bête du bec tournées en-devant, & couvrant les narines:

Les plumes de la queue à peu près d'égale longueur.

** I. LE CORBEAU.

Corvus splendide niger , superne ad violaceum , infernè ad viride inclinans ; remigibus nigris , majoribus exterius ad viride , minoribus exterius ad violaceum vergentibus
CORVUS.

Corvus ater , dorso cœrulescente. *Faun. Suec. Linn. N^o. 69.*

Corvus niger , rostro crassiori. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXVI. sp. 1.*

Corvus. *Gesn. Avi. pag. 334 , in qua icon satis accurata.*

Gesn. icon. Avi. pag. 21 , in qua eadem icon.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 684. hujus icon minùs accurata pag. 694.

Jonst. Avi. pag. 23. hujus duæ icones à Gesnero & Aldrovando mutuatae Tab. XVI.

Willugh. Ornith. pag. 82. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVIII.

Raj. Syn. Avi. pag. 39. N^o. A. 1.

Charlet. Exer. pag. 75. N^o. VII.

Charlet. Onomazt. pag. 67. N^o. VII.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 244.

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 40. sp. 1.

Moehr. Avi. Gen. 6.

Corvus simpliciter. *Klein. Avi. pag. 58. N^o. 1.*

Corvus major. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 63.*

Corvus niger. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 375.*

Corvus , seu Corax. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 276.*

Corbeau. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 279 ; avec une figure peu exacte pag. 280.*

Bel. Portr. d'Ois. pag. 67 b , dans laquelle est la même figure.

Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 171.

Alb. Tom. II. pag. 13 ; avec une assez bonne figure Pl. 20.

Corbeau solitaire. *Anders. Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. pag. 85.*

Les Hébreux l'appellent OREB. *Gesn. Aldrov.*

Les Chaldéens , UREBA. *Gesn. Aldrov.*

Les Arabes , GERABIB. *Gesn. Aldrov.*

Les Grecs , Κόραξ. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Willugh. Raj. Charlet.*

Les Grecs modernes , Κόρακας. *Aldrov.*

Les Perses , CALAK. *Gesn. Aldrov.*

Les Espagnols , CUERVO. *Gesn. Aldrov.*

Les Catalans , CORP. *Barr.*

Les

Les Italiens, CORVO; CORBO. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, RAPP; RAB. *Gesn. Aldrov. RABE. Schwenck. Rzac. Frisch.*

RAPPE. *Schwenck.*

Les Bas Allemands, RAVE. *Aldrov.*

Les Saxons, KOLCK-RABEN. *Gesn. KOLK-RABEN. Aldrov. KOL-RABE. Schwenck.*

Les Flamands, RAVE. *Gesn.*

Les Illyriens, HAWRAN. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, KRUK. *Rzac.*

Les Suédois, KÖRP. *Linn.*

Les Anglois, RAVEN. *Gesn. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.*

Les Ecoffois, CORBEI. *Sibbald.*

Craffitie Caponem circiter adæquat. Ipsiꝯ longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem decem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem & septem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos duos pollices & octo lineas longum est; cauda octo pollices cum sex lineis; pes duos pollices & tres lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & undecim cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus laterales longitudine nonnihil superat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & septem pollicum; alæ verò complicatæ tres quartas longitudinis caudæ partes attingunt. Caput, partem colli superiorem,

Tome II.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Chapon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces huit lignes de long; sa queue huit pouces six lignes; son pied deux pouces trois lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce onze lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Il a trois pieds sept pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue & les petites

B

du dessus des ailes sont d'un noir brillant & tirant sur le violet. La gorge tire un peu sur le cendré. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un noir brillant & tirant sur le verd. Les grandes couvertures du dessus des ailes les plus éloignées du corps & les grandes plumes des ailes sont pareillement d'un noir brillant & tirant sur le verd, mais seulement en-dessus du côté extérieur & à leur bout; & leur côté intérieur, ainsi que le dessous, est tout-à-fait noir. Les grandes couvertures du dessus des ailes les plus proches du corps & les moyennes plumes des ailes sont en-dessus d'un noir brillant & tirant sur le violet du côté extérieur & à leur bout seulement; & leur côté intérieur, ainsi que le dessous, est tout-à-fait noir. Les plumes des ailes, depuis la première jusqu'à la dix-huitième inclusivement, se terminent en pointe. La première des plumes de l'aile est plus courte que la seconde de quatre pouces neuf lignes; la seconde est plus courte que la troisième de deux pouces six lignes; & la troisième est la plus longue de tou-

dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigrae splendentes & ad violaceum inclinales. Scapulares pennæ, quæ caudam superne tegunt, alarumque tectrices superiores minores concolores. Guttur nonnihil ad cinereum vergit. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes sunt splendide nigrae & ad viride inclinant. Alarum tectrices superiores majores à corpore remotiores, sicut & remiges majores, sunt quoque superne splendide nigrae & ad viride inclinant in latere exteriori & apice tantum; in latere verò interiori, sicut & subtus in utroque latere, nigro tantum colore tinguntur. Alarum tectrices superiores majores corpori finitimæ & remiges minores superne in latere exteriori & apice tantum ex nigro splendentes ad violaceum vergunt; in latere autem interiori & subtus in utroque latere sunt totaliter nigrae. Alarum remiges, à prima ad decimam octavam inclusivè, in acumen desinunt. Remix prima quatuor pollicum & novem linearum longitudine secundæ cedit; secunda

brevior est tertiâ duobus pollicibus & sex lineis ; tertia verò omnium longissima. Cauda constat duodecim rectricibus subtus nigris ; superne verò binæ intermediæ ex nigro ad viride inclinant ; laterales concolores , sed in latere exteriori tantum , in latere autem interiore nigrae. Rectrices binæ intermediæ lateralibus paulò sunt longiores ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur , ad utrinque extimam usque breviores. Plumulae nares cooperientes , longae sunt , strictiores & satis rigidae. Oculorum pupilla duplici ambitur circulo , exteriori scilicet cinereo-albo , & interiore cinereo-fusco. Rostrum , pedes , unguesque nigri. In altissimis arboribus & turrium destructarum muris nidificat. Quatuor , quinque & interdum sex ova unâ vice ponit. Non solum fructibus & Insectis , sed etiam cadaveribus victitat. *Ex museo Reaumuriano.*

Hujus speciei varietates sunt

tes. La queue est composée de douze plumes , toutes noires en-dessous ; & en-dessus les deux du milieu sont d'un noir tirant sur le verd ; & les latérales sont de la même couleur du côté extérieur seulement , & noires du côté intérieur. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure , qui est la plus courte. Les plumes qui couvrent les narines , sont longues , étroites & assez roides. La prunelle des yeux est entourée d'un double cercle , dont l'extérieur est d'un gris-blanc , & l'intérieur d'un cendré-brun. Le bec , les pieds & les ongles sont noirs. Il fait son nid sur les arbres les plus élevés & sur les anciennes tours ; & il pond à chaque couvée quatre , cinq & quelquefois jusqu'à six œufs. Il se nourrit non-seulement de fruits & d'insectes , mais encore de corps morts. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Les variétés de cette espece sont

A. LE CORBEAU VARIÉ.

Corvus varius.

Corvus. *Euf. Nieremb. pag. 214.*Cacalotl, seu Corvus. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 48. cap. CLXXIV.*
Les Mexiquains l'appellent CACALOTL. Fern. Nieremb.

Il ne diffère du précédent que parce qu'il a quelques plumes blanches mêlées parmi les noires. On le trouve au *Mexique*.

A præcedente non differt nisi quod candidis quibusdam pennis sit insignis. Habitat in *Mexico*.

B. LE CORBEAU BLANC.

Corvus candidus.

Corvus albus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 245.**Les Allemands l'appellent WEISSER-RABE. Schwenck.*

Il diffère de notre Corbeau par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. On le trouve en *Norvege*, en *Islande* & dans les autres pays froids, qui s'approchent le plus du pôle Arctique.

A Corvo nostrate differt colore in toto corpore candido. Habitat in *Norvegia*, *Islandia* & aliis locis frigidioribus polum Arcticum respectantibus.

** 2. LA CORNEILLE.

Corvus nigro-violaceus; remigibus nigris, superne exterius nigro-violaceis CORNIX.

Corvus subcæruleus. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXVI. sp. 2.*Corvus minor. *Charlet. Exer. pag. 75. N°. 1.**Charlet. Onomast. pag. 67. N°. 1.**Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.*Cornix. *Gesn. Avi. pag. 320. hujus icon satis accurata pag. 321.**Gesn. icon. Avi. pag. 23, in qua eadem icon.**Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 734. hujus icon minùs accurata pag. 736.**Jonst. Avi. pag. 24. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. XVI.*

- Willugh. Ornith. pag. 83. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVIII, sub titulo, Cornix nigra.*
Raj. Syn. Avi. pag. 39. N°. A. 2.
Cornix nigra. Klein. Avi. pag. 58. N°. 1.
Corneille. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 281 ; avec une mauvaise figure pag. 282.
Bel. Portr. d'Ois. pag. 68 a, dans laquelle est la même figure.
Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 171.
Corneille ordinaire. Alb. Tom. II. pag. 14 ; avec une figure passable Pl. 21.
Les Hébreux l'appellent OREB. Gesn. Aldrov.
Les Chaldéens, KURKA. Gesn. Aldrov.
Les Grecs, Κορώνη. Bel. Gesn. Aldrov. Jonst. Willugh. Raj.
Les Grecs modernes, Κερανα. Aldrov. Jonst. Κουραννα. Aldrov. Κεράνα. Jonst.
Les Polyrhéniens, Κουσα. Aldrov. Jonst.
Les Espagnols, CORNEIA. Gesn. Aldrov.
Les Catalans, GRAULA ; BUSAROCA ; CUCALA. Barr.
Les Italiens, CORNICE ; CORNACCHIA ; GRACCHIA. Bel. Gesn. Aldrov.
CORNACCHIO. Gesn. Aldrov.
Les Allemands, KRAEE ; HAUSS-KRAEE ; SCHWARTZ-KRAEE. Gesn. Aldrov. KRAEYE ; KRAHE. Gesn. KRAH. Aldrov.
Les Illyriens, WRANA. Gesn. Aldrov.
Les Anglois, CROW. Gesn. Aldrov. Willugh. Alb. COMMON-CROW. Willugh. Raj. CARRION-CROW. Raj. Sibbald. Charlet.

Corvi multò crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & sex pollices æquat, & ad extremos ungues quindecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque viginti quinque lineas longum est ; cauda septem pollices & sex lineas ; pes duos pollices cum tribus lineis ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas : laterales

Elle est beaucoup moins grosse que le Corbeau. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix-huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces & une ligne de long ; sa queue sept pouces six lignes ; son pied deux pouces trois lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui

de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Elle a trois pieds de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un noir-violet. Celles des aîles sont noires en-dessous, & en-dessus du côté intérieur seulement, & leur côté extérieur est d'un noir-violet. Les plumes de la queue sont en-dessus de cette dernière couleur, & en-dessous elles sont noires. La première des plumes de l'aîle est plus courte que la seconde ; la seconde l'est plus que la troisième ; & la troisième plus que la quatrième, qui est la plus longue de toutes. L'iris des yeux est couleur de noisette. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve dans les forêts, desquelles elle sort quelquefois pour venir dans les plaines. Elle fait son nid à la tête des plus grands arbres ; & pond quatre ou cinq œufs. Comme le *Corbeau*, elle se nourrit de fruits, de vers, d'insectes & de corps morts. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Les variétés de cette espece sont

paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. In universo corpore vestitur pennis nigro - violaceis. Remiges sunt subtus nigræ, superne verò in latere interiore nigræ, & in latere exteriori nigro-violaceæ. Rectrices superne eodem imbuuntur nigro-violaceo, infernè verò sunt totaliter nigræ. Remix prima brevior est secundâ ; secunda brevior tertiâ ; tertia brevior quartâ ; quarta verò omnium longissima. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitant in sylvis, quas interdum deferunt, & in planitiem conveniunt. In arborum altissimarum cacumine nidificant ; quatuor aut quinque ova unâ vice ponunt. Fructibus vermibus, Insectis & cadaveribus vescuntur, non secùs ac *Corvus*. *Ex museo Realmuriano.*

Hujus speciei varietates sunt

A. LA CORNEILLE VARIÉE.

Cornix varia.

Cornix varia. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 66.*

Corvus vericolor Feroensis. *Mus. Worm. pag. 292.*

Les Allemands l'appellent BUNTE KRAEHE ou SCHECKIGE KRAEHE.
Frisch.

Formâ , magnitudine , partim quoque colore cum præcedente convenit: ab illa tantum discrepat infimâ genarum parte, gutture, collo inferiore, medio ventre & remigibus majoribus albis. Plumularum quoque nares tegentium maxima pars albet. Aliæ diverso modo variegantur; uropygio enim & imo ventre donantur albis. Cauda etiam rectricibus constat alternatim albis & nigris.

Elle ressemble à la précédente par sa forme, sa grandeur, & en partie par sa couleur: elle en diffère seulement en ce qu'elle a le bas des joues, la gorge, la partie inférieure du col, le milieu du ventre & les grandes plumes des ailes blanches. La plus grande partie des plumes qui couvrent les narines, est aussi de cette couleur. D'autres sont différemment variées, & ont le croupion & le bas-ventre blancs. La queue est aussi variée de plumes alternativement blanches & noires.

* * B. LA CORNEILLE BLANCHE.

Cornix candida.

Cornix candida. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 243.*

Les Allemands l'appellent WEISSE KRAHE. *Schwenck.*

A Cornice differt colore in universo corpore albo. Rostrum, pedes & ungues albedine quoque tinguntur.

Elle diffère de la Corneille par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. Le bec, les pieds & les ongles sont pareillement blancs.

** 3. LA CORNEILLE MOISSONNEUSE.

Corvus nigro-violaceus; remigibus majoribus nigris, superne ad viride inclinantibus *CORNIX FRUGILEGA*.

Corvus ater. *Faun. Suec. Linn. N°.* 70.

Corvus calvus nigricans. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXVI. sp.* 3.

Corvus spermologus frugivorus. *Charlet. Exer. pag.* 75. *N°.* 4.

Charlet. Onomast. pag. 67. *N°.* 4.

Spermologus frugivorus. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag.* 15.

Cornix frugivora. *Gesn. Avi. pag.* 332.

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 751. *hujus icon à Bellonio mutuata pag.* 753.

Jonst. Avi. pag. 25. *hujus icon à Bellonio mutuata Tab. XVII, sub titulo, Cornix frugilega.*

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 40 sp. 2.

Cornix frugivora, seu frugilega. *Willugh. Ornith. pag.* 84. *hujus icon à Bellonio mutuata Tab. XVIII.*

Cornix frugilega. *Raj. Syn. Avi. pag.* 39. *N°.* A. 3.

Cornix nigra, frugilega. *Klein. Avi. pag.* 59. *N°.* 3.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 242.

Cornix nigra. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 276.

Cornix nigra, seu Cornix frugivora Aldrovandi; Cocis Alberti. *Rzac.*

Auct. Hist. nat. Pol. pag. 374.

Cornix nigra, five Corvus minor. *Frisch. hujus icon accurata Tab.* 64.

Graye; Grolle ou Freux. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 283; *dans laquelle il y a une figure passable.*

Graye; Grolle; Freux. Bel. Portr. d'Ois. pag. 68 b, *dans laquelle est la même figure.*

Grolle. Alb. Tom. II. pag. 15; *avec une figure peu exacte Pl.* 22.

Les Grecs l'appellent Σπερμολόγος. Bel. Gesn. Aldrov. Jonst. Σπερματολόγος.

Aldrov. Κορώνη σπερμολόγος, Κορώνη σπερματολόγος. Schwenck.

Les Catalans, CORP CALVO. Barr.

Les Allemands, ROECH. Gesn. ROUCH. Aldrov Schwenck. ROOCHE;

SCHWARTZE KRAYE. Schwenck. SCHWARTZE KRAEHE. Rzac. Frisch.

KRAHE. Rzac.

Les Silésiens, ROOCKE. Schwenck.

Les Flamands, ROECK. Aldrov.

Les Hollandois, KOORE-KRAEY. Aldrov.

Les Polonois, GAWRON. Rzac.

Les Oelandois, ROKA. Linn.

Les Anglois, ROOK. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.

Elle est un peu plus grosse que la *Cornelle ordinaire*. *Crassitie Cornicem vulga-*
rem nonnihil antecellit. Ip-
sus

fius longitudo ab apice rostri ad extremam caudam unum pedem quinque pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis quindecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos duos pollices & tres lineas longum est; cauda sex pollices & octo lineas; pes unum pollicem cum undecim lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus laterales nonnihil longitudine superat. Alis extensis, extremitates majorum remigum duorum pedum & undecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput, collum, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, alarum tectrices superiores minores & pennæ caudam superne cooperientes sunt splendidissimè nigro-violacæ. Pectus, venter, latera, crura, tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus vestientes concolores, sed non ita splendide. Alarum tectrices superiores majores à corpore remotiores ex nigro-violaceo ad viride paululùm

Tome II.

longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; sa queue six pouces huit lignes; son pied un pouce onze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a deux pieds onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les petites couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un noir-violet très-brillant. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont de la même couleur, mais moins éclatante. Les grandes couvertures du dessus des aîles les plus éloignées du corps sont d'un noir-violet tirant un peu sur le verd; & les plus proches du corps, ainsi que les moyennes plumes

C

des aîles, sont du même noir-violet que le dos. Les grandes plumes des aîles sont en-dessus d'un noir tirant sur le verd, & en-dessous elles sont tout-à-fait noires. La première des plumes de l'aîle est plus courte de quatre pouces trois lignes que la quatrième, qui est la plus longue de toutes : les moyennes se terminent en pointe. La queue est composée de douze plumes toutes noires en-dessous ; & en-dessus les deux du milieu sont d'un noir tirant sur le violet : les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & d'un noir tirant sur le verd du côté intérieur. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la moins longue de toutes. Lorsqu'elle est un peu avancée en âge, les plumes qui entourent le bec, depuis les narines jusqu'aux yeux, sont arrachées, & cela à cause des frottemens réitérés que le bec éprouve, lorsqu'elle l'enfonce profondément en terre, pour en tirer les vers. Cette partie dégarnie de plumes, paroît couverte d'une matière blanche & farineuse. L'iris des yeux est bleuâtre. Le bec, les

vergunt ; corpori verò finitimæ, sicut & remiges minores, dorso sunt concolores. Remiges majores superne ex nigro ad viride inclinant, infernè sunt totaliter nigræ, absque ulla viridis mixtura. Remix quarta omnium est longissima, & remigum primam quatuor pollicum & trium linearum longitudine excedit. Remiges minores in acumen desinunt. Cauda duodecim constat re-
 ctricibus subtus nigris ; superne verò binæ intermediæ ex nigro ad violaceum inclinant : laterales in latere exteriori concolores, in latere autem interiore ex nigro ad viride vergunt. Rectrices binæ intermediæ lateralibus paulò sunt longiores ; laterales gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. In ætate provec-tioribus circa basin rostri, à naribus usque ad oculos, plumæ abrasæ sunt crebro rostri ad terram attritu, dum in eam illud profundius intrudit, ad lumbricos extrahendos. Pars autem illa, plumis destituta, albicante & furfuraceâ materiâ obsita videtur. Oculorum irides cœrulescentes, Rostrum, pedes, unguesque nigri. Frugibus & lumbricis

vicitat. Gregatim volat; & in altissimarum arborum cacumine nidificat. *Ex museo Realmuriano.* pieds & les ongles sont noirs. Elle se nourrit de fruits & de vers de terre. Elle vole par troupes, & fait son nid au sommet des plus grands arbres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

* * 4. LA CORNEILLE MANTELÉE.

Corvus cinereus; capite & collo inferiore nigris, ad violaceum & viride vergentibus; remigibus majoribus nigris, superne ad viride inclinantibus CORNIX CINEREA.

Corvus capite, gulâ, alis, caudâque nigris, trunco cinerascens. *Faun. Suec. Linn. N°. 71.*

Corvus semicinereus. *Charlet. Exer. pag. 75. N°. 2.*

Charlet. Onomazt. pag. 67. N°. 2.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Corvus cinereus. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXVI. sp. 4.*

Cornix varia, marina, hyberna. *Gesfn. Avi. pag. 332, in qua icon non satis accurata.*

Cornix varia, vel cinerea, marina, hyberna, apud Recentiores. *Gesfn. icon. Avi. pag. 22, in qua eadem icon.*

Cornix cinerea. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 754. hujus icon pessima pag. 755.*

Jonst. Avi. pag. 25. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVII; & altera icon à Gesnero mutuata Tab. XVI; sub titulo, Nebel Krae.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 241.

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 40. sp. 3.

Klein. Avi. pag. 59. N°. 2.

Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 374.

Cornix cinerea frugilega. *Willugh. Ornith. pag. 84. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVIII, & altera icon non satis accurata Tab. LXXVII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 39. N°. A. 4.

Cornix cinerea vel varia. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 276.*

Cornix, sive corvus cinereus. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 65.*

Cornix aquatica. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.*

Corneille emmantelée. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 284; avec une mauvaise figure pag. 285.*

Corneille emmantelée; Corneille sauvage. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 69 a, dans laquelle est la même figure.*

Corneille cendrée de Royston. *Alb. Tom. II. pag. 16 ; avec une figure mal coloriée Pl. 23.*

Les Grecs l'appellent Κερών αποδοειδης. Schwenck. Aldrov.

Les Italiens, MULACCHIA ; MUNACCHIA. Bel. Gesn. Aldrov. MONACCHIA. Aldrov.

Les Allemands, NAEBEL-KRAEE. Gesn. Aldrov. NEBEL-KRAEHE. Rzac. Frisch. NABEL-KRAYE. Schwenck. ASS-KRAEE. Gesn. GRAVE-KRAEHE. Frisch.

Les Bas Allemands, BUNDTE-KRAEE, ou PUNDTER-KRAEE. Gesn.

Les Silésiens, SCHILT-KRAEE. Gesn. Aldrov. SCHILT-KRAHE. Schwenck.

Les Flamands, BONTE-KRAEY ; WINTER-KRAEY. Aldrov. WINTER-KRAHE. Schwenck.

Les Polonois, WRONA. Rzac.

Les Suédois, KRAOKA. Linn.

Les Anglois, ROYSTON-CROW. Willugh. Raj. Charlet. Alb. & quelques-uns, SEA-CROW. Raj.

Les Ecoissois, HOODED-CROW. Sibbald.

Elle est à peu près de la grosseur de la *Corneille ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied trois pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces de long ; sa queue sept pouces ; son pied deux pouces ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes : les latéraux sont beaucoup plus courts ; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a deux pieds onze pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La

Craffitie Cornicem vulgarem circiter adæquat. Iplius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem quinque pollices & decem lineas explet, & ad extremos unguis unum pedem tres pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos duos pollices longum est ; cauda septem pollices ; pes duos pollices ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas : laterales multò sunt breviores ; & posticus laterales nonnihil longitudine superat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum undecim pollicum & sex linea-

rum ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput, guttur & partem colli inferiorem vestiunt pennæ nigrae splendentes, ad violaceum & viride vergentes. Pars colli superior, dorsum, uropygium & scapulares pennæ cineræ, & quibusdam minutis maculis nigris variegatæ. Pennæ pectus, ventrem & latera vestientes sunt cineræ, & unaquæque lineâ donatur nigrâ, secundum ipsius scapi longitudinem ductâ. Crura nigra sunt. Tectrices caudæ superiores ex nigro ad violaceum & viride inclinant, marginibusque donantur cinereis : inferiores ex cinereo & saturatè fusco variegantur. Alarum tectrices superiores minores, & majores corpori finitimæ sunt nigro-violacæ splendentes ; majores à corpore remotiores in latere exteriori & apice ex nigro ad violaceum & viride vergunt, in latere verò interiore omnino nigrae. Quæ alas subtus cooperiunt pennæ minores nigrae ad violaceum inclinantes ; majores saturatè fusca. Alarum remiges omnes subtus nigrae ; superne verò majores ex nigro ad viride inclinantes, & minores in

tête, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un noir brillant & tirant sur le violet & le verd. La partie supérieure du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont cendrées, & variées de quelques petites taches noires. La poitrine, le ventre & les côtés sont couverts de plumes cendrées, ayant chacune une ligne noire, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les jambes sont noires. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir tirant sur le violet & le verd, & leurs bords sont cendrés : celles du dessous de la queue sont variées de cendré & de brun foncé. Les petites couvertures du dessus de l'aile, & les grandes les plus proches du corps sont d'un noir-violet fort brillant : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un noir tirant sur le violet & le verd du côté extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est tout-à-fait noir. Les petites couvertures du dessous de l'aile sont d'un noir tirant sur le violet ; & les grandes sont d'un brun foncé. Les plumes des ailes sont toutes noires en-dessous ; & en-dessus les grandes sont d'un noir tirant sur le verd, & les moyennes sont d'un noir-violet & brillant du côté extérieur & à leur bout, & leur

côté intérieur est tout-à-fait noir, & sans mélange d'autre couleur. Les plumes de l'aile, depuis la sixième inclusive-ment jusqu'à la plus proche du corps, se terminent en pointe. La première est plus courte de quatre pouces trois lignes que la troisième & la quatrième, qui sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un noir tirant sur le violet & le verd en-dessus, & tout-à-fait noires en-dessous. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés, jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la moins longue. Les plumes qui retombent sur le bec & qui couvrent les narines, sont noires, longues, étroites & roides. L'iris des yeux est d'un cendré tirant sur la couleur de noisette. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. Pendant l'été elle habite les hautes montagnes, & y fait son nid; & l'hiver elle descend dans les plaines. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

latere exteriori & apice nigro-violaceæ splendentes, in latere interiore totaliter nigrae, absque ulla alterius coloris mixtura. Remiges à sexta ad corpori finitimam usque inclusivè, in acumen desinunt. Remiges tertia & quarta sunt omnium longissimæ, & primam quatuor pollicum & trium linearum longitudine excedunt. Cauda duodecim constat rectricibus superne ex nigro ad violaceum & viride vergentibus, subtus verò nigris. Rectrices binæ intermediae lateralibus paulò sunt longiores; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Pennæ rostro incumbentes, naresque tegentes, nigrae sunt, longæ, strictiores & rigidæ. Oculorum irides sunt cinereo-avellaneæ. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Æstate in altissimis montibus habitat & nidificat; per hyemem verò in planitiem descendit. *Ex museo Reaumuriano.*

5. LA CORNEILLE DE LA JAMAÏQUE.

Corvus in toto corpore niger CORNIX JAMAICENSIS.

Corvus garrulus ater. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 473.*

Cornix nigra garrula. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 298. N°. XIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 181. N°. 9.

Cornix nigra garrula Raji, naribus amplis. *Klein. Avi. pag. 59. N^o. 5.*

Les Anglois de la Jamaïque l'appellent GABELING CROW. Browne. CHATTERING CROW ou CACAO-WALK. Sloane. Raj.

Cornicem vulgarem crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & sex pollices explet, & ad extremos ungues sexdecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & sex lineas longum est; cauda quinque pollices; pes unum pollicem & novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales paululùm longitudine excedit. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. In universo corpore pennis vestitur nigris: remiges & rectrices eodem imbuuntur colore. Rostrum, pedes, unguesque similiter nigri. Perpetuò garrit; vox autem ipsa discrepat à voce nostratum *Cornicum* Europeanum. *Baccis* victitat, sicut

Elle est à peu près de la grosseur de la *Corneille ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied six pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied quatre pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce six lignes de long; sa queue cinq pouces; son pied un pouce neuf lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a trois pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes noires: celles des aîles & de la queue sont de la même couleur. Le bec, les pieds & les ongles sont pareillement noirs. Elle babille continuellement, & le bruit qu'elle fait est différent de celui de nos *Corneilles* d'Europe. Elle se nourrit de *Bayes* & de *Scarabés*. On la trouve à la *Jamaïque*, surtout du côté

septentrional de l'Isle, où elle habite les montagnes.

& *Scarabæis*. Habitat in *Jamaica*, præsertim in Insulæ septentrionali parte, cujus montes incolit.

** 6. LE CHOUCAS.

Corvus superne niger ad violaceum inclinans, infernè dilutè niger; occipitio & collo superiore ad cinereum tendentibus; rectricibus nigris, superiùs ad viride inclinantibus
MONEDULA.

Corvus fronte nigrâ; occipite incano, corpore fusco, alis caudâque nigris. *Faun. Suec. Linn. N°.* 72.

Gracculus vel Monedula. *Gesn. Avi. pag.* 520. *hujus icon non satis accurata pag.* 521.

Gracculus; Monedula. *Gesn. icon. Avi. pag.* 24, in qua eadem icon.

Graculus seu Monedula. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag.* 15.

Lupus, sive Monedula. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag.* 770. *hujus icon pessima pag.* 771.

Monedula. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 305.

Jonst. Avi. pag. 26. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVI, sub titulo, Pyrrhocorax alius.*

Charlet. Exer. pag. 75. *N°.* 6.

Charlet. Onomast. pag. 68. *N°.* 6.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 288.

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 40. sp. 5.

Frisch. hujus icon accurata Tab. 67.

Monedula, sive Lupus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 85. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 40. *N°.* A. 5.

Monedula Gesneri; Gracus Varronis; Graculus Festi. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag.* 395.

Cornix garrula. *Klein. Avi. pag.* 59. *N°.* 4.

Lycos Aristotelis. *Gesn.*

Choucas ou Corneille apprivoisée. *Alb. Tom. I. pag.* 13; avec une figure mal coloriée *Pl.* 14.

Petite Chouchette; Chouca ou Chouette. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag.* 286, dans laquelle il y a une très-mauvaise figure.

Chucas, Chouca; Chouette; Chouchette. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 69 b, dans laquelle est la même figure.

Les Hébreux l'appellent ANAPHA. *Aldrov.*

Les

- Les Grecs*, Λύκος. Bel. Schwenck. Aldrov. Jonst. Willugh. Κολοίς. Bel. Schwenck. Aldrov. Willugh. Βωρολόχος. Schwenck.
- Les Turcs*, TSCHAUKA. Gefn. Aldrov.
- Les Espagnols*, GRAIO ou GRAIA. Gefn. Aldrov.
- Les Italiens*, CIAGULA; TATULA; TACCOLA; CUTTA; POLA. Bel. Gefn. Aldrov. MONACCHIA. Aldrov.
- Les Grisons*, BEENA. Gefn.
- Les Savoyards*, CHUE. Aldrov.
- Les Allemands*, TUL; TAHE; TALHE; DALE; DOLE; DOEL. Gefn. Aldrov. TULE; TOLE. Schwenck. THALE. Schwenck. Rzac. DOHLE. Rzac. GRAVE DOHLE. Frisch.
- Les Saxons*, AELKE. Gefn. Aldrov. Rzac. AELCKE. Schwenck. KAEYKE. Gefn. Aldrov. KAYCKE; GACKE. Gefn.
- Les Bas Saxons aux environs de Rostock*, WACHTEL. Gefn. Aldrov.
- Les Suisses*, GRAACKE. Gefn.
- Les Hollandois*, KA; KAW; CAU; CHAU. Gefn. Aldrov.
- Les Brabançons*, KA; KAW; CAU; CHAU. Gefn. Aldrov.
- Les Zélandois*, KA; KAW; CAU; CHAU. Gefn. Aldrov.
- Les Frisons*, KA; KAW; CAU; CHAU. Gefn. Aldrov.
- Les Illyriens*, KAWKA. Gefn. Aldrov.
- Les Polonois*, KAWKA; KAWA. Rzac. ZEGZOLKA. Gefn. Aldrov.
- Les Flamands*, GAey; HANNEKIN. Gefn. Aldrov.
- Les Suédois*, KAJA. Linn.
- Les Anglois*, JACK-DAW. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb. DAW. Charlet. KAE. Sibbald.

Ad *Columbæ* crassitiem circiter accedit. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri ad cau-
dam extremam tredecim pol-
lices & tres lineas æquat, &
ad extremos ungues duode-
cim pollices & sex lineas.
Rostrum ab ipsius apice ad
oris angulos sexdecim lineas
longum est; cauda quinque
pollices; pes unum pollicem
& octo lineas; & trium di-
gitorum anticorum medius
cum ungue unum pollicem
cum quinque & semi lineis:

Tome II.

Il est à peu près de la gros-
seur d'un *Pigeon*. Sa longueur
depuis le bout du bec jusqu'à
celui de la queue est de treize
pouces trois lignes, & jusqu'à
celui des ongles de douze pou-
ces six lignes. Son bec depuis
son bout jusqu'aux coins de la
bouche a seize lignes de long;
sa queue cinq pouces; son pied
un pouce huit lignes; & celui
du milieu des trois doigts anté-
rieurs, joint avec l'ongle, un
pouce cinq lignes & demie:
les latéraux sont un peu plus

D

courts ; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Il a deux pieds deux pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à neuf lignes du bout de la queue. Le sommet de la tête est d'un noir changeant en violet. L'occiput & la partie supérieure du col tirent sur le cendré. Le dos , le croupion , les couvertures du dessus & du dessous des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un noir changeant en violet. La gorge est noire ; & chaque plume a une ligne blanchâtre , qui s'étend selon la longueur de sa tige. La partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un noir clair. Les grandes plumes de l'aîle sont noires en-dessous ; & en-dessus elles sont noires du côté intérieur seulement , & leur côté extérieur est d'un noir tirant sur le verd : les moyennes sont en-dessus d'un noir changeant en violet , & en-dessous elles sont noires. La première des plumes de l'aîle est très-courte : la troisième & la quatrième sont les plus longues. Celles de la queue sont aussi noires en-dessous ; & en-dessus elles sont d'un noir tirant sur

laterales paulò sunt breviores ; posticus autem laterales paululùm longitudine superat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & totidem pollicum ; alæ verò complicatæ caudam extremam , novem linearum intervallo excepto , pertinent. Capitis verticem vestiunt pennæ nigræ , ad violaceum inclinantes. Occipitium & collum superius ad cinereum tendunt. Dorsum , uropygium , alarum teñtrices superiores & inferiores & pennæ caudam superne tegentes ex nigro ad violaceum vergunt. Guttur nigricat ; unaquæque tamen penna lineâ donatur albidâ , secundùm ipsius scapi longitudinem ductâ. Pars colli inferior , pectus , venter , latera , crura & teñtrices caudæ inferiores sunt dilutè nigræ. Remiges majores subtus nigræ ; superne verò in latere exteriori ex nigro ad viride vergentes , in latere interiori penitus nigræ : minores superne ex nigro ad violaceum vergunt , infernè nigricant. Remix prima brevissima est ; tertia & quarta omnium longissimæ. Rectrices nigræ , superius ad

viride inclinantes. Oculorum irides albidæ. Rostrum, pedes, unguisque nigri. Turres altissimas urbium & pagorum frequentant, sicut & arces ruinosas & muros antiquos, in quorum foraminibus nidificant. Quinque, sexve ova unâ vice ponunt. *Ex museo Realmuriano.*

le verd. L'iris des yeux est blanchâtre. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. Ils habitent les tours les plus élevées des villes & des villages, ainsi que les vieux châteaux & les vieux murs, dans les tours desquels ils font leurs nids. Ils pondent cinq ou six œufs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Hujus speciei varietates sunt

Les variétés de cette espece sont

A. LE CHOUCAS A COLLIER.

Monedula torquata.

Monedula torquata. Charlet. Exer. pag. 75. N°. 7.

Charlet. Onomast. pag. 68. N°. 7.

Monedula altera. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 775. hujus icon satis accurata pag. 774.

Aliud Monedulæ genus. Jonst. Avi. pag. 26. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVI, sub titulo, Graculus.

Les Anglois l'appellent HELVETIAN DAW. Charlet.

In omnibus cum præcedente convenit, præterquam quod collum habeat albo torque circumdatum. In *Helvetia* invenitur.

Il ne diffère du précédent que parce qu'il a un collier blanc, qui lui entoure le col. Du reste il lui ressemble en tout. On le trouve en *Suisse*.

B. LE CHOUCAS BLANC.

Monedula candida.

Monedula candida. Schwenck. Avi. Sil. pag. 305.

Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 396.

Les Allemands l'appellent WEISSE TALE. Schwenck.

A *Monedula vulgari* dif-

Il diffère du *Choucas ordi-*
Dij

naire par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. Son bec est jaunâtre.

fert colore in toto corpore albo. Rostrum subflavescit.

** 7. LE CHOUCAS NOIR.

Corvus splendidè niger; punctulis albis oculos ambientibus
 MONEDULA NIGRA.

Monedula nigra; Spermologus, sive Frugilega. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 68.*

Cornix. *Charlet. Exer. pag. 75. N°. 3.*

Charlet. Onomazt. pag. 67. N°. 3.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Les Allemands l'appellent SCHWARTZE DOHLE. Frisch.

Les Anglois, CHOUGH. Charlet. Sibbald.

Il est un peu plus petit que le *Choucas ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue quatre pouces neuf lignes; son pied un pouce six lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a un pied dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes

Monedula vulgaris paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudam extremam duodecim pollices & sex lineas æquat; & ad extremos ungues undecim pollices cum novem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuordecim lineas longum est; cauda quatuor pollices & novem lineas; pes octodecim cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales nonnihil longitudine excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & decem pollicum; alæ verò complicatæ

ad tres quartas longitudinis caudæ partes protenduntur. Per univèrsum corpus vestitur pennis nigris, splendèntibus, in ventre tamen dilutioribus. Remiges majores superne in latere exteriorè tantùm concolores; in latere verò interiorè, sicut & subtus in utroque latere, non ita splendentì nigrore tinguntur: minores superne nigræ splendentes, infernè obscurè nigræ. Remix prima brevissima est; quarta omnium longissima. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. In utroque capitatis latere, versùs aures, macula extat lunulata, saturatissimâ nigredine tincta, cujus pars concava oculos spectat. Pennæ nares tegentes longæ sunt, strictiores & rigidæ. Punctula alba oculos ambiunt: oculorum autem pupilla nigra, & ipsorum irides cœrulescentes. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Turrium destructarum muros frequentat, in quarum foraminibus nidificat. *Ex museo Realmuriano.*

d'un noir brillant, plus clair cependant sur le ventre qu'ailleurs. Les grandes plumes des ailes sont en-dessus de la même couleur du côté extérieur seulement; leur côté intérieur, ainsi que tout le dessous, est d'un noir moins éclatant: les moyennes sont en-dessus du même noir brillant, & en-dessous d'un noir mat. La première des plumes de l'aile est très-courte: la quatrième est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aile. Il y a de chaque côté de la tête, vers les oreilles, une tache en croissant, d'un noir très-foncé, & dont la partie concave est tournée vers les yeux. Les plumes qui couvrent les narines, sont longues, étroites & roides. Les yeux sont entourés de petits points blancs: leur prunelle est noire, & leur iris est bleuâtre. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. Il habite les vieilles tours, dans les trous desquelles il fait son nid. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 8. LE CHOUCAS DES ALPES.

Voyez Pl. I. Fig. 2.

Corvus nigricans ; rostro luteo PYRRHOCORAX.

*Pyrrhocorax. Gesn. Avi. pag. 527, in qua icon non satis accurata.**Gesn. icon. Avi. pag. 23, in qua eadem icon.**Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 769, in qua icon minimè accurata.**Jonst. Avi. pag. 26. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVI ; &**altera icon à Gesnero mutuata eâdem Tab. sub titulo, Alt rap.**Les Grecs l'appellent Πυρροκοράξ. Aldrov.**Les Italiens, SPELVIER. Gesn.**Les Italiens aux environs de Belinzona, PASON. Gesn.**Les Italiens aux environs de Veronne, TACCOLA. Gesn.**Les Grisons, ZORL ; BEENA ; TAHA. Gesn. TAHEN. Aldrov.**Les Vallesans, qui parlent Savoyard, CHOQUAR ou CHOUETTE. Gesn.**Les Vallesans, qui parlent Allemand, ALP-RAPP. Gesn. Aldrov.**Les Allemands, BERG-DOEL ; BERG-TUL ; STEIN-HETZ. Gesn. Aldrov.**Les Suisses, ALP-KACHEL ; WILDE-TUL. Gesn. Aldrov.*

Il est à peu près de la grosseur du Choucas ordinaire. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes & demie de long ; sa queue six pouces ; son pied un pouce neuf lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a deux pieds sept pouces de vol, & ses ailes,

Monedulam vulgarem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quindecim pollices explet, & ad extremos ungues duodecim pollices & sex lineas. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos quindecim cum semi lineas longum est ; cauda sex pollices ; pes unum pollicem & novem lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extremum longitudine adæquat. Alis expansis, extremitates

majorum remigum duorum pedum & septem pollicum intervallo distant, alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. In toto corpore pennis vestitur nigricantibus. Remiges & rectrices concolores. Rostrum flavum. Pedes, unguisque nigri. Quædam hujus speciei Aves pedes habent eodem ac rostrum flavo colore tinctos. Habitat in *Alpibus*. *Ex museo Realmuriano.*

lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes noirâtres : celles des aîles & de la queue sont de la même couleur. Le bec est jaune : les pieds & les ongles sont noirs. Il y en a qui ont les pieds du même jaune que le bec. On le trouve sur les *Alpes*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 9. LE CHOUCAS DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. II. Fig. 1.

Corvus splendide nigro-viridans ; remigibus interiùs & subtus nigris ; rectricibus subtus nigris ; caudâ bifurcâ . . .
MONEDULA PHILIPPENSIS.

On l'appelle aux Isles Philippines BALI-CASSIO.

Merulam paululum crassitie superat. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudam extremam usque decem pollices æquat, & ad extremos unguis octo pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est ; cauda tres pollices cum undecim lineis ; pes undecim lineas ; & trium digitorum antico-

Il est un peu plus gros qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long ; sa queue trois pouces onze lignes ; son pied onze lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes &

demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est de la même longueur que celui du milieu de ceux de devant. Il a quinze pouces neuf lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un noir changeant en verd brillant. Celles des ailes sont noires en-dessous ; & en-dessus elles sont noires du côté intérieur seulement ; & leur côté extérieur est d'un noir changeant en verd. Les plumes de la queue sont en-dessus de cette dernière couleur , & en-dessous elles sont noires. La plus extérieure de chaque côté est la plus longue ; & toutes les autres vont en décroissant jusqu'aux deux du milieu , qui sont les plus courtes : ce qui rend la queue fourchue. Le bec , les pieds & les ongles sont noirs. Il chante très - bien. On le trouve aux *Isles Philippines* , d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

rum medius cum ungue novem cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum medium longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quindecim pollicum & novem linearum ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Per universum corpus pennis vestitur splendide nigro - viridescentibus. Remiges superne in latere exteriori tantum concolores ; in latere verò interiore , sicut & subtus in utroque latere , sunt penitus nigrae. Rectrices superne nigro - viridescentes , inferne penitus nigrae. Rectrix utrinque extrema cæteris est longior ; reliquæ omnes gradatim longitudine minuuntur ad binas intermedias usque breviores : unde fit cauda bifurca. Rostrum , pedes , unguesque nigri. Optimè sibilat. Habitat in *Philippensibus Insulis* , unde à *D. Poivre* in museum *Realmurianum* allata est.

Voyez Pl. II. Fig. 2.

Corvus splendide nigro-viridans; remigibus interiùs nigris; remigibus, rectricibusque subtus nigricantibus; pennis colli superioris longissimis & strictissimis; pilis in exortu rostri longissimis MONEDULA CAPITIS BONÆ SPEI.

Præcedentem crassitie circiter adæquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octodecim lineas longum est; cauda quinque pollices; pes duodecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duodecim cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum medium longitudine ferè adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis septem pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ ad mediam caudæ longitudinem usque protenduntur. Pennæ nigro-virides splendidissimæ caput, guttur & collum vestiunt. Quæ partem colli superiorem cooperiunt, strictissimæ sunt & cæteris multò longiores. Supra dorsum gliscunt

Tome II.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce six lignes de long; sa queue cinq pouces; son pied douze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, douze lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est presque aussi long que celui du milieu de ceux de devant. Il a un pied sept pouces trois lignes de vol, & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge & le col sont couverts de plumes d'un noir-verd très-brillant. Celles de la partie supérieure du col sont très-étroites & beaucoup plus longues que les autres. Elles glissent sur le dos selon les différens mouvemens de la tête & du col. Les plumes

E

qui retombent sur les narines font d'un noir de velours. Au-dessus de ces plumes partent de l'origine du demi-bec supérieur quelques poils noirs, longs de trois pouces & très-flexibles: & au-dessous tout le long de la b  se du bec, jusque vers les coins de la bouche, font d'autres poils noirs, beaucoup plus courts & roides comme des foyes. Le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les c  t  s, les jambes & les couvertures du dessus & du dessous de la queue font d'un noir de velours changeant en verd brillant. Celles du dessus & du dessous des a  les font d'un noir-verd   clatant & changeant en violet. Les plumes des a  les font de la m  me couleur en-dessus du c  t   ext  rieur seulement, & noires du c  t   int  rieur; & en-dessous elles sont noir  tres. La premiere des plumes de l'a  le est plus courte de deux pouces sept lignes que la quatri  me & la cinqui  me, qui sont les plus longues de toutes. Les plumes de la queue, qui sont toutes d'  gale longueur, sont d'un noir-verd en-dessus & tout-   fait noir  tres en-dessous. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Cap de Bonne Esperance*, d'o   il a   t   apport      M. l'Abb   Aubry, qui le conserve dans son cabinet.

secund  m varios capitis & colli motus. Penn   nari-bus incumbentes holoserici villosi nigri instar splendentes. Supra quas pennas ab exortu mandibul   superioris quidam oriuntur pili nigri, tres pollices longi & flexibiles; & infra istas circa basin rostri, ad oris angulos circiter usque, alteri nascuntur pili nigri, multo breviores & setarum instar rigidi. Dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crura & t  ctrices caud   superiores & inferiores sunt nigro-viridescentes, holoserici villosi instar splendentes. Alarum autem t  ctrices superiores & inferiores sunt splendid   nigro-virides & in violaceum colorem mutantes. Remiges superne concolores, sed in latere exteriori tant  m, in latere interiori nigr  ; subtus ver   nigricantes. Remiges quarta & quinta sunt omnium longissim  , & remigem primam duorum pollicum & septem linearum longitudine excedunt. Rectrices omnes   qualis sunt longitudinis, superne nigro-virides, subtus ver   penitus nigricantes. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Capite Bon   Spei*, unde in *museum D. Aubry* allata est.



Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6. Pouces.

1. Coracias.

2. Choucas des Alpes.

Designé et Gravé par Martinet.



Martinet del. et Sculp.

1. Choucas des Philippines.

2. Choucas du Cap de Bonne Espérance.

Genus Picæ.

Le genre de la Pie.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis
 destituti; tres scilicet an-
 tici, posticus unus; om-
 nes circiter usque ad exor-
 tum discreti:

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de mem-
 branes; trois devant, un der-
 rière; tous séparés environ
 jusqu'à leur origine:

Crura ad calcaneum usque
 plumosa:

Les jambes couvertes de plu-
 mes jusqu'au talon:

Rostrum conico-elongatum,
 rectum; apice deorsum
 inclinante:

Le bec en cône allongé, droit;
 & son bout un peu tourné
 vers le bas:

Plumæ basis rostri antror-
 sum incumbentes, na-
 resque tegentes.

Les plumes de la bête du bec
 tournées en-devant & cou-
 vrant les narines:

Rectrices intermediae latera-
 libus multò longiores.

Les plumes du milieu de la
 queue beaucoup plus lon-
 gues que les latérales.

** I. LA PIE.

Pica nigro-violacea; ventre & pennis scapularibus albis; imo dorso griseo; remigibus majoribus interiùs albis: . . . PICA.

*Pica varia & caudata. Gesn. Avi. pag. 694. hujus icon non satis accu-
 rata pag. 695.*

*Pica varia, vel caudata. Gesn. icon. Avi. pag. 28, in qua eadem icon.
 Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 784. hujus icon minùs accurata pag. 785.
 Jonst. Avi. pag. 27. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVII; in-
 super eadem Tab. alia icon minùs accurata sub titulo, Pica; &
 tertia icon à Gesnero mutuata Tab. XXVII, sub titulo, Pica Cau-
 data.*

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 292.

Pica varia, seu caudata Aldrovandi. Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 412.

*Pica varia caudata. Willugh. Ornith. pag. 87. hujus icon satis accurata
 Tab. XIX.*

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Frisch. hujus icon accurata Tab. 58.

- Pica varia caudata*, seu simpliciter *Pica*. *Raj. Syn. Avi. pag. 41. N°. A. 1.*
Pica caudata. *Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 40. sp. 8.*
Pica. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 775.*
Jonst. Avi. pag. 26.
Charlet. Exer. pag. 75. N°. VIII.
Charlet. Onomazt. pag. 68. N°. VIII.
Pica Rusticorum, vulgaris. *Klein. Avi. pag. 60. N°. 1.*
Corvus cauda cuneiformi. *Faun. Suec. Linn. N°. 76.*
Cissa atra, ventre & alarum extremis albis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XX. sp. 1.*
Pie. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 291, dans laquelle il y a une très-mauvaise figure.
Pie; *Jaquette*; *Dame*; *Agasse*. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 71 a*, dans laquelle est la même figure.
Pie-grièche ou *Agace*. *Alb. Tom. I. pag. 14*, avec une figure passable *Pl. 15.*
Les Grecs l'appellent Κίττα; Κίσσα. Bel. Gesn. Aldrov. Jonst. Willugh. Raj. Charlet. Κίσσα; & quelques-uns, Σίττα; Πέικιλις. Schwenck. Aldrov. Jonst.
Les Lacédémoniens, *Κέσσα. Aldrov. Jonst.*
Les Espagnols, *PIGAZA. Gesn. Aldrov. PIGAZZA; PEGA; PICATA. Aldrov.*
Les Catalans, *GRASSA. Barr.*
Les Italiens, *GAZZOLA. Gesn. Aldrov. GAZZA; GAZZUOLA; GAZZARA. Bel. Gesn. Aldrov. PICA. Bel. Gesn. GHIANDARA. Bel.*
Les Boulonnois, *RAGAZZA; PUTTA. Bel. Gesn. Aldrov.*
Les Savoyards, *AGASSE. Gesn. Aldrov.*
Les Allemands, *AELSTER. Frisch. ELSTER. Schwenck. Gesn. Aldrov. Rzac. AEGERST; ATZEL; AGELASTER. Gesn. Aldrov. AGLASTER. Gesn. Schwenck. Aldrov. Frisch. ALGASTER. Gesn. Schwenck. Aldrov. EGERSTE; ATZLE; AGARTE. Schwenck.*
Les Flamands, *AERTER. Gesn.*
Les Illyriens, *STRAKAVEL; KRZISTELA. Gesn. Aldrov.*
Les Polonois, *SROKA. Rzac.*
Les Suédois, *SKATA. Linn.*
Les Anglois, *MAGPYE. Willugh. Raj. Charlet. Alb. PIANET. Willugh. Raj. Alb. PIE. Charlet.*

Elle est moins grosse que le *Choucas*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied six pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces

Monedulae crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem sex pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim

pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem & septem lineas longum est; cauda decem pollices & tres lineas; pes duos pollices; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue sexdecim cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus laterales longitudine excedit. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & decem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ paulò ultra quartam longitudinis caudæ partem extenduntur. Synciput cooperiunt pennæ ex nigro ad viride-aureum & violaceum vergentes. Reliquum caput, guttur, collum, pectus supremum, pars dorsi superior & rectrices caudæ superiores sunt nigro-violacæ. Ex pennis guttur tegentibus unaquæque lineolâ donatur cinereâ, secundum ipsius scapi longitudinem ductâ. Pars dorsi inferior & uropygium cinerascunt. Scapulares pennæ, pectus infimum, venter supremus & latera albicant. Venter imus, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus regentes sunt nigrae. Alarum

trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue dix pouces trois lignes; son pied deux pouces; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a vingt-deux pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du quart de la longueur de la queue. Le synciput est d'un noir tirant sur le verd-doré & le violet. Le reste de la tête, la gorge, le col, le haut de la poitrine, la partie supérieure du dos & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir tirant sur le violet. Chacune des plumes de la gorge a une petite ligne cendrée, qui s'étend selon la longueur de sa tige. La partie inférieure du dos est grise, ainsi que le croupion. Les plumes scapulaires, le bas de la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont blancs. Le bas-ventre, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont noires. Les petites couvertures du dessus de l'aile sont d'un verd obscur; les grandes sont de la même cou-

leur , mais tirant un peu sur le violet du côté extérieur ; & leur côté intérieur est noir. Il y a à chaque aîle vingt plumes : les onze premières sont noirâtres à leur origine , ensuite elles sont d'un verd obscur du côté extérieur & à leur bout , & leur côté intérieur est blanc , & bordé de noirâtre vers le bout ; cette bordure monte d'autant plus haut que la plume est plus extérieure : les suivantes , sçavoir depuis la douzième jusqu'à la vingtième inclusivement , sont en-dessus du côté extérieur & à leur bout d'un verd obscur tirant sur le violet , & du côté intérieur , ainsi qu'en-dessous , elles sont noirâtres ; de plus les cinq premières de ces plumes , sçavoir depuis la douzième jusqu'à la seizième inclusivement , ont sur le côté extérieur , depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur , une bande longitudinale , d'un verd de *Canard*. La première des plumes de l'aîle est plus courte de trois pouces six lignes que la cinquième , qui est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes toutes noires en-dessous ; mais en-dessus les deux du milieu sont d'un verd de *Canard* , avec un mélange de couleur de cuivre de

teñtrices superiores minores viridi obscuro tinguntur : majores concolores , sed ad violaceum nonnihil incli- nantes in latere exteriori tantum ; in latere verò interiore penitus nigræ. Alarum componunt viginti remiges : undecim primores in exortu nigricant ; in reliqua longitudine sunt in latere exteriori & apice obscurè virides , in latere interiori albæ , margine versùs apicem nigricante ; quæ margo nigricans eò magis versùs pennæ exortum tendit , quò remix fit exterior : sequentes , à duodecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè , superne in latere exteriori & apice ex viridi obscuro ad violaceum inclinant , in latere interiori , sicut & sub- tus in utroque latere , nigricant ; ex istis remigibus quinque primores , à duodecima scilicet ad decimam sextam inclusivè , in latere exteriori , ab exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque , taniâ longitudinali , viridi *Anatino* tinctâ , præditæ sunt. Remix prima tribus pollicibus & sex lineis brevior est quàm quinta , quæ omnium longissima. Caudam componunt duo-

decim rectrices subtus nigrae; superne verò binæ intermediae viridi imbuuntur. *Anatino*, cum aliqua versùs apicem cupri puri coloris mixtura, & viridi obscuro ad violaceum inclinante terminantur: laterales in latere exteriori iisdem coloribus ornantur, in latere autem interiore sunt nigrae. Rectrices binæ intermediae unius pollicis & septem linearum longitudine utrinque sequentem antecellunt; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque, quinque pollicum & septem linearum longitudinem non excedentem. Oculorum irides dilutè avellaneae. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Eodem cibo utitur ac *Cornix* & *Monedula*. In altissimis arboribus nidum construit, eum foris in circuitu infra supraque horridis spinis muniens, unico dumtaxat foramine, eoque artificissimo, sibi pro introitu relicto. Quinque vel sex, interdum etiam septem ova unâ vice parit. *Ex museo Reaumuriano.*

rossette vers leur bout, & terminées de verd obscur tirant sur le violet : les latérales sont teintes des mêmes couleurs du côté extérieur; & leur côté intérieur est noir. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues d'un pouce sept lignes que celle qui les suit de chaque côté; & toutes les latérales vont en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui n'a que cinq pouces sept lignes de longueur. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette claire. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. Elle se nourrit des mêmes alimens que la *Corneille* & le *Choucas*. Elle fait son nid au haut des grands arbres : l'extérieur de ce nid est tout hérissé d'épines, & elle n'y laisse qu'un passage fort étroit, & capable seulement de lui en permettre l'entrée. Elle pond cinq ou six, & même quelquefois jusqu'à sept œufs à chaque couvée. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** A. LA PIE BLANCHE.

Voyez Pl. III. Fig. 1.

Pica candida.

Pica alba. Mus. Worm. pag. 293.

Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 412.

Les Allemands l'appellent WEISSE ELSTER. Rzac.

Les Polonois, SROKA BIALA. Rzac.

Elle est de la même grandeur & de la même grosseur que la précédente : elle en diffère seulement par sa couleur. Tout son corps est couvert de plumes blanches. Le bec, les pieds & les ongles sont de la même couleur ; il y a cependant quelques taches noirâtres vers le bout du bec. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Magnitudine & crassitie præcedentem æmulatur : ab illa tantum colore discrepat. In universo corpore pennis vestitur candidis. Rostrum, pedes, unguisque idem tingit color ; excepto tamen rostri apice, maculis quibusdam nigricantibus notato. *Ex museo Realmuriano.*

** 2. LA PIE DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. III. Fig. 2.

Pica nigro-violacea ; remigibus majoribus, rectricibusque fuscis PICA SENEGALENSIS.

Elle n'est pas si grosse que notre *Pie*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long ; sa queue sept pouces ; son pied un pouce neuf lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a un pied neuf pouces six lignes

Picæ nostrati paululum crassitie cedit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudam extremam usque quatuordecim pollices æquat, & ad extremos ungues decem pollices cum septem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem & quinque lineas longum est ; cauda septem pollices ; pes unum pollicem cum novem lineis ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus laterales nonnihil longitudine antecellit.

antecellit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis novem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ paulò ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, alarum rectrices, pennæ caudam superne tegentes, pectus, venter supremus & latera nigro-violaceo colore tinguntur. Venter imus, crura & rectrices caudæ inferiores nigricant. Remiges majores fuscae sunt: minores subtus concolores, superne autem in latere exteriori nigro-violaceæ, in interiore nigricantes. Cauda constat duodecim rectricibus fuscis, superne saturatiùs, infernè dilutiùs, quarum utrinque extrema quatuor pollices longitudine non superat. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Senegalensi regione*, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. Adanson*.

de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les couvertures des aîles & celles du dessus de la queue, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont d'un noir changeant en violet. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont noirâtres. Les grandes plumes des aîles sont brunes: les moyennes sont de cette même couleur en-dessous, & en-dessus elles sont d'un noir changeant en violet du côté extérieur, & leur côté intérieur est noirâtre. La queue est composée de douze plumes, d'un brun plus foncé en-dessus qu'en-dessous: la plus extérieure de chaque côté n'a que quatre pouces de longueur. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

3. LA PIE DE LA JAMAÏQUE.

Pica nigro-violacea; remigibus majoribus interiùs & subtus nigris. (*Mas*).

Pica in toto corpore fusca, superne saturatiùs, infernè dilutiùs. (*Fœmina*) *PICA JAMAICENSIS*.

Monedula purpurea ; Cornix purpurea. *Klein. Avi. pag. 60. N^o. 13.*
 Merops niger , iride subargenteâ. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 476.*
 Izanatl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 21. cap. XXXII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 168. N^o. 21.

Pie rouge. *Des March. Tom. III. pag. 328.*

Choucas couleur de pourpre. *Catesb. Tom. I. pag. 12 ; avec une figure exacte Pl. 12.*

Les Anglois l'appellent PURPLE JACK-DAW. Catesb.

Les Anglois de la Jamaïque , BARBADOES BLACK-BIRD. Browne.

Les Mexiquains , IZANATL ; & quelques-uns , YXTLAOLTZANATL. Fern.

Elle est d'un tiers moins grosse que le *Choucas ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces neuf lignes , & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long ; sa queue cinq pouces six lignes ; son pied un pouce sept lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , quatorze lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent pas à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un noir-violet fort brillant , sur-tout sur la tête & le col. Les grandes plumes des aîles sont de la même couleur en-dessus du côté extérieur seulement ; leur côté intérieur , ainsi que

Craffitie Monedulæ vulgaris tertiâ parte cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & novem lineas æquat , & ad extremos ungues novem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est ; cauda quinque pollices & sex lineas ; pes unum pollicem cum septemlineis ; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue quatuordecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus laterales paululùm longitudine superat. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Universum corpus vestiunt pennæ nigro-violaceæ valdè splendentes , in capite præsertim & collo. Remiges majores superne in latere exteriori concolores , in latere autem interiori , sicut &

subtus in utroque latere ,
penitus nigræ : minores sunt
quoque subtus nigræ , su-
perne verò nigro-violaceæ.
Caudam componunt duode-
cim rectrices remigibus mi-
noribus concolores : binæ
intermediæ laterales mul-
tùm longitudine excedunt ;
laterales verò sensim atque
sensim longitudine minuun-
tur ad utrinque extimam uf-
que , omnium brevissimam.
Oculi grisei sunt. Rostrum ,
pedes , unguisque nigri.

Fœmina à *mare* colore dif-
crepat ; pennæ enim totum
corpus vestientes fusco tin-
guntur colore , in dorso qui-
dem , alis & cauda saturatio-
re , in reliquo corpore dilu-
tiore. Habitant in variis *Ame-
ricæ septentrionalis* regioni-
bus , *Jamaica* scilicet , *Caro-
lina* , *Mexico* , &c. Supra
ramos arborum , in locis de-
sertis sitarum , nidificant.
Gregarim volant.

tout le dessous , est noir : les
moyennes sont aussi noires en-
dessous , & en-dessus elles sont
d'un noir-violet. La queue est
composée de douze plumes
de la même couleur que les
moyennes des aîles : les deux
du milieu sont beaucoup plus
longues que les latérales , qui
vont toutes en diminuant par
degrés jusqu'à la plus exté-
rieure de chaque côté , qui est
la plus courte de toutes. Les
yeux sont gris. Le bec , les
pieds & les ongles sont noirs.

La *femelle* diffère du *mâle* par
sa couleur , qui est brune par
tout le corps. Cette couleur est
plus foncée sur le dos , les aîles
& la queue qu'ailleurs. On les
trouve en différens endroits
de l'*Amérique septentrionale* ,
comme la *Jamaïque* , la *Caro-
line* , le *Mexique* , &c. Elles
font leur nid sur les branches
des arbres , dans les endroits
les moins fréquentés. Elles vo-
lent par troupes.

4. LA GRANDE PIE DU MEXIQUE.

Pica è nigro ad cœruleum vergens ; remigibus majoribus in-
teriùs & subtus nigris PICA MEXICANA MAJOR.

Hocitzanatl , seu magnus Sturnus. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 21. cap. XXXIII.*

Hocitzanatl. *Raj. Syn. Avi. pag. 162.*

Les Mexiquains l'appellent HOCITZANATL. *Fern.*

Monedulam nostratem cor-
poris crassitiæ superat. In uni-

Elle est plus grosse que *notre*
Choucas. Tout son corps est

couvert de plumes d'un noir tirant un peu sur le bleu éclatant. Les grandes plumes des aîles sont de la même couleur en-dessus du côté extérieur seulement ; leur côté intérieur, ainsi que tout le dessous, est noir : les moyennes sont pareillement noires en-dessous, & en-dessus elles sont d'un noir tirant sur le bleu. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes des aîles. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. Les pieds sont d'une médiocre longueur ; & les ongles sont à proportion beaucoup plus longs. Elle babille beaucoup : sa voix est forte & sonore. Elle s'approche volontiers des villes. On la trouve au *Mexique*.

verso corpore vestitur pennis è nigro colore in cœruleum splendentem paulisper inclinantibus. Remiges majores superne in latere exteriori tantum concolores ; in latere verò interiore, sicut & subtus, nigrae : minores sunt quoque subtus nigrae ; superne autem è nigro ad cœruleum vergunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Rostrum, pedes, unguisque nigri : pedes autem sunt mediocriter longi ; ungues verò prolixi. Garrula est hæc Avis, altæque vocis & sonoræ. Circa urbes versatur. Habitat in *Mexico*.

5. LA PETITE PIE DU MEXIQUE.

Pica nigricans ; capite & collo in fulvum colorem inclinantibus *PICA MEXICANA MINOR*.

Tzanahoei. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 22. cap. XXXV.

Tzanahoei, seu Pica Mexicana Hernandezii. Raj. Syn. Avi. pag. 162. Les Mexiquains l'appellent TZANAHOEI. Fern.

Elle est à peu près de la grandeur & de la grosseur de *notre Pie*. Tout son corps est couvert de plumes noirâtres, excepté celles de la tête & du col, qui tirent sur le fauve. Sa

Magnitudine & crassitie *Picam vulgarem* circiter æquat. Totum corpus pennis vestitur nigricantibus, præter caput & collum, quæ in fulvum inclinant colo-

rem. Cauda prolixa est. Rostrum, pedes, unguisque nigri. Humanas voces facile discit. Habitat in *Mexico*. queue est fort longue. Son bec, ses pieds & ses ongles sont noirs. Elle apprend aisément à parler. On la trouve au *Mexique*.

6. LA PIE DE L'ISLE PAPOE.

Pica alba; capite & collo nigro-purpureis; rectricibus binis intermediis primâ medietate secundum scapi longitudinem nigricantibus; rostro albicante; pedibus dilutè rubris . . .
PICA PAPOENSIS.

Pica ex albo & nigro varia, duabus caudæ pennis simplicibus prælongis. *Klein. Avi. pag. 62. N°. 9.*

Avis Paradisiaca, *Orientalis*, ex albo & nigro varia. *Seb. Vol. I. pag. 85. hujus iconi accurata. Tab. LII. fig. 3.*

Pyrrhocorax. Moehr. Avi. Gen. 8.

Les Habitans de l'Isle Papoe l'appellent WAYGEHOE ou WARDIOE. Seb.

Crassitie Merulam non multum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & octo circiter pollices æquat, & ad extremos ungues octo tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda quatuordecim pollices; pes octo lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales longitudine adæquat. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Caput, guttur & collum nigris

Elle n'est guères plus grosse qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces seulement. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue quatorze pouces; son pied huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que ces derniers. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La tête, la gorge

& le col sont d'un noir brillant d'un pourpre très-vif. Tout le reste du corps est couvert de plumes tout-à-fait blanches, si l'on en excepte cependant celles des aîles, dont les tiges sont garnies de barbes noires. Les deux plumes du milieu de la queue, qui sont beaucoup plus longues que les latérales, sont aussi en partie noires depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur longueur, & cela tout le long de leur tige ; & de là jusqu'à leur extrémité elles sont tout-à-fait blanches. Les yeux sont fort brillants, & entourés de blanc. Le bec, qui est de la même couleur, est garni à sa base d'especes de poils noirs, tournés en-avant. Les pieds sont d'un rouge clair ; & les ongles blancs. On la trouve dans l'*Ile Papoe*.

XVI.

Le genre du Geay.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derrière ; tous séparés environ jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec en cône allongé, tout-à-fait droit :

vestiuntur pennis ex purpureo vividissimè resplendentibus. Reliquæ totius corporis pennæ prorsus albicant, exceptis pennis remigibus, quarum scapi nigris stipantur pinnulis. Binæ etiam rectrices intermediae, quæ cæteris sunt multò longiores, ab exortu suo ad medietatem usque partim nigricant, idque secundum scapi longitudinem ; inde verò ad extremitatem usque penitus albescunt. Oculi lucidi sunt ; ipsorum ambitus albus. Rostrum albicat, & ad basin nigris quasi pilis, antrorsum reflexis, obsitum est. Pedes sunt dilutè rubicundi ; ungues verò albi. Habitat in *Insula Papoe*.

XVI.

Genus Garruli.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus ; omnes circiter usque ad exortum discreti :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum conico-elongatum, rectum :



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Pie Blanche. 2. Pie du Sénégal.

Mandibulæ æquales : Les deux mandibules égales :
 Plumæ basis rostri antrorsum Les plumes de la bête du bec
 incumbentes , narsque tournées en-devant, & cou-
 tegentes. vrant les narines.

** I. LE GEAY.

Garrulus dilutè vinaceus, ad cinereum vergens; maculâ longitudinali utrinque in capite nigrâ; majoribus alarum tectricibus à corpore remotioribus cœruleo modò diluto, modò saturatiore & nigro exteriùs transversim striatis; rectricibus in exortu cinereis, in reliqua longitudine nigris....
 GARRULUS.

Pica glandaria, vel Garrulus Avis. *Gesn. Avi. pag. 700. hujus icon satis accurata pag. 701.*

Pica glandaria; Garrulus Recentioribus. *Gesn. icon. Avi. pag. 26, in qua eadem icon.*

Pica glandaria; Garrulus, sive Graculus. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 55.*

Pica glandaria. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 788. hujus icon non satis accurata pag. 789.*

Schwenck. Avi. Sil. pag. 336.

Jonst. Avi. pag. 27. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVII; & insuper duæ aliæ icones satis accuratæ Tab. 43.

Willugh. Ornith. pag. 88. hujus icon satis accurata Tab. XIX.

Raj. Syn. Avi. pag. 41. N°. A. 2.

Charlet. Exer. pag. 76. N°. 2.

Charlet. Onomazt. pag. 68. N°. 2.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 40. sp. 7.

Pica glandaria Gesneri, Willughbeyi. *Klein. Avi. pag. 61. N°. 2.*

Pica glandaria; Molliceps Gazæ. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 292.*

Pica glandaria Gesneri; Molliceps Gazæ; Sitta Eberi & Peuceri. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 412.*

Galgulus rostro nigro, cinereus, ad alarum latera cœruleus. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XVII.*

Corvus variegatus, tectricibus alarum cœruleis; lineis transversis albis nigrisque. *Faun. Suec. Linn. N°. 74.*

Ghiandaia. *Olin. pag. 35, in qua icon satis accurata.*

Geai. *Alb. Tom. I. pag. 15; avec une figure mal coloriée Pl. 16.*

Jay. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 288; avec une figure peu exacte pag. 289.*

- Jay ; Jayon. *Bel. Portr. d'Ois. pag 70 b, dans laquelle est la même figure.*
Les Grecs l'appellent Μαλακοκερυνός. Bel. Μαλακοκερυνός. Jonst.
Les Grecs modernes, Καρχαῖα. Gesn. Aldrov. Jonst. Καρακάξ. Schwenck.
Les Espagnols, GAYO. Aldrov.
Les Aragonois, CAIO. Aldrov.
Les Catalans, GAITG ; GRALLA. Barr.
Les Italiens, GHIANDAIA. Olin. GAZA GHIANDAIA ; GAZA GHIAN-DARA ; GAZA VERLA ; BERTA. Bel. Gesn.
Les Savoyards, GAION. Gesn. GIAION. Aldrov.
Les Genevois, BERTINA. Bel. Aldrov.
Les Habitans de l'Isle de Chio, BERTINA. Aldrov.
Les Suisses aux environs de Fribourg, HERREN-VOGEL. Gesn. Schwenck. Aldrov.
Les Allemands, HAER. Gesn. HAEHER ; HAETZEL ; BAUM-HAETZEL ; MARGGRAFF. Gesn. Aldrov. HAETZLER ; MARCOLFUS ; HOLTZ-SCHREIER. Gesn. Schwenck. Aldrov. HOLTZ-SCHREYER ; EICHEN-HEHER ; NUSS-HEHER. Frisch. NUSZ-HECKER. Schwenck. HOCHER ; HOECKER. Rzac.
Les Silésiens, NUS-HAER. Schwenck.
Les Souabes, JAECK. Gesn. Aldrov.
Les Brabançons, BROECKEXTER. Aldrov.
Les Habitans des confins du Brabant, GIRAU ; RICHAU. Gesn. Aldrov.
Les Illyriens, SOYKA. Gesn. Aldrov.
Les Polonois, SOYKA. Rzac.
Les Suédois, NOET-SKRIKA ; KORN-SKRIKA. Linn.
Les Anglois, JAY. Gesn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.

Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces cinq lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces une ligne. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce quatre lignes de long ; sa queue cinq pouces neuf lignes ; son pied un pouce sept lignes & demie ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; celui de derrière

Ipsius longitudo à rostri apice ad caudam extremam usque tredecim pollices & quinque lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem & quatuor lineas longum ; cauda quinque pollices cum novem lineis ; pes unum pollicem & septem cum semi lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim lineas : laterales

rales paulò sunt breviores ; posticus anticorum extimum longitudine adæquat ; intimus autem omnium est brevissimus. Alis expansis , extremitates majorum remigum unius pedis novem pollicum & trium linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Pennis vestitur hæc Avis serici instar mollissimis. Synciput vestiunt pennæ albo & nigro variæ , nigro uniuscujusque pennæ medium occupante ; in albo autem aliquid vinacei admiscetur. Pennæ istæ sunt proluxæ , easque cristæ in modum erigit Avis. Quæ nares cooperiunt , sordidè albicant. Genæ , occipitium , pars colli superior & latera vinaceo colore pulchrè imbuuntur. Dorsum , scapulares pennæ & tectrices alarum superiores minores concolores , attamen ad cinereum nonnihil vergentes. Uropygium , crura & tectrices caudæ superiores & inferiores albescent. In utroque capitis latere , secundum mandibulæ inferioris longitudinem , majuscula extenditur macula longitudinalis , nigra. Guttur & venter imus

est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant ; & l'intérieur est le plus court de tous. Il a un pied neuf pouces trois lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Les plumes de cet Oiseau sont douces comme de la soie. Le synciput est couvert de plumes variées de blanc & de noir, cette dernière couleur occupant le milieu de chaque plume ; le blanc est mêlé d'une légère teinte de vineux. Ces plumes sont assez longues ; & l'Oiseau peut les élever en forme de hupe. Celles qui couvrent les narines sont d'un blanc sale. Les joues , l'occiput , la partie supérieure du col , & les côtés sont d'une belle couleur vineuse. Le dos , les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur , mais tirant un peu sur le cendré. Le croupion , les couvertures du dessus & du dessous de la queue & les jambes sont blanches. De chaque côté de la tête le long de la mâchoire inférieure est une grande tache longitudinale , noire. La gorge & le bas-ventre sont blanchâtres. La partie inférieure du col , la poitrine & le haut du ventre sont d'un

vineux très-clair & tirant un peu sur le cendré. Les couvertures du dessous de l'aile sont d'un vineux tirant sur le roux : les grandes du dessus les plus éloignées du corps, ainsi que les plumes de l'aile bâtarde, sont rayées transversalement de bleu clair, de bleu plus foncé & de noir à leur côté extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est noir : les grandes couvertures les plus proches du corps sont tout-à-fait noires. L'aile est composée de vingt plumes, dont la première est très-courte, & la cinquième est la plus longue de toutes. La première est toute noire, excepté son origine, qui est blanchâtre : les six suivantes sont d'un gris-blanc du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur : les huitième, neuvième & dixième sont aussi noirâtres du côté intérieur, & leur côté extérieur est d'un gris plus foncé que celui des précédentes, & varié vers l'origine de la plume de quelques taches transversales, bleues & noires : les cinq qui suivent ces dernières, sont noires du côté intérieur, & leur côté extérieur est aussi noir depuis le bout de la plume jusque vers le tiers de sa longueur, & le reste est blanc & varié vers l'origine de

albicant. Pars colli inferior, pectus & venter supremus ex dilutissimo vinaceo non-nihil ad cinereum inclinant. Alarum tectrices inferiores ex vinaceo ad rufum vergunt : superiores majores à corpore remotiores, sicut & alæ nothæ pennæ, in latere exteriori & apice cœruleo diluto, cœruleo saturatiore & nigro sunt transversim striatæ, in latere interiore nigrae : majores tectrices corpori finitimæ sunt penitus nigrae. Viginti sunt in utraque ala remiges, quarum prima brevissima, quinta verò omnium longissima. Remix prior in toto nigra, excepto exortu, in quo candicat : sex sequentes in latere exteriori cinereo-albæ, in latere interiore nigricantes : octava, nona & decima in latere interiore quoque nigricant, & in latere exteriori sunt cinereo-albæ, sed quàm in præcedentibus saturatius, & maculis quibusdam transversis, alternatim cœruleis & nigris versus pennæ exortum variantur : quinque sequentes in latere interiore nigrae, in latere verò exteriori à pennæ apice ad tertiam circiter longitudinis partem usque

nigræ, in reliqua longitudo albæ & maculis quibusdam transversis, alternatim nigris & cœruleis versus pennæ exortum variegatæ: decima-sexta nigra, attamen in latere exteriori ab exortu pennæ ad mediam circiter longitudinem usque cœruleo diluto, cœruleo saturatiore & nigro transversim striata: decima-septima & decima-octava sunt penitus nigræ: decima-nona castanea, nigro terminata: vigesima tandem in toto castanea. Omnes autem remiges subtus sunt griseæ, exceptis tamen duabus corpori finitimis, superne & inferne iisdem coloribus imbutis. Caudam componunt duodecim rectrices in tota longitudine nigræ, excepto exortu cinereo. Oculorum irides candicantes. Rostrum crassum & nigrum. Lingua & palatum eodem colore tinguntur. Pedes ex fusco ad carneum colorem inclinant; ungues fusci sunt. Habitat in

la plume de quelques taches transversales, noires & bleues: la seizième est noire, excepté son côté extérieur, qui depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur est rayé transversalement de bleu clair, de bleu plus foncé & de noir: les dix-septième & dix-huitième sont tout-à-fait noires: la dix-neuvième est marron & terminée de noir: & la vingtième est tout-à-fait marron. Toutes ces plumes sont grises en-dessous, excepté les deux dernières, qui sont des mêmes couleurs qu'en-dessus. La queue est composée de douze plumes noires dans toute leur longueur, excepté leur origine, qui est cendrée. L'iris des yeux est blanchâtre. Le bec est épais & noir. La langue & le palais sont de la même couleur. Les pieds sont d'un brun tirant sur la couleur de chair; & les ongles bruns. On le trouve dans les bois. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

sylvis. *Ex museo Reaumuriano.*

Une variété de cette espèce est

**** A. LE GEAY BLANC.**

Garrulus albus.

A précédente differt penarum colore, in universo

Il diffère du précédent par la couleur de ses plumes, qui

sont blanches par tout le corps. L'iris des yeux est rouge. Le bec, les pieds & les ongles sont blancs. *Du cabinet de M. de Reaumur, à qui il a été donné par M. l'Abbé Aubry.*

corpore albo. Oculorum irides rubescunt. Rostrum, pedes, unguisque albicant. *Ex museo Realmuriano. Ex dono D. Aubry.*

** 2. LE GEAY DE CAYENNE.

Voyez Pl. IV. Fig. 1.

Garrulus superne dilute violaceus, inferne albus; capite anteriorius & collo inferiore nigris; tribus utrinque maculis in capite albis; rectricibus apice albis . . . GARRULUS CAYANENSIS.

Il est à peu près de la grosseur de notre Geay. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue six pouces six lignes; son pied deux pouces; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a un pied dix pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les plumes qui retombent sur la base du

Garrulum nostratem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices explet, & ad extremos ungues decem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos sexdecim lineas longum est; cauda sex pollices & totidem lineas; pes duos pollices; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem cum quinque lineis: laterales paulò sunt breviores; & posticus anteriorum extimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis decem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Pen-

naë basi rostri incumbentes , quæque synciput , genas , guttur & partem colli inferiorem vestiunt , nigræ sunt. Quæ synciput cooperiunt , sunt sursum erectæ & rigidæ. In utroque capitis latere tres extant maculæ albæ ; altera supra , altera infra oculum , & tertiâ denique , majuscula , in exortu mandibulæ inferioris collocata. Capitis vertex , sicut & occiput , pars colli superior , pectus , venter , latera , crura , alarum rectrices inferiores & pennæ caudam subtus tegentes albescent. Dorsum & uropygium sunt dilutè violacea , cum aliqua cinerei tinctura. Scapulares pennæ ; alarum rectrices superiores , quæque caudam superne cooperiunt , concolores. Remiges subtus fuscæ ; superne verò in latere exteriori violacæ , in latere interiori fuscæ. Caudam componunt duodecim rectrices subtus nigricantes ; superne verò binæ intermediæ ex fusco ad violaceum vergunt , laterales autem sunt in latere exteriori violacæ , & in latere interiori fuscæ : rectrices autem omnes , & laterales & intermediæ , apicibus donantur albis. Intermediæ laterales nonnihil lon-

bec , le synciput , les joues , la gorge & la partie inférieure du col sont noires. Les plumes du synciput sont relevées en haut & roides. Il y a de chaque côté de la tête trois taches blanches ; l'une placée au-dessus de l'œil , une autre au-dessous , & la troisième , qui est la plus grande , à l'origine du demi-bec inférieur. Le sommet & le derrière de la tête , la partie supérieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous des ailes & celles du dessous de la queue sont blanches. Le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un violet clair & mêlé d'une légère teinte de cendré. Les plumes des ailes sont brunes en-dessous , & en-dessus elles sont de la même couleur du côté intérieur seulement ; & leur côté extérieur est violet. La queue est composée de douze plumes , toutes noirâtres en-dessous ; & en-dessus les deux du milieu sont d'un brun tirant sur le violet , & toutes les latérales sont violettes du côté extérieur & brunes du côté intérieur ; de plus toutes ces plumes sont terminées de blanc , ainsi que celles du

milieu. Les latérales sont un peu plus courtes que ces dernières. Le bec, les pieds & les ongles sont gris. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

gitudine excedunt. Rostrum, pedes, unguisque grisei. Habitat in *Cayana*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Artur*.

** 3. LE GEAY BRUN DE CANADA.

Voyez *Pl. IV. Fig. 2.*

Garrulus superne fuscus, infernè sordidè cinereo-albus; capite anteriùs sordidè albo-flavicante; rectricibus apicè albidis GARRULUS CANADENSIS FUSCUS.

Il est un peu plus petit que notre *Geay*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue cinq pouces; son pied un pouce sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a seize pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes douces comme de la soie. Le synciput & la gorge sont d'un

Garrulo nostrati paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices æquat, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda quinque pollices; pes unum pollicem & septem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas: latérales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Alis expansis; extremitates majorum remigum sexdecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad mediam caudæ longitudinem usque protenduntur. In toto corpore vestitur pennis se-

rici instar mollissimis. Syn-
ciput & guttur ex sordidè
albo flavicant. Pars superior
& latera capitis, sicut & oc-
cipitium, ex fusco nigricant.
Collum candicat. Dorsum,
uropygium, scapulares pen-
næ, alarum rectrices, quæ-
que caudam superne coope-
riunt, fuscæ. Pectus sordidè
cinereo-album. Venter, la-
tera, crura & rectrices cau-
dæ inferiores eodem imbuun-
tur colore, sed saturatiore.
Remiges & rectrices fuscæ,
apicibus albidis. Rectrices
binæ intermediæ lateralibus
paulò sunt longiores. Ros-
trum, pedes, unguesque ni-
gricant. Habitat in *Canada*,
unde in *musæum Realmuria-*
num missus à *D. Gautier*.

blanc sale & jaunâtre. La partie
supérieure & les côtés de la
tête, ainsi que l'occiput, sont
d'un brun noirâtre. Le col est
blanchâtre. Le dos, le crou-
pion, les plumes scapulaires,
les couvertures des ailes &
celles du dessus de la queue
sont brunes. La poitrine est
d'un gris-blanc sale. Le ventre,
les côtés, les jambes & les
couvertures du dessous de la
queue sont de la même cou-
leur, mais plus foncée. Les
plumes des ailes & celles de la
queue sont brunes & terminées
de blanchâtre. Les deux plumes
du milieu de la queue sont un
peu plus longues que les laté-
rales. Le bec, les pieds & les
ongles sont noirâtres. On le
trouve en *Canada*, d'où il a été
envoyé à *M. de Reaumur* par
M. Gautier.

** 4. LE GEAY BLEU DE CANADA.

Garrulus cristatus, superne cœruleus, infernè cinereo-albus;
torque nigro; rectricibus cœruleis, nigro transversim stria-
tis, lateralibus apice albis *GARRULUS CANADENSIS*
CÆRULEUS.

Pica glandaria cristata, purpureo cœrulea. *Klein. Avi. pag. 61. N^o. 3.*
Geay bleu. Catesb. Tom. I. pag. 15; avec une figure pas assez exacte Pl. 15.
Edwards. Glanur. pag. 60. Chap. XXIX; avec une figure exacte Pl. 239.
Les Anglois l'appellent BLEW-JAY. Catesb. BLUE JAY. Edwards.

Quoad crassitiem *Meru-*
lam non multum antecellit.
Ipsius longitudo ab apice

Il n'est guères plus gros qu'un
Merle. Sa longueur depuis le
bout du bec jusqu'à celui de la

queue est de dix pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces une ligne. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue cinq pouces trois lignes; son pied quinze lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est presque aussi long que celui du milieu de ceux de devant. Il a dix-huit pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ à la moitié de la longueur de la queue. Le sommet de la tête & les parties supérieures du col & du dos sont d'un bleu tirant sur le vineux. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont bleues. La gorge & les joues sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte de vineux. La partie inférieure du col, la poitrine, les côtés & les jambes sont grises. Le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris-blanc. Quelques plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres & forment une hupe. Dessous celles-là sont des plumes noires: cette couleur s'é-

rostri ad caudam extremam decem pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos unguis octo pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim cum semi lineas longum est; cauda quinque pollices cum tribus lineis; pes quindecim cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum medium longitudine ferè adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem protenduntur. Verticem capitis, partem colli superiorem, & dorsum supremum vestiunt pennæ cœruleæ, ad vinaceum inclinantes. Dorsum infimum & uropygium cœrulea. Tectrices caudæ superiores concolores. Genæ & guttur albescent, cum aliqua vinacei mixtura. Collum inferius, pectus, latera & crura grisea. Venter & tectrices caudæ inferiores cinereo-albæ. In summo capite pennæ quædam extant cæteris longiores, cristam efficientes;

efficientes; infra quas pennas alia extant pennæ nigræ: nigredo autem utrinque protenditur, & taniam efformat longitudinalem, ponè genas ductam, indeque taniam transversam, similiter nigram, infra guttur positam, & torquem efficientem, attingit. In utroque capitis latere exigua insuper adest macula nigra, narem inter & oculum sita: quas maculas binas inter se connectit lineola concolor, mandibulæ superioris basin ambiens. Alarum tectrices minores cœruleæ: majores splendenti cœruleo tinctæ, nigro transversim striatæ, apicibus albis; quibus in utraque ala tania transversa, concolor efformatur. Remiges majores in latere exteriore cœruleæ, in latere interiore fuscæ: minores, duabus tribusve corpori vicinioribus exceptis, in latere interiore nigræ, in exteriore verò splendide cœruleæ, maculis transversis, nigris notatæ, apicibus albis: binæ tandem aut tres corpori finitimæ eodem imbuuntur cœruleo splendenti, nigro transversim sunt striatæ & albo terminantur. Cauda constat duodecim re-

tend de chaque côté en une petite bande longitudinale, qui passe par derrière les joues, & en va joindre une transversale, de la même couleur, qui est au-dessous de la gorge, & qui forme un collier. Il y a aussi une petite tache noire de chaque côté entre la narine & l'œil: & ces deux taches sont jointes par une petite ligne noire, qui entoure la base du demi-bec supérieur. Les petites couvertures des ailes sont bleues: les grandes sont d'un bleu vif, rayées transversalement de noir, & terminées de blanc; ce qui forme sur l'aile une bande transversale de cette dernière couleur. Les grandes plumes de l'aile sont bleues du côté extérieur, & brunes du côté intérieur: les moyennes, excepté les deux ou trois plus proches du corps, sont noires du côté intérieur, & du côté extérieur elles sont d'un bleu vif, marqué de taches transversales, noires, & leur bout est blanc: les deux ou trois plus proches du corps sont du même bleu vif, rayées transversalement de noir & terminées de blanc. La queue est composée de douze plumes noires en-dessous, & bleues en-dessus: les deux du milieu sont rayées transversalement de noir du côté extérieur & du

côté intérieur; les latérales sont rayées pareillement de noir, mais du côté extérieur seulement, & terminées de blanc : cette couleur s'étend d'autant plus loin, que la plume est plus extérieure. Les deux du milieu sont les plus longues; & les latérales vont toutes en diminuant par degrés. Le bec, les pieds & les ongles sont gris-bruns.

nae rectrices intermediae cæteris sunt longiores; laterales autem gradatim longitudine minuuntur. Rostrum, pedes, unguesque griseo-fusci.

La femelle diffère du mâle en ce que ses couleurs ne sont pas si vives. On le trouve à la Caroline & en Canada, d'où il a été envoyé à M. de Reaumur par M. Gautier.

XVII.

Le genre du Casse-noix.

Son caractère est d'avoir quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec en cône allongé, tout-à-fait droit :

La mandibule supérieure plus longue que l'inférieure, & obtuse :

etricibus subtus nigris, superne cœruleis, quarum binæ intermediae in utroque latere, exteriori scilicet & interiori, taniis transversis, nigris variegantur; laterales verò eodem colore sunt transversim striatæ, sed in latere exteriori tantum, apicibusque donantur albis: quæ albedo eò magis versùs pennæ exortum protenditur, quo rectrix fit exterior. Binæ

Fœmina à mare discrepat coloribus non ita splendentibus. Habitat in Carolina & Canada, unde in museum Realmurianum missus à D. Gautier.

XVII.

Genus Nucifragæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum conico-elongatum, rectum :

Mandibula superior inferiore longior & obtusa :



Designé et Gravé par Martinet.

1. Geay de Cayenne.

2. Geay brun de Canada.

Plumæ bāsī rostri antrorsum Les plumes de la bāse du bec
incumbentes , nareſque tournées en-devant , & cou-
tegentes. vrant les narines.

** I. LE CASSE-NOIX.

Voyez Pl. V. Fig. 1.

Nucifraga fusca , maculis albis varia ; rectricibus nigricanti-
bus , apice albis NUCIFRAGA.

Nucifraga. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 310.*

Nucifraga *Schwenckfeldii* ; *Oſifragus Gefneri* ; *Coccothraustes Charle-*
tonis ; *Turdela saxatilis Aldrovandi. Rzac. Auſt. Hiſt. nat. Pol pag. 329.*

Caryocatactes. Gefn. Avi. pag. 244. hujus icon ſatis accurata. pag. 245.
Linn. Syſth. Nat. ed. 6. Gen. 40. ſp. 6.

Caryocatactes vel Nucifraga. Gefn. icon. Avi. pag. 25 , in qua eadem icon.

Caryocatactes ; Nucifraga. Charlet. Exer. pag. 92. N°. VI.

Charlet. Onomazt. pag. 85. N°. VI

Caryocatactes Gefneri & Turneri. Willugh. Ornith. pag. 90. hujus icon
ſatis accurata Tab. XX ; & inſuper altera icon ab Aldrovando mutuata
Tab. XXXVIII , ſub titulo , Merula ſaxatilis Aldrovandi.

Raj. Syn. Avi. pag. 42. N°. 5.

Merula ſaxatilis , ſive Caryocatactes Ornithologi. Aldrov. Avi. Tom. II.
pag. 630 , in qua icon minimè accurata.

Merula ſaxatilis. Jonſt. Avi. pag. 75. hujus icon à Gefnero mutuata
Tab. XXVIII , ſub titulo , Caryocatactes ; & inſuper alia icon ab Al-
drovando mutuata Tab. 40 , ſub eodem titulo.

Oſifragus Gefnero ; Caryocatactes ; Nucifraga aliis. Rzac. Hiſt. nat. Pol.
pag. 289.

Pica Nucifraga. Klein. Avi. pag. 61. N°. 4.

Pica Abietum nigra punctata , ſive guttata. Friſch. hujus icon accurata
Tab. 56.

Corvus cinereus , caudâ aliſque nigris. Faun. Suec. Linn. N°. 75.

Graculi Alpini , ſeu montani genus Turneri. Schwenck. Klein.

Caffe-Noix. Edwards. Glanur. pag. 63 , Chap. XXX ; avec une figure
exaſte Pl. 240.

Les François l'appellent PIE GRIVELÉE.

Les Grecs , Καρυοκακτίνος. Schwenck.

Les Turcs , GARGA. Gefn. Aldrov.

Les Italiens aux environs des Alpes & du Lac Majeur , MERLE ALPADIE.
Gefn. Aldrov.

Les Allemands , NUSZ-BRECHER. Gefn. Schwenck. Aldrov. NUSZ-BICKER.
Gefn. Schwenck. Aldrov. Rzac. NUSS-BRETSCHER ; NUSS-HAEHER.

Gefn. Aldrov. NUSZ-HACKER; NUSZ-KRAHE. *Schwenck. Rzac.* NUSS-KNACKER. *Rzac.* TANNEN-HEHER; TURCKISCHER HOLTZ-SCHREYER. *Frisch.*

Les Polonois, KLESK; GRABULUSK; GRABOLUSK. *Rzac.*

Les Russiens, KOSTOHRYZ. *Rzac.*

Les Suédois, NOET-WECKA; NOET-KRAKA. *Linn.*

Les Anglois, NUT-BREAKER. *Charlet.* NUT-CRACKER. *Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur d'une *Pie*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces neuf lignes. Le demi-bec supérieur depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces une ligne de long, & l'inférieur un pouce onze lignes; la queue quatre pouces neuf lignes; le pied dix-sept lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a un pied neuf pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des deux tiers de la longueur de la queue. Le dessus de la tête & l'occiput sont bruns. Les parties supérieure & inférieure du col sont couvertes de plumes brunes, qui ont chacune à leur bout une petite ligne longitudinale, blanche. Celles qui couvrent les joues

Ad *Picæ* crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & decem lineas æquat, & ad extremos ungues undecim pollices cum novem lineis. Mandibula superior ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & lineam unam longa est, inferior verò unum pollicem & undecim lineas; cauda quatuor pollices cum novem lineis; pes unum pollicem & quinque cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus laterales paululum longitudine excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & novem pollicum; alæ verò complicatæ paulò ultra duas tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput superius & occipitium fuscescunt. Partem colli superiorem, sicut &

inferiorem, vestiunt pennæ fuscæ, lineolâ longitudinali, albâ in apice donatæ. Quæ genas & colli latera obtegunt, eodem imbuuntur fusco, & similiter lineâ longitudinali, alba, sed latiori, notantur. Quæ dorsum & uropygium vestiunt, & scapulares pennæ sunt quoque fuscæ, & unaquæque in apice maculâ ovali, albâ prædita est. Pectus, venter & latera iisdem ac dorsum coloribus ornantur, sed majusculis maculis donantur albis, in pectore præsertim & ventre supremo. (In illa à *Gesnero* descripta totum corpus inferius luteum erat, maculis ferrugineis varium). Crura fusca sunt, nonnihil albo variegata, sed in parte posteriore tantum. Tectrices caudæ superiores nigricant, quibusdam ex majoribus minutissimâ maculâ albâ apice notatis : inferiores albescent. Alarum tectrices inferiores fuscæ, apicibus albis : superiores minores splendidè nigricantes, maculâ triangulari, albâ in apice notatæ : majores pariter nigricantes, sed immaculatæ, si tamen excipias majores à corpore remotiores, quarum unaquæque exiguâ maculâ albâ ter-

& les côtés du col, sont de la même couleur, & marquées de même d'une ligne longitudinale, blanche, mais plus large. Celles qui couvrent le dos & le croupion, ainsi que les plumes scapulaires, sont pareillement brunes, & ont chacune à leur bout une tache ovale, blanche. La poitrine, le ventre & les côtés sont de la même couleur que le dos, mais les taches blanches sont plus grandes, sur-tout à la poitrine & à la partie supérieure du ventre. (Celui qu'a décrit *Gesner*, avoit tout le dessous du corps d'un jaune varié de taches ferrugineuses). Les jambes sont brunes, & variées d'un peu de blanc à la partie postérieure seulement. Les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres, quelques-unes des plus grandes ayant à leur bout une très-petite tache blanche : celles du dessous de la queue sont blanches. Les couvertures du dessous de l'aile sont brunes & terminées de blanc : les petites du dessus sont d'un noirâtre brillant, & ont chacune à leur bout une tache triangulaire, blanche : les grandes sont du même noirâtre & sans taches, excepté cependant les plus grandes les plus éloignées du corps, dont chacune est termi-

née par une petite tache blanche. Les plumes de l'aile sont d'un noirâtre brillant : la sixième & la septième sont bordées de blanc par le bout ; & les suivantes, sçavoir depuis la huitième jusqu'à la quatorzième inclusivement, sont terminées par une très-petite tache blanche. La queue est composée de douze plumes d'un noirâtre brillant, & terminées de blanc : cette couleur s'étend d'autant plus loin, que la plume est plus extérieure. Les plumes qui couvrent les narines, sont longues, étroites, roides, d'un blanc sale & bordées de brun. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve en *Autriche*. Il se répand de temps en temps en différens cantons de l'Allemagne. En 1753 il en passa en *France* une très-grande quantité. Il se nourrit de noix, d'amandes, &c. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

minatur. Remiges splendide nigricant : sextæ & septimæ apices marginibus donantur albis ; & sequentes , ab octava scilicet ad decimam quartam usque inclusivè , in perexiguam maculam albam desinunt. Caudam componunt duodecim rectrices splendide nigricantes , apicibus albis : quæ albedo eò magis versùs pennæ exortum proceditur , quo rectrix fit exterior. Pennæ nares tegentes longæ sunt , strictiores , rigidæ , sordide albæ , marginibus fuscis. Oculorum irides avellanæ. Rostrum , pedes , unguesque nigri. Habitat in *Austria*. Varias *Germaniæ* regiones quandoque frequentat. Anno 1753 in *Galiam* magno numero advennerunt hujus speciei Aves. Nucibus , Amygdalis , &c. vivit. *Ex museo Reaumuriano.*

SECTION II.

Ceux dont les plumes de la base du bec sont tournées en-arrière , & laissent les narines à découvert.

Cette section contient trois genres d'Oiseaux. Les uns ont le bec droit , & dont le

SECTIO II.

Eæ quarum plumæ basis rostri retrorsum vertuntur , naresque detectas relinquunt.

Hæc sectio tribus constat generibus Avium. Aliæ rostro donantur recto ,

apice deorsum inclinante, ut *Galgulus* : aliæ rostro recto & acutissimo, ut *Icterus* : aliæ rostro quidem recto & acutissimo, sed paululum lateraliter compresso ; pennas insuper habent supra caudam binas totâ Ave longiores, & pinnulis per totam longitudinem, exceptis exortu & apice, destitutas, ut *Manucodiata*.

bout est un peu tourné vers le bas, comme le *Rollier* : d'autres ont le bec droit & très-pointu, comme le *Troupiale* : & d'autres ont aussi le bec droit & très-pointu, mais un peu comprimé par les côtés ; ils ont de plus au-dessus de la queue deux plumes plus longues que tout l'Oiseau, & qui n'ont des barbes qu'à leur origine & à leur bout, comme l'*Oiseau-de-Paradis*.

XVIII.

Genus Galguli. (1)

Hujus character est
Digiti quatuor ; membranis destituti ; tres scilicet anteriori, posticus unus ; omnes circiter usque ad exortum discreti :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum conico-elongatum, rectum ; apice deorsum inclinante :

Plumæ basis rostri retrorsum versæ ; naresque destectæ.

(1) *Galgulus*, nomen vacuum à me huic generi impositum.

XVIII.

Le genre du Rollier. (1)

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derrière ; tous séparés environ jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec en cône allongé, droit ; & son bout un peu tourné vers le bas :

Les plumes de la base du bec tournées en-arrière, & laissant les narines à découvert.

(1) *Rollier* est formé du mot *Roller*, qui est le nom qu'on donne à cet Oiseau aux environs de *Strasbourg*.

** I. LE ROLLIER.

Voyez Pl. V. fig. 2.

Galgulus superne dilutè fulvus, infernè cœruleo-beryllinus; rectricibus lateralibus superne obscurè viridibus, infernè viridi-beryllinis cœruleo-beryllino diluto terminatis; extimâ apice superne nigrâ, infernè cœruleo-violaceâ . . .
GALGULUS.

Garrulus, qui circa Argentoratum Roller appellatur. *Gesn. Avi. pag. 702, in qua icon non satis accurata.*

Garruli, vel Picæ glandariæ genus alterum. *Gesn. icon. Avi. pag. 27, in qua eadem icon.*

Garrulus Argentoratenfis. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 790. icones non satis accuratæ, maris pag. 791, & fæminæ pag. 792.*

Jonst. Avi. pag. 27. icones ab Aldrovando mutuata Tab. XVII, maris, sub titulo, Picæ glandariæ species alia; & fæminæ, sub titulo, Pica marina.

Garrulus Argentoratenfis Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 89. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 41. N°. 3.

Garrulus cœruleus, seu Pica cœrulea. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 57.*

Pica, seu Garrulus Argentoratenfis Aldrovandi. *Klein. Avi. pag. 62. N°. 7.*

Coracias. *Moehr. Avi. Gen. 5.*

Cornix cœrulea apud Misenos. *Gesn. icon. Avi. pag. 21, in qua icon minimè accurata.*

Cornix cœrulea. *Gesn. Avi. pag. 333, in qua eadem icon.*

Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 756. hujus icon minùs accurata pag. 757.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 243.

Mus. Worm. pag. 296.

Jonst. Avi. pag. 25. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XVII.

Linn. Systh. nat. ed. 6. Gen. 40. sp. 4.

Cornix cœrulea Gesneri. *Willugh. Ornith. pag. 85.*

Raj. Syn. Avi. pag. 42.

Cornix cœrulea Schwenckfeldii; Cornix picta; Cœruleus; Psittacus Germanicus. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 374.*

Cœruleus, seu Cornix cœrulea. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 274.*

Corvus dorso sanguineo; remigibus nigris; rectricibus viridibus. *Faun. Suec. Linn. N°. 73.*

Heiden Elster; Kugel Elster, Eberi & Peuceri. *Schwenck.*

Pica

Pica marina. Aldrov. *Avi. Tom. I. pag. 793. hujus icon non satis accurata*
pag. 794.

Jonst. Avi. pag. 27.

Willugh. Ornith. pag. 89.

Raj. Syn. Avi. pag. 41.

On l'appelle aux environs de Strasbourg. ROLLER. *Gesn. Aldrov.*

Les Boulonnois l'appellent PICA MARINA. *Aldrov.*

Les Allemands GALGEN-REGEL. *Gesn. Schwenck. Aldrov. Worm. Willugh.*

HALCK-REGEL. *Gesn. Aldrov. Willugh.* HALK-REGEL. WILDE GOLTZ-

KRAJE. *Worm.* GALS-KREGEL. *Schwenck.* MANDEL-KRAHE. *Schwenck.*

Rzac. BIRCK-HEHER. *Frisch; & quelques-uns, TEUTSCHER PAPPAGEY.*

Gesn. Aldrov. Willugh. DEUTSCHER PAPAGEY. *Schwenck.* TROSCH-

PAPEGOJE. *Worm. & d'autres, MERCOLFUS. Aldrov.*

Les Silésiens, RACHE. Schwenck. RACHER. Worm. BLAVE RACKE. Frisch.

Les Misniens, HOLTZ-KRAE. Schwenck. WILDE HOLTZ-KRAE. Gesn.

Aldrov.

Les Polonois, KRASKA. Rzac.

Les Suédois, SPANSK KRAOKA. Linn.

Les Smolandois, BLAO-KRAOKA. Linn.

Les Habitans de la Province de Skone, AELLE-KRAOKA. Linn.

Les Anglois, ROLLER. Willugh. Raj.

Ad Garruli nostratis craf-
fitem accedit. Ipsi longi-
tudo ab apice rostri ad cau-
dam extremam duodecim
pollices & sex lineas æquat,
& ad extremos ungues no-
vem pollices cum sex lineis.
Rostrum ab ipsius apice ad
oris angulos usque unum
pollicem & quinque lineas
longum est; cauda quatuor
pollices & septem lineas;
pes undecim lineas; & trium
digitorum anticorum me-
dius cum ungue tredecim
lineas: laterales paulò sunt
breviores; & posticus octo
lineas longitudine non su-
perat. Ab extremo ad extre-

Tome II.

Il est à peu près de la gros-
seur de *notre Geay*. Sa longueur
depuis le bout du bec jusqu'à
celui de la queue est de douze
pouces six lignes, & jusqu'à
celui des ongles de neuf pou-
ces six lignes. Son bec depuis
son bout jusqu'aux coins de la
bouche a un pouce cinq lignes
de long; sa queue quatre pou-
ces sept lignes; son pied onze
lignes; & celui du milieu des
trois doigts antérieurs, joint
avec l'ongle, treize lignes:
les latéraux sont un peu plus
courts; & celui de derrière n'a
que huit lignes de longueur. Il a
deux pieds de vol; & ses ailes,
lorsqu'elles sont pliées, s'é-

I

tendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont d'un bleu d'Aigue-marine, changeant en verd obscur. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un fauve clair. Le croupion & les petites couvertures du dessus de la queue sont variées de verd & de bleu-violet : les grandes sont d'un verd obscur. Il y a autour de la bête du bec quelques petites plumes d'un blanc sale. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un bleu d'Aigue-marine, varié de petites lignes plus claires & plus brillantes, qui s'étendent selon la longueur de la tige de chaque plume. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aile sont d'un bleu d'Aigue-marine clair. Les petites couvertures du dessus de l'aile sont d'un bleu-violet éclatant : les grandes les plus proches du corps sont d'un bleu d'Aigue-marine tirant un peu sur le verd obscur : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un bleu d'Aigue-marine très-clair, & terminées de bleu-violet ; leur tige est noire dans toute sa longueur. L'aile est composée de vingt-trois plumes, dont la seconde est la plus

mum alarum extensarum distantia est duorum pedum ; alæ verò complicatæ duas tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caput & partem colli superiorem vestiunt pennæ cœruleo-beryllinæ, viridi obscuro variantes. Dorsum & scapulares pennæ sunt dilutè fulvæ. Uropygium & tectrices caudæ superiores minores viridi & cœruleo-violaceo variegatæ : majores obscurè virides. Plumulæ sordidè albæ basin rostri ambiunt. Guttur & collum inferius sunt cœruleo-beryllina, lineolis dilutioribus & splendidioribus, secundum uniuscujusque pennæ scapum ductis, variegatæ. Pectus, venter, latera, crura, tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes sunt dilutè cœruleo-beryllinæ. Alarum tectrices superiores minores cœruleo-violaceæ splendentes : majores corpori viciniore cœruleo-beryllinæ ad viride obscurum nonnihil vergentes : majores à corpore remotiores dilutissimè cœruleo-beryllinæ, apicibus cœruleo-violaceis ; scapis insuper donantur per totam longitudinem nigris. Alarum componunt viginti tres

remiges , quarum secunda reliquas omnes longitudine excedit : tres priores infernè sunt in latere exteriori & apice nigræ , in latere interiore cœruleo-violaceæ ; superne verò in utroque latere nigræ , cum aliqua in latere exteriori obscurissimi viridis mixtura per totam primæ remigis longitudinem & versus apicem tantum secundæ & tertiæ ; in exortu tertiæ aliquid insuper cœruleo-violacei admiscetur : sequentes , à quarta scilicet ad decimam-nonam usque inclusivè , sunt in exortu dilutè cœruleo-beryllinæ , in reliqua longitudine superne nigræ , infernè in latere exteriori concolores , in latere interiore cœruleo-violaceæ : in istis remigibus cœruleo-beryllinus color magis in latere exteriori quàm in interiore protenditur , eumque à nigro separat color cœruleo-violaceus : vigesima griseo-fusca , dilutè fulvo & pauco viridi admixtis : tres denique corpori finitimæ in latere exteriori dilutè fulvæ , in latere verò interiore griseo-fuscæ , cum aliqua viridis mixtura. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ superne griseo-

longue de toutes : les trois premières sont en-dessous noires du côté extérieur & à leur bout , & d'un bleu-violet du côté intérieur ; & en-dessus elles sont noires , avec un peu de verd très-obscur mêlé du côté extérieur dans toute la longueur de la première & vers le bout seulement des deux autres ; la troisième a aussi un peu de bleu-violet vers son origine : les suivantes , sçavoir depuis la quatrième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement , sont à leur origine d'un bleu d'Aigue-marine clair , & dans le reste de leur longueur elles sont noires en-dessus , & en-dessous d'un bleu-violet du côté intérieur , & noires du côté extérieur : le bleu d'Aigue-marines'étend plus loin du côté extérieur que du côté intérieur , & est séparé du noir par un peu de bleu-violet : la vingtième est d'un gris-brun mêlé de fauve clair & d'un peu de verd : enfin les trois plus proches du corps sont d'un fauve clair du côté extérieur , & d'un gris-brun mêlé d'un peu de verd du côté intérieur. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont en-dessus d'un gris-brun mêlé d'une légère teinte de verd , & en-dessous d'un verd d'Aigue-marine : les quatre suivantes de

chaque côté font d'un verd obscur en-dessus, d'un verd d'Aigue-marine en-dessous, & terminées dessus & dessous de bleu d'Aigue-marine très-clair; cette couleur s'étend d'autant plus loin que la plume est plus extérieure; de plus la plus grande partie de leur côté intérieur est d'un gris-brun en-dessus & d'un bleu-violet en-dessous: la plus extérieure de chaque côté est variée des mêmes couleurs que ces dernières, excepté qu'elle n'a point de bleu-violet dans le dessous du côté intérieur, & que son bout est noir en-dessus & bleu-violet en-dessous. La tige des plumes latérales est noire. Le bec est noirâtre, excepté à sa base, où il jaunit un peu. Les narines sont longues & étroites, & placées obliquement sur le demi-bec supérieur auprès de son origine. Les pieds sont d'un jaunâtre sale; & les ongles sont noirâtres. Il se nourrit d'*Insectes*, & sur-tout de *Scarabés*. Il vient de temps en temps aux environs de *Straßbourg*: il passe à l'*Isle de Malthe*, & quelquefois en *France*. *M. de Reaumur* en a eu un, qui a été tué à quatre lieues de *Paris*, & qui lui a été envoyé par *M. de Cugnac*.

tantum leucis distante, & *D. de Reaumur* à *D. de Cugnac* dono datus.

fusca cum aliqua viridis mixtura, infernè viridi-beryllina: quatuor utrinque sequentes superne obscurè virides, infernè viridi-beryllina, apicibus superne & infernè dilutissimè coeruleo-beryllinis; qui color eò magis versùs pennæ exortum protenditur, quò rectrix fit exterior; lateris interioris insuper maxima pars est superne griseo-fusca, subtus verò coeruleo-violacea: utrinque extrema iisdem ornatur coloribus ac præcedentes; subtus tamen in latere interiore nil habet coeruleo-violacei, & apice donatur superne nigro, infernè coeruleo-violaceo. Lateralium rectricum scapi sunt nigri. Rostrum nigricat, basi exceptâ paululum flavescente. Nares longæ & strictiores supra mandibulam superiorem, prope ipsius exortum, obliquè collocantur. Pedes sordidè flavicant; ungues verò nigricant. *Insectis* victitat, præsertim *Scarabæis*. Regiones circa *Argentoratum* sitas quandoque frequentat: in *Melitam Insulam*, & interdum in *Galliam* migrat. Unus sclopo necatus est in pago à *Lutetia Parisiorum* quatuor

** 2. LE ROLLIER DE MINDANAO.

Voyez Pl. VI. fig. 1.

Galgulus superne fulvus ad olivaceum inclinans, infernè cœruleo-beryllinus; collo inferiore violaceo; rectricibus lateralibus primâ medietate saturatè cœruleis, alterâ medietate cœruleo-beryllinis, apice saturatè cœruleo
GALGULUS MINDANOENSIS.

Geay de Bengale. Alb. Tom. I. pag. 16; avec une figure très-mal coloriée Pl. 17.

Les Habitans de Mindanao l'appellent CUIT.

Garrulum crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudam extremam duodecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices & sex lineas; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas; extimus duodecim lineas; intimus novem cum semi lineas; & posticus septem lineas tantum. Alis extensis, extremitates majorum remigum unius pedis & octo pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ultra tres quartas longitudinis caudæ

Il est à peu près de la grosseur d'un *Geay*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes & demie de long; sa queue quatre pouces six lignes; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes; l'extérieur douze lignes; l'intérieur neuf lignes & demie; & celui de derrière sept lignes seulement. Il a un pied huit pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est verte: cette couleur tire sur

l'Aigue-marine au-dessus des yeux. La partie supérieure du col est d'un fauve tirant sur le violet. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un fauve mêlé de verd, ou plutôt d'un fauve changeant en verd d'olive selon les différents aspects sous lesquels elles se présentent. Les plumes qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion sont variées de bleu & de verd. Les plumes de la gorge sont d'un blanc-rouffâtre. Celles des joues & de la partie inférieure du col sont violettes, & ont chacune dans leur milieu une bande longitudinale, d'un blanc tirant sur le violet, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La poitrine est d'un roux tirant sur le violet. Le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aile sont d'un bleu d'Aigue-marine. Les couvertures du dessus de la queue & les petites du dessus de l'aile sont d'un très-beau bleu foncé : les grandes du dessus de l'aile, les plus éloignées du corps, sont d'un bleu d'Aigue-marine; celles qui occupent le milieu sont variées de bleu & de verd; & les plus proches du corps sont vertes. Les cinq premières plumes de l'aile sont en-dessus depuis leur ori-

partes protenduntur. Caput superius vestiunt pennæ viridi colore tinctæ, supra oculos ad beryllinum inclinante. Pars colli superior fulva, ad violaceum vergens. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ sunt fulvæ, viridi mixtæ, sive potius ex fulvo ad viridi-olivaceum inclinant, pro vario quo lucis radii incidunt modo. Pars dorsi infima & uropygium pennis vestiuntur cœruleo & viridi variegatis. Quæ guttur obtegunt, ex albo rufescunt. Quæ genas & partem colli inferiorem vestiunt, sunt violacæ, & unaquæque in medio taniâ donatur longitudinali, ex albo ad violaceum vergente, secundum scapi longitudinem ductâ. Pectus ex rufo ad violaceum inclinat. Venter, latera, crura, tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes cœruleo-beryllinæ. Tectrices caudæ superiores, sicut & alarum superiores minores, saturato cœruleo splendenti tinguntur : alarum superiores majores, à corpore remotiores, sunt cœruleo-beryllinæ; medium locum occupantes cœruleo & viridi variegatæ; corpori tandem viciniore virides. Pri-

mores quinque remiges superne ab exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque sunt saturatè cœruleæ, exceptâ tamen lateris interioris medietate versùs margines nigricante, infernè autem in latere exteriore nigricantes, in interiore saturatè cœruleæ : in reliqua longitudine superne & infernè cœruleo-beryllinæ, excepto apice superne & in latere interiore tantùm saturatè cœruleo : quatuor sequentes ab exortu ad mediam circiter longitudinem cœruleo-beryllinæ, à medietate ad apicem saturatè cœruleæ, exceptâ lateris interioris medietate superne versùs margines nigricante : sex sequentes, à decima scilicet ad quintam-decimam inclusivè, iisdem coloribus & eodem modo ac quatuor præcedentes variegantur ; hæc tamen est differentia, quod in parte superiore cœruleo-beryllinus color sit saturatior, & cum paucò cœruleo mixtus : corpori tandem finitimæ scapularibus pennis concolores. Uniuscujusque remigis, sicut & uniuscujusque rectricis, scapi sunt in tota longitudine nigri. Duodecim rectricibus

gine jusque vers les deux tiers de leur longueur d'un bleu foncé, excepté la moitié de leur côté intérieur vers les bords, qui est noirâtre ; & en-dessous elles sont noirâtres du côté extérieur, & d'un bleu foncé du côté intérieur : le reste de leur longueur est en-dessus & en-dessous d'un bleu d'Aigue-marine, excepté leur bout, qui est d'un bleu foncé en-dessus & du côté intérieur seulement : les quatre suivantes sont depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur d'un bleu d'Aigue-marine ; le reste de leur longueur est d'un bleu foncé, excepté la moitié du dessus de leur côté intérieur vers les bords, qui est noirâtre : les six qui suivent, sçavoir depuis la dixième jusqu'à la quinzième inclusivement, sont variées des mêmes couleurs & de la même façon que ces quatre dernières, excepté le bleu d'Aigue-marine de la partie supérieure, qui est plus foncé & mêlé d'un peu de bleu : enfin les plus proches du corps sont de la même couleur que les plumes scapulaires : de plus la tige de chacune des plumes de l'aile & de la queue est noire dans toute sa longueur. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un

verd sombre, varié d'un peu de bleu tout le long de leur tige : toutes les latérales sont d'un bleu foncé depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, excepté la moitié du dessus de leur côté intérieur vers les bords, qui est noirâtre ; depuis la moitié de leur longueur jusque vers leur bout elles sont d'un bleu d'Aigue-marine, & leur bout est d'un bleu foncé. Le bec & les ongles sont noirâtres ; & les pieds sont gris. On le trouve à *Bengale*, & dans *l'Isle de Mindanao*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

cauda constat : binæ intermediæ obscurè virides, paucò cœruleo secundùm scapî longitudinem variegatæ : laterales ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque saturatè cœruleæ, exceptâ lateris interioris medietate superne versùs margines nigricante ; à medietate verò circiter ad apicem cœruleo - beryllinæ , apice saturatè cœruleo. Rostrum, unguisque nigricant. Pedes sunt grisei. Habitat in *Bengalensi* regione & *Mindanao Insula*, unde in *musæum D. Aubry* missus est.

** 3. LE ROLLIER D'ANGOLA.

Voyez Pl. VII. Fig. 1.

Galgulus superne fulvus ad olivaceum inclinans, infernè cœruleo-beryllinus ; collo inferiore violaceo ; rectricibus lateralibus cœruleo-beryllinis, apice saturatè cœruleis, exceptâ extimâ longissimâ & apice nigricante GALGULUS ANGOLENSIS.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Geay*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de

Ad *Garruli* crassitiem circiter accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem &

& septem lineas longum est; decem rectrices intermediae quatuor pollices cum linea una; rectrix utrinque extrema octo pollices cum tribus lineis; pes novem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duodecim cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus omnium brevissimus. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & decem pollicum; alæ verò complicatæ ad trium pollicum & totidem linearum distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Pennæ virides partes capitis & colli superiores obtegunt. Pars dorfi suprema & scapulares pennæ sunt fulvæ, & viridi mixtæ, sive potius ex fulvo ad viridi-olivaceum inclinantes secundum varios ad lumen aspectus. Dorfi pars infima, uropygium & rectrices alarum superiores minores splendide cœruleæ. Rectrices caudæ superiores cœruleo & beryllino variæ. Guttur, partem colli inferiorem & pectus vestiunt pennæ violacæ; pennæ autem guttur & partem colli inferiorem cooperientes singu-

Tome II.

long; toutes les plumes intermediaires de sa queue quatre pouces une ligne, & la plus extérieure de chaque côté huit pouces trois lignes; son pied neuf lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, douze lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de tous. Il a un pied dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à trois pouces trois lignes au-delà de l'origine de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont vertes. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un fauve mêlé de verd, ou plutôt d'un fauve changeant en verd d'olive selon les différens aspects sous lesquels elles se présentent. La partie inférieure du dos, le croupion & les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un beau bleu. Les couvertures du dessus de la queue sont variées de bleu & d'Aigue-marine. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont violettes; & chaque plume de la gorge & de la partie inférieure du col a dans son milieu une ligne blanche, qui s'étend selon la longueur de sa tige. Le ventre, les côtés, les jam-

K

bes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle sont d'un bleu d'Aigue-marine. Les grandes couvertures du dessus de l'aîle sont variées de bleu, d'Aigue-marine & de verd. Les plumes de l'aîle sont d'un bleu d'Aigue-marine depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; le reste est en-dessus d'un bleu très-foncé du côté extérieur & noir du côté intérieur, & au contraire en-dessous il est noir du côté extérieur & d'un bleu très-foncé du côté intérieur: de plus la tige de chaque plume est noire dans toute sa longueur. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un verd sombre: les latérales sont d'un bleu d'Aigue-marine & terminées de bleu foncé, excepté la plus extérieure de chaque côté, dont la partie, qui excède la longueur des autres, est noire. La tige de chaque plume est de cette dernière couleur dans toute sa longueur. Le bec & les ongles sont noirâtres; & les pieds gris. On le trouve dans le royaume d'*Angola*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur*.

læ in medio lineâ donantur albâ, secundum scapi longitudinem ductâ. Venter, latera, crura, tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes sunt cœruleo-beryllinæ. Tectrices alarum superiores majores cœruleo, beryllino & viridi variegantur. Remiges ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque cœruleo-beryllinæ; à medietate ad apicem superne in latere exteriori saturatissimo cœruleo tinctæ, in latere interiore nigrae, & vice versâ subtus in latere exteriori nigrae, in interiore verò saturatissimè cœruleæ: quælibet insuper remix scapo donatur per totam longitudinem nigro. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae sunt obscurè virides: laterales autem cœruleo-beryllinæ, apice saturatè cœruleæ, exceptâ tamen utrinque extimâ, cujus pars reliquarum longitudinem excedens nigricat. Omnium rectricum scapi sunt etiam in tota longitudine nigri. Rostrum, unguesque nigricantes; pedes verò grisei. Habitat in *Angolensi* regno, unde in *museum Realmurianum* missus.

** 4. LE ROLLIER DES INDES.

Voyez Pl. VII. fig. 2.

Galgulus superne obscurè viridis, inferne viridi-beryllinus;
gutturè splendide cœruleo; rectricibus lateralibus primum
viridibus, deinde saturatè cœruleis, apice nigris
GALGULUS INDICUS.

An Cissa Americana, ex Amethystino nigricans? *Barr. Ornith. Class. III.*
Gen. XX. sp. 4.

Præcedentem crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos septemdecim lineas longum est; cauda tres pollices cum octo lineis; pes octo lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duodecim cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum intimum longitudine ferè adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & decem pollicum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam pertingunt. Caput & collum superius fusca sunt. Dorsum, uropygium, scapulares pennæ, alarum

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix-sept lignes de long; sa queue trois pouces huit lignes; son pied huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, douze lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est presque aussi long que l'intérieur de ceux de devant. Il a vingt-deux pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont brunes. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles

du dessus de la queue sont d'un verd sombre ou mêlé de brun. La gorge est d'un beau bleu : cette couleur s'éclaircit au milieu de chaque plume, & forme une petite ligne, qui s'étend selon la longueur de la tige. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aile sont d'un verd tirant sur l'Aigue-marine. Les plumes de l'aile (excepté les trois plus proches du corps) sont en-dessus noires du côté intérieur & à leur bout & d'un bleu très-foncé du côté extérieur, & au contraire en-dessous elles sont noires du côté extérieur & à leur bout & d'un bleu très-foncé du côté intérieur. Les six premières ont vers leur milieu une large bande transversale, d'un bleu d'Aigue-marine claire, qui s'étend dans toute la largeur de la plume, excepté la première, de laquelle cette couleur n'occupe que le côté intérieur. Les trois moyennes plumes de l'aile les plus proches du corps sont du même verd que le dos. La queue est composée de douze plumes d'égale longueur : les deux du milieu sont vertes à leur origine & terminées de noir : les latérales sont d'abord

teñtrices superiores & pennæ caudam superne tegentes virides, sed obscurè aut fusco mixtæ. Guttur splendide cœruleum : qui color in medio cujuslibet pennæ fit dilutior, & lineolam, secundum scapi longitudinem extensam, efficit. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, teñtrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus cooperientes ex viridi ad beryllinum colorem inclinant. Remiges (tribus corpori vicinioribus exceptis) superne in latere interiore & apice nigræ & in latere exteriori saturatissime cœruleæ, & è contrario subtus in latere exteriori & apice nigræ, ad latus interius saturatissimo cœruleo tinctæ. Sex priores remiges versus mediam longitudinem latâ notantur taniâ transversâ, dilutè cœruleo-beryllinâ, totam pennæ latitudinem occupante, si tamen excipias primam remigem, in qua color beryllinus ad latus tantum interius protrahitur: remiges tres minores corpori viciniore eodem viridi tinguntur, quo dorsum ipsum imbuitur. Cauda constat duodecim rectricibus longitudine æquali-

bus : binæ intermediæ sunt in exortu virides, in reliqua longitudine nigræ : laterales autem primùm virides, deinde saturatè cœruleæ, & apice nigræ. Rostrum, pedesque flavicantes; ungues nigricantes. Habitat in *India Orientali*, unde missus ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

vertes, ensuite d'un bleu foncé, & terminées de noir. Le bec & les pieds sont jaunâtres; & les ongles noirâtres. On le trouve aux *Indes Orientales*, d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

** 5. LE ROLLIER DE LA CHINE.

Voyez Pl. VI. fig. 2.

Galgulus superne viridis, infernè albo-flavescens cum aliqua viridis mixtura; taniâ utrinque in capite nigrâ, per oculos ductâ; rectricibus lateralibus exterius viridibus, interioribus cinereo-albis ad viride inclinantibus, nigricante terminatis, apice cinereo-albo ad viride vergente.... GALGULUS SINENSIS.

Præcedentes crassitie cœter æmulatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octodecim lineas longum est; cauda quinque pollices; pes unum pollicem & octo cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas: laterales paulò sunt breviores;

Il est à peu près de la grosseur des précédens. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce six lignes de long; sa queue cinq pouces; son pied un pouce huit lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de

derrière est presque aussi long que celui du milieu des trois antérieurs. Il a quinze pouces de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont vertes. De chaque côté de la tête est une large bande noire, qui s'étend depuis le bec jusqu'à l'occiput, en passant par les yeux. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-jaunâtre, mêlé d'une teinte de verd. Les jambes sont grises. Les couvertures du dessous de l'aile sont d'un gris-brun : celles du dessus sont d'un brun tirant sur l'olivâtre. L'aile est composée de dix-huit plumes, dont la première est très-courte, & la cinquième est la plus longue de toutes : les cinq premières sont d'un brun tirant sur l'olivâtre, plus sombre du côté intérieur que du côté extérieur : les trois suivantes sont de la même couleur, excepté qu'il y a un peu de marron mêlé du côté extérieur le long de la tige de chaque plume : la neuvième & la dixième sont d'un marron du côté extérieur,

& posticus anticorum medium longitudine ferè adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ virides. Tectrices caudæ superiores concolores. In utroque capitis latere lata extat tania nigra, à rostro ad occipitium usque protensa, & per oculos ducta. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, & tectrices caudæ inferiores ex albo flavicant, viridi admixto. Crura grisea sunt. Alarum tectrices inferiores griseo-fuscæ : superiores ex fusco ad olivaceum inclinantes. Alam componunt octodecim remiges, quarum prior brevissima, quinta verò omnium longissima : quinque primores ex fusco ad olivaceum vergunt, in latere interiore obscuriùs, in exteriore dilutiùs : tres sequentes concolores, attamen in latere exteriore secundum cujuslibet pennæ scapum paululùm castanei admiscetur : nona & decima in la-

tere exteriore castaneæ, in interiore ex fusco ad castaneum vergentes : undecima & duodecima exteriùs ex fusco ad olivaceum incli- nantes, cum aliqua secun- dum pennæ scapum casta- nei mixtura, & interiùs ex fusco ad olivaceum quoque vergentes, sed saturatiùs : tres sequentes, à decima- tertia scilicet ad decimam- quintam usque inclusivè, ex fusco ad olivaceum vergunt : tres denique posteriores con- colores, sed apice albæ, cum aliqua viridis mixtura. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ dorso concolores : laterales omnes ab exortu ad duas cir- citer tertias longitudinis par- tes usque in latere exteriore virides, in interiore ex ci- nereo-albo ad viride incli- nantes, in reliqua longitu- dine nigricantes, apicibus tamen cinereo-albis ad vi- ride vergentibus. Color ni- gricans in unaquaque pen- na eò majus spatium tingit, & color cinereo-albus eò minus spatium occupat, quò rectrix fit exterior. Binæ rec- trices intermediæ lateralibus sunt longiores ; laterales au- tem gradatim fiunt brevior- es ad utrinque extimam,

& d'un brun tirant sur le marron du côté intérieur : les onzième & douzième sont du côté extérieur d'un brun tirant sur l'olivâtre, avec un peu de mar- ron mêlé le long de la tige de chaque plume, & leur côté in- térieur est aussi d'un brun tirant sur l'olivâtre, mais plus foncé : les trois suivantes, sçavoir de- puis la trezième jusqu'à la quin- zième inclusivement, sont d'un brun tirant sur l'olivâtre : les trois dernières sont de la mê- me couleur, & terminées d'un blanc mêlé d'une légère teinte de verd. La queue est com- posée de douze plumes : les deux du milieu sont du même verd que le dos : toutes les latérales depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur sont vertes du côté extérieur, & d'un gris- blanc tirant sur le verd du côté intérieur ; le reste de leur lon- gueur est noirâtre & terminé de gris-blanc tirant sur le verd. Il y a d'autant plus de noirâ- tre & d'autant moins de gris- blanc, que la plume est plus ex- térieure. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales, qui vont en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est rou-

ge. Le bec est de la même couleur. Les pieds & les ongles sont d'un rouge pâle. On le trouve à la *Chine*, d'où il a été apporté à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

omnium brevissimam. Oculorum irides rubescunt. Rostrum eodem imbuatur colore. Pedes, unguisque pallide rubri. Habitat in *Sinensi* regione, unde in *museum D. Aubry* missus est.

6. LE ROLLIER DES ANTILLES.

Galgulus superne ferrugineus, inferne albus; collo cœruleo; albo torque cincto; uropygio luteo; rectricibus cœruleis, albo colore variis; rostro, pedibusque rubris.... GALGULUS ANTILLARUM.

Pica caudata Indica. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 788. icones non satis accuratæ, maris pag. 786, & fœminæ pag. 787. Jonst. Avi. pag. 27. maris & fœminæ icones ab Aldrovando mutuata Tab. XVII.

Willugh. Ornith. pag. 90. N°. 1.

Charlet. Exer. pag. 76. N°. 1.

Charlet. Onomast. pag. 68. N°. 1.

Pica caudata Indica, seu Japonensis Aldrovandi. Raj. Syn. Avi. pag. 42. N°. 6.

Pica Antillarum. Raj. Syn. Avi. pag. 152.

Pie des Antilles. Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 258; avec une très-mauvaise figure pag. 246. N°. 6.

Les Anglois l'appellent JAPAN PIE. Charlet.

Il est à peu près de la grosseur de notre *Pie*. Sa tête est bleue. Son col est de la même couleur, & entouré d'un collier blanc. Sur le sommet de la tête s'étend depuis l'origine du demi-bec supérieur jusqu'au dos, en passant entre les deux yeux, une tache blanche, longue de trois pouces & large seule-

Picam nostratem crassitie circiter æquat. Caput & colum, quod torquis albus ambit, sunt cœrulea. In summo capite à superiore rostri parte, inter utrumque oculum, alba macula tres ferè pollices longa & unciam lata, lineolis transversis, nigris striata, ad dorsum usque protenditur.

tenditur. Dorsum & scapulares pennæ ferrugineæ. Uropygium & rectrices caudæ superiores luteæ. Pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores albæ. Quæ alas subtus cooperiunt pennæ leucophææ ad cœruleum vergentes. Superiores alarum rectrices minimæ sunt castaneæ, lineis crassiusculis, nigris, per longitudinem positis, respersæ; mediæ rectrices pennæ virides, marginibus saturatiùs viridibus; majores tandem cœruleæ, scapis & marginibus ad albedinem vergentibus. Remiges cœruleæ, cum pauco viridi admixto. Rectrices cœruleæ, lineis transversis, albis striatæ. (Secundùm *Aldrovandum* rectrices binæ intermediæ sunt totæ cœruleæ, exceptis tamen scapo & extremitatibus albis: laterales omnes ab exortu ad medietatem usque cœruleæ, alterâ medietate candidæ, quos inter colores lata tænia transversa, cœrulea quidem, sed colore adeo intenso, ut quasi ad nigredinem accedere videatur, percurrit). Rectrices binæ intermediæ laterales octo decemve pollicum longitudine excedunt; laterales

Tome II.

ment d'un pouce, rayée de petites lignes transversales, noires. Le dos & les plumes scapulaires sont d'une couleur ferrugineuse. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont jaunes. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Celles du dessous de l'aîle sont d'un gris tirant sur le bleu. Les plus petites couvertures du dessus de l'aîle sont d'un marron varié de lignes longitudinales, noires & assez larges; les moyennes sont d'un verd plus foncé sur les bords qu'au milieu; & les grandes sont d'un bleu, qui tire sur le blanc sur les bords & les tiges de chaque plume. Les plumes des aîles sont bleues, & mêlées d'un peu de verd. Celles de la queue sont d'un bleu rayé transversalement de lignes blanches. (Selon *Aldrovande* les deux plumes du milieu de la queue sont toutes bleues, excepté cependant leur tige & leur extrémité, qui sont blanches: toutes les latérales sont bleues depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur longueur, l'autre moitié est blanche; & ces deux couleurs sont séparées par une large bande transversale, d'un bleu si foncé, qu'il paroît pres-

L

que noir). Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales de huit ou dix pouces ; & ces dernières vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus

verò gradatim longitudine minuuntur, ad extimam usque brevior. Rostrum, pedesque rubri.

La femelle ressemble en tout à son mâle, excepté que la tache blanche, qu'elle a sur le sommet de la tête, n'est point rayée de lignes noires. Elle en diffère encore en ce que les grandes couvertures du dessus de ses ailes sont vertes, tandis que dans le mâle elles sont bleues.

extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec & les pieds sont rouges.

Fœmina mari per omnia similis est, exceptâ tamen maculâ in summo capite albâ lineis nigris carente. In ea quoque teatrices alarum superiores majores virescunt, quæ in mare sunt cœruleæ.

On les trouve aux *Isles Antilles* : ils sont communs sur les bords des rivières de la *Gua-deloupe*.

Habitant in *Antillis Insulis* : ad ripas fluviorum in *Aquis Lupiis* frequentes.

LE ROLLIER DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

Corvus ex rufo cinereus ; remigibus, rectricibusque saturatè
viridibus GYGIS NOVÆ HISPANIÆ.

Cornix Corvina. Klein. Avi. pag. 59. N°. 10.

Aquila minor, species corvi, Ytzquauhtli dicta, ex Novâ Hispaniâ. Seb. Vol. I. pag. 97. hujus icon non satis accurata Tab. LXI. fig. 2.

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur de la *Corneille ordinaire*. Tout son corps est couvert de plumes d'un roux-cendré, mêlées de quelques autres plumes d'une couleur plus claire. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un verd foncé, & quelques-unes sont

Magnitudine & crassitie *Cornicem vulgarem* circiter æquat. Pennæ totum corpus vestientes sunt ex rufo cinereæ, & intermixtis coloris dilutioris pennis variantur. Alarum teatrices superiores saturatè virides ; pennarum nonnullis ex di-

lutè rufo obumbratis. Remiges & rectrices saturato virore elegantissimo tinguntur. Rostrum cinereo-flavum. Habitat in *Nova Hispania*. Secundùm *Sebam*, *Leporibus*, *Cuniculis* aliisque feris inhiat.

nuancées d'un roux clair. Les plumes des aîles & celles de la queue sont d'un très-beau verd foncé. Le bec est d'un cendré-jaune. On le trouve à la *Nouvelle Espagne*. Selon *Seba*, il donne la chasse aux *Lièvres*, aux *Lapins*, & à d'autres animaux semblables.

8. LE ROLLIER DU MEXIQUE.

Galgulus superne obscurè griseus, ad rufum inclinans, infernè dilutè griseus, flammæ colore variegatus; alis dilutè griseis, flammæ colore variegatis GALGULUS MEXICANUS.

Pica, Merula Mexicana. *Klein. Avi. pag. 62. N° 5.*

Merula Mexicana. *Seb. Vol. I. pag. 101. hujus icon minùs accurata Tab. LXIV. fig. 5.*

Magnitudine & crassitie *Turdum majorem* multùm superat. Totum corpus superius ex obscurè griseo ad rufum inclinat : corpus verò inferius, sicut & tota alarum superficies, est dilutè griseum, flammæ colore variegatum. Habitat in *Mexico*.

Il est beaucoup plus grand & plus gros que la *grosse Grive*. Tout le dessus de son corps est d'un gris obscur, tirant sur le roux : & le dessous, ainsi que les aîles, est d'un gris clair, varié de couleur de feu. On le trouve au *Mexique*.

9. LE ROLLIER JAUNE DU MEXIQUE.

Galgulus dilutè flavus; remigibus & rectricibus intermediis saturatè griseis GALGULUS MEXICANUS LUTEUS.

Cornix flava, alis caudâque cinereis. *Klein. Avi. pag. 59. N° 9.*

Hoexotototl, seu Avis Saligna dicta. *Seb. Vol. I. pag. 96. hujus icon non satis accurata Tab. LXI. fig. 1.*

Il n'est guères plus gros que le *Pigeon ordinaire*. Tout son corps est couvert de plumes d'un jaune clair. Les plumes des ailes sont d'un gris foncé. Celles du milieu de la queue sont de la même couleur : les latérales sont d'un jaune clair. Ses yeux sont grands ; leur iris est rouge. Le bec est court, épais & d'un cendré-jaune. Les pieds sont d'un gris clair. Les Oiseaux de cette espèce se plaisent beaucoup sur les saules : ils s'y rassemblent par troupes, & y font leur nid. On les trouve au *Mexique*.

Columbam vulgarem magnitudine non multum superat. In toto corpore vestitur pennis dilutè flavis. Alarum remiges saturatè griseus tingit color. Rectrices intermediae concolores : laterales verò dilutè flavæ. Oculos habet prægrandes, quorum irides rubent. Rostrum crassum & breve, ex cinereo flavum. Pedes dilutè grisei sunt. Avium hæc species salices amat, inque his turmatim sese congregans, nidificat. Habitat in *Mexico*.

10. LE ROLLIER HUPÉ DU MEXIQUE.

Galgulus cristatus, viridi, cœruleo & aureo resplendens ; remigibus dilutè purpureis, apice nigricantibus ; rectricibus apice nigricantibus *GALGULUS MEXICANUS CRISTATUS*.

Corvus cristatus. *Klein. Avi. pag. 58. N°. 3.*

Avis Oocolin, seu *Perdix montana Mexicana*. *Seb. Vol. I. pag. 100. hujus icon minimè accurata Tab. LXIV. fig. 1.*

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur de notre *Corneille*. Il est varié par tout le corps de verd, de bleu, & d'une couleur d'or brillante, excepté les côtés, qui sont noirâtres. Les ailes sont d'un pourpre clair ; il faut en excepter cependant les bouts des grandes plumes, qui, de même

Cornicem nostratem magnitudine & crassitie circiter æquat. Totum corpus ex viridi, cœruleo & aureo colore resplendet, si tamen excipias pennas latera vestientes, quæ nigricant. Alas diluta tingit purpura ; attamen apices pennarum remigum, sicut & rectricum



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Casse-noix.

2. Rollier.



Fig. 2.

Fig. 1.

6
5
4
3
2
1
Echelle de six pouces

Martinet del. et sculp.

1. Rollier de Mindanao.

2. Rollier de la Chine.



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Rollier d'Angola.

2. Rollier des Indes.

penitùs nigricant. Plumæ crura vestientes, sunt longiusculæ. Avis ista prolixam in capite cristam elegantem gerit. Oculos habet lucidos; palpebras sanguineo penitùs colore tinctas, exilibusque excrescentiis in ambitu munitas. Rostrum breve, crassum & subrubens. Pedes valdè breves & crassi; ungues verò longi. Habitat in *Mexico*.

que ceux des plumes de la queue, sont noirâtres. Celles qui couvrent les jambes sont assez longues. Cet Oiseau porte sur la tête une grande & belle hupe. Ses yeux sont brillants : ses paupieres sont d'un rouge de sang, & toutes entourées de petites excroissances charnues. Le bec est court, épais & rougeâtre. Les pieds sont pareillement très-courts & épais; & les ongles sont longs. On le trouve au *Mexique*

XIX.

Genus Icteri. (1)

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Rostrum conico-elongatum, rectum, acutissimum:

Plumæ basis rostri retrorsum versæ; naresque detectæ.

(1) *Icterus*, à colore luteo plurimarum hujus generis specierum.

XIX.

Le genre du Troupiale. (1)

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Le bec en cone allongé, droit, & très-pointu:

Les plumes de la bête du bec tournées en-arriere, & laissant les narines à découvert.

(1) *Troupiale*, nom qu'on donne en Amérique à quelques especes de ce genre.

* * I. LE TROUPIALE.

Voyez Pl. VIII. Fig. 1.

Icterus flavo-aurantius ; capite , collo inferiore & dorso splendide nigris ; alarum tectricibus majoribus albis ; remigibus , rectricibusque nigris ; oris exterioribus minorum remigum albis **ICTERUS.**

Cissa nigra cirrata , caudâ luteâ. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 40. sp. 9.*

Cissa Americana , nigra , cirrata , caudâ luteâ. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XX. sp. 6.*

Pica luteo-nigra varia. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 301. N°. XX. hujus icon non satis accurata Tab. 259. fig. 4.*

Raj. Syn. Avi. pag. 181. N°. 10.

Pica ex luteo & nigro varia. *Klein. Avi. pag. 63. N°. 10.*

Picus pullus cirratus , caudâ luteâ. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 41. sp. 9.*

Picus major , pullus , cirratus , caudâ luteâ , nidum suspendens. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 141.*

Picus Americanus , major , pullus , cirratus , caudâ luteâ , nidum suspendens. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XIII. sp. 5.*

Picus Americanus nidum suspendens , Guira-Tangeima Brasiliensium Marcgravio. *Willugh. Ornith. pag. 97. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXIII.*

Guira-Tangeima Brasiliensium Marcgravii , seu *Picus nidum suspendens.* *Raj. Syn. Avi. pag. 45. N°. 6.*

Guira-Tangeima Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 192 , in qua hujus pessima icon.*

Jonst. Avi. pag. 132. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 57.

Turdus luteo-niger ; gutture piloso ; capite , gulâ , rostroque , dorso , caudâque nigris ; cervice , uropygio & toto ventre luteis ; alis nigris ; tectricibus albo fimbriatis ; rostro unciali. *Klein. Avi. pag. 70. N°. 33.*

Turdus oculis cœruleis. *Klein. Avi. pag. 69. N°. 20.*

Xanthornus major , nigro varius. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 477.*

Pie jaune & noire. *Catesb. Append. pag. 5 ; avec une figure exacte Pl. 5.*

Oiseau de Banana. *Alb. Tom. II. pag. 27 ; avec une figure mal coloriée Pl. 40.*

Les Anglois l'appellent YELLOW WOODPECKER. *Sloane. YELLOW AND BLACK PIE.* *Sloane. Raj. BANANA BIRD FROM JAMAICA. Alb.*

Les Anglois de la Jamaïque , *LARGE BANANA-BIRD.* *Browne.*

Les François de la Guiane , *CUL-JAUNE.* *Barr.*

Les Indiens de la Guiane , *YAPOU.* *Barr.*

Les Brasiliens *GUIRA-TANGEIMA.* *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.*

Merulam crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quindecim lineas longum est; cauda quatuor pollices cum tribus lineis; pes sexdecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem protenduntur. Caput, guttur, partem colli inferiorem & dorsum vestiunt pennæ splendide nigræ. Quæ guttur obtegunt, longæ sunt & stric-tissimæ. Superior pars & latera colli, uropygium, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam superne & infernè tegentes, alarum tectrices inferiores, & superiores minores splendidissimo imbuuntur flavo-aurantio. Alarum tectrices superiores majores, à corpore

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue quatre pouces trois lignes; son pied seize lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a quatorze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ au tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, la partie inférieure du col & le dos sont d'un très-beau noir. Les plumes de la gorge sont longues & fort étroites. La partie supérieure & les côtés du col, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les petites du dessus sont d'un très-beau jaune-orangé. Les grandes couvertures du dessus des ailes les plus éloignées du corps sont noires; les plus proches du corps sont blanches. Les

plumes de la queue & les grandes des ailes sont noires : les moyennes sont de la même couleur, & ont leur bord extérieur blanc. La prunelle des yeux est noirâtre ; & leur iris est jaunâtre. Le bec est gris-blanc dans quelques-uns, & dans d'autres il est noir, excepté la base du demi-bec inférieur, qui a quelque chose de brun. Les pieds & les ongles sont d'une couleur de plomb. Les Oiseaux de cette espèce font des nids d'une figure cylindrique, & ils les attachent en grande quantité aux extrémités des petites branches des arbres les plus élevés, & assez volontiers de ceux qui sont les plus proches des maisons. On le trouve à la Caroline, à la Jamaïque, à la Martinique, à Cayenne, au Brésil & dans toute la Guiane. Il a été envoyé de Cayenne à M. de Reaumur par M. Artur.

remotiores sunt nigrae, corpori viciniore albae. Rectrices & majores remiges nigrae : minores remiges concolores, oris exterioribus albis. Oculorum pupilla nigricans ; ipsorum irides flavicantes. Rostrum in quibusdam cinereo-album, in aliis nigrum, exceptâ tamen basi mandibulae inferioris, in qua aliquid fusci admiscetur. Pedes, unguesque plumbei. Nidos construunt hujus speciei Aves cylindraceae figurae, eosque appendunt magno numero extremitatibus ramorum altissimarum arborum, idque libenter prope aedes. Habitat in Carolina, Jamaica, Martinica, Cayana, Brasilia & Guiana tota. A Cayana in museum Real-murianum missus à D. Artur.

2. LE TROUPIALE DU MEXIQUE.

Icterus flavus ; capite, remigibus, rectricibusque nigris ; tectricibus alarum superioribus majoribus aureo colore in apice notatis *ICTERUS MEXICANUS*.

Avis Americana de Acolchichi, nigro-lutea. Seb. Vol. I. pag. 90. hujus icon satis accurata Tab. LV. fig. 4.
Les Espagnols l'appellent TORDOS. Seb.

Il est un peu plus gros que le précédent. Il a la tête & la gorge noires. Le col, le dos,

Crassitie præcedentem non-nihil superat. Caput & guttur nigricant. Collum, dorsum,

sum, uropygium, pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores & superiores eleganti flavedine nitent. Rectrices alarum superiores minores nigræ; majores concolores, colore aureo in apice notatæ. Remiges, rectricesque nigræ. Rostrum luteo colore tinctum. Habitat in *America*, præsertim in *Mexico*.

le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un très-beau jaune. Les petites couvertures du dessus des ailes sont noires : les grandes sont de la même couleur, & ont chacune à leur bout une tache d'une belle couleur d'or. Les plumes des ailes & celles de la queue sont noires. Le bec est jaune. On le trouve en *Amérique*, & sur-tout au *Mexique*.

3. LE TROUPIALE A QUEUE ANNELÉE.

Icterus flavus; capite & collo nigris; remigibus nigricantibus, marginibus dilutè luteis; rectricibus taniâ transversâ, nigricante notatis . . . *ICTERUS CAUDA ANNULATA*.

Cornix flava. Klein. Avi. pag. 59. N°. 8.

Avis Ocotzinitzcan, Columbæ magnitudine. Seb. Vol. I. pag. 97. hujus icon satis accurata Tab. LXI. Fig. 3.

Magnitudine *Columbam* æmulator. Caput, guttur & collum nigro tinguntur colore. Per universum corpus, dorsum scilicet, uropygium, pectus, ventrem, latera & crura, flavus est, saturatiore flavedine adumbratus. Rectrices caudæ superiores & inferiores, sicut & alarum rectrices minores, concolores. Alarum rectrices majores & remiges nigricantes, marginibus dilutè lu-

Il est de la grandeur d'un *Pigeon*. Sa tête, sa gorge & son col sont noirs. Tout son corps, sçavoir le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes, est couvert de plumes jaunes, nuancées d'un jaune plus foncé. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue, ainsi que les petites des ailes, sont de la même couleur. Les grandes couvertures & les plumes des ailes sont noîrâtres, & bordées de jaune clair.

Les plumes de la queue son jaunes , & chacune est marquée d'une large bande transversale , noirâtre , qui est d'autant plus éloignée du bout de la plume , que la plume est plus extérieure : de là vient que , lorsque l'Oiseau étend sa queue , toutes ces taches forment ensemble une bande en arc de cercle , dont la concavité est tournée vers le corps ; de sorte qu'il semble que la queue soit entourée d'un anneau. Le bec est jaune ; & les pieds sont gris. On le trouve en *Amérique*.

Reâtrices flavæ , omnes latâ taniâ transversâ , nigricante notatæ ; quæ tania eò magis à reâtriciis apice remotior est , quò reâtrix fit exterior : unde cùm caudam explicat Avis , taniæ istæ taniam arcuatam simul representant , cujus superficies concava versùs corpus vertitur ; quo fit ut cauda annulata videatur. Rostrum flavum ; pedes grisei. Habitat in *America*.

4. LE TROUPIALE DE MADRAST.

Icterus flavus , infernè lineolis obliquis , sinuosis , nigricantibus varius ; taniâ ovali per oculos nigricante ; remigibus nigricantibus ICTERUS MADERASPATANUS.

Pica Maderaspatana flavicans. Raj. Syn. Avi. pag. 194. N°. 8. hujus icon pessima Tab. I. Fig. 8.

Les Anglois l'appellent YELLOW-JAY. Raj.

Les Genils , WANGA PANDOOE PEDDA. Raj.

Il est à peu près de la grandeur de *notre Geay*. La tête , la gorge , le col , le dos , le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont jaunes. La poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur , & variées de petites lignes obliques & tortueuses , noirâtres. Il y a de

Garrulum nostratem magnitudine circiter æquat. Caput , guttur , collum , dorsum , uropygium & reâtrices caudæ superiores flavo tinguntur colore. Pectus , venter , latera , crura & reâtrices caudæ inferiores eodem colore imbuuntur , lineolisque obliquis , sinuosis , nigricantibus variegantur. In

LES OISEAUX , *Classe III. Ordre IV.* 91

utroque capitis latere tænia protenditur ovalis, nigricans, per oculos ducta. Alarum rectrices superiores, sicut & remiges, penitus nigrificant. Rectrices sunt flavæ. Habitat in *Maderaspatano*.

chaque côté de la tête une bande ovale, noirâtre, qui passe par les yeux. Les couvertures du dessus des aîles, ainsi que les plumes des aîles, sont noirâtres & sans mélange. Les plumes de la queue sont jaunes. On le trouve à *Madraſt*.

5. LE TROUPIALE TACHETÉ DE MADRAST.

Icterus flavus, maculis nigrificantibus varius; capite, collo, remigibus, rectricibusque nigrificantibus *ICTERUS MADERASPATANUS NÆVIUS*.

Pica Maderaspatana Sturni ad instar maculata. Raj. Syn. Avi. pag. 195.

N°. 9. hujus icon pessima Tab. I. Fig. 7.

Les Anglois l'appellent MOTLED-JAY. Raj.

Les Gentils, CUNDOE VANGA PANDOOE. Raj.

Præcedentem magnitudine adæquat. Caput, guttur & collum nigrificant. Dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ flavæ, maculis nigrificantibus variæ. Rectrices caudæ inferiores & superiores concolores. Alarum rectrices superiores, remiges & rectrices nigrifiantes. Habitat in *Maderaspatano*.

Il est de la grandeur du précédent. La tête, la gorge & le col sont couverts de plumes noirâtres. Le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un jaune varié de taches noirâtres. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Celles du dessus des aîles, les plumes des aîles & celles de la queue sont noirâtres. On le trouve à *Madraſt*.

6. LE TROUPIALE FAUVE DE MADRAST.

Icterus fulvus, lineolis rufo-fuscis varius; tæniâ obliquâ per oculos nigrâ; remigibus nigris, quibusdam maculâ flavâ

circa medium notatis, majoribus apice flavis. . . . ICTERUS
MADERASPATANUS FULVUS.

Pica Maderaspatana fulva, alis penè nigris. *Raj. Syn. Avi. pag. 194.*

N°. 7. hujus icon pessima Tab. I. Fig. 9.

Les Anglois l'appellent BUFF-JAY. Raj.

Les Gentils, VANGA PANDOOE. Raj.

Il est de la grandeur du précédent. Tout son corps est couvert de plumes fauves, rayées de petites lignes d'un roux-brun. De chaque côté de la tête est une bande oblique, noire, qui passe par les yeux. Les couvertures du dessus des ailes sont noires. Les plumes des ailes sont de la même couleur, excepté les bouts des grandes, qui sont jaunes. Quelques-unes de ces plumes sont aussi marquées d'une tache jaune vers la moitié de leur longueur. Les plumes du milieu de la queue sont noires, & terminées de jaune; les latérales sont blanches, & mêlées de jaune. On le trouve à *Madraſt.*

Præcedentem magnitudine æmulatur. In universo corpore pennis vestitur fulvis, lineolis rufo-fuscis interstinctis. In utroque capitatis latere tænia extenditur obliqua, nigra, per oculos ducta. Alarum tectrices superiores sunt nigræ. Remiges concolores, exceptis tamen majorum remigum apicibus flavis. Quædam insuper ex remigibus circa mediam longitudinem flavâ notantur maculâ. Rectrices intermediae nigræ sunt, apice excepto, qui flavus; laterales verò albæ, flavo mixtæ. Habitat in *Maderaspatano.*

7. LE TROUPIALE HUPÉ DE MADRAST.

Icterus cristatus, albus, lineis lunulatis, nigris respersus; capite & cristâ nigris; rectricibus binis intermediis longissimis. . . . ICTERUS MADERASPATANUS CRISTATUS.

Manucodiata Zeylanica, caudâ longissimâ forcipatâ bipenni. *Raj. Syn. Avi. pag. 22.*

Manucodiata cristata ex albo nigroque variata. *Raj. Syn. Avi. pag. 195.*

N°. 13. hujus icon satis accurata Tab. II. Fig. 13.

Les Anglois l'appellent PIED BIRD OF PARADISE. *Raj.*

Les Flamands, HER CATOEN DIEFJE. *Raj.*

Les Gentils, TELLA YEACO NARRY. *Raj.*

Les Zeyloniens, WALUHORA; WALLUHORA. *Raj.*

Quâ magnitudine donetur non indicat *Rajus*. Caput & guttur nigro tinguntur colore. In summo capite pennas gestat concolores, longiores, cristam efficientes. Totum reliquum corpus vestiunt pennæ albæ, lineis arcuatis sive lunulatis, nigris respersæ. Binæ rectrices intermedix laterales longitudine multum excedunt. Rostrum nigrum. Habitat in *Maderaspatano*.

Ray ne dit rien de sa grandeur. La tête & la gorge sont noires. Sur le sommet de la tête sont de longues plumes de la même couleur, qui forment une hupe. Tout le reste du corps est couvert de plumes blanches, variées de lignes noires, courbées en arc ou en forme de croissant. Les deux plumes du milieu de la queue sont beaucoup plus longues que les latérales. Le bec est noir. On le trouve à *Madraſt*.

8. LE TROUPIALE DU BRÉSIL.

Icterus superne ex fusco & nigro varius, infernè ex albo & flavo mixtus, lineis transversis nigricantibus respersus; capite nigricante; caudâ superius nigricante, inferius albo maculatâ *ICTERUS BRASILIENSIS*.

Luscinia pullo-lutea. *Klein. Avi. pag. 75. N°. 13.*

Muscicapa è fusco & luteo varia. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 309. N°. XLIII.*

Muscicapa Brasiliensibus Japacani dicta, *Marcgravii. Raj. Syn. Avi. pag. 186. N°. 35.*

Japacani Brasiliensis. Jonst. Avi. pag. 145.

Japacani Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 212.

Japacani Brasiliensibus Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 173.

Raj. Syn. Avi. pag. 84. N°. 12.

Les Anglois l'appellent SMALL YELLOW AND BROWN BIRD. *Sloane. Raj.*

Les Brasiliens, JAPACANI. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Magnitudine cum *Sturno* convenit. Caput pennis vestitur nigricantibus. Collum

Il est de la grandeur d'un *Etourneau*. La tête est couverte de plumes noirâtres. Celles qui

couvrent la partie supérieure du col, le dos & le croupion, sont variées de brun & de noir. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont mêlées de blanc & de jaune, & rayées de lignes transversales, noirâtres. Les ailes sont variées des mêmes couleurs que le dos. Le dessus de la queue est noirâtre, & le dessous est taché de blanc. La prunelle des yeux est noire; & leur iris est d'une couleur d'or. Le bec est noir. Les pieds sont bruns; & les ongles noirs & pointus. On le trouve au *Brésil* & à la *Jamaïque*.

superius, dorsum & uropygium obtegunt pennæ ex fusco & nigro variæ. Tectrices caudæ superiores concolores. Colli pars inferior, pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores sunt ex albo & flavo mixtæ, ac lineis seu striis transversis, nigricantibus respersæ. Alæ iisdem ac dorsum coloribus variegantur. Cauda superius nigricat, inferius albo maculata est. Oculorum pupilla nigra; ipsorum irides aureæ. Rostrum nigrum. Pedes fusci; ungues verò acuti, nigri. Habitat in *Brasilia* & *Jamaica*.

9. LE TROUPIALE DE BENGAL.

Icterus superne niger, infernè albus; taniâ albâ, per oculos ductâ, occipitium cingente; remigibus, rectricibusque nigris ICTERUS BENGALENSIS.

Contra de Bengal. *Alb. Tom. III. pag. 9*; avec une figure mal coloriée Pl. 21.

Les Habitans de Bengale l'appellent CONTRA. *Alb.*

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur d'une *Litorne*. Le sommet de la tête, la gorge & la partie inférieure du col qui en est la plus voisine, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue

Magnitudine & crassitie *Turdum pilarem* circiter æquat. Vertex capitis, guttur, sicut & colli inferioris pars gutturi finitima, dorsum, uropygium, tectrices caudæ superiores & scapu-

lares pennæ nigro imbuuntur colore. A basi mandibulæ superioris utrumque capitis latus lata percurrit tænia alba, per oculos ducta, & inde retrorsum protensa, occipitium ambit. Altera tænia transversa, sordidè alba partem colli superiorem cingit. Infra utrumque oculum macula extat candida. Collum inferius in infima tantum parte, pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores al-
 bent. Rectrices alarum superiores sunt nigrae, sex maculis longitudinalibus, albis variegatae. Alarum remiges & rectrices penitus nigrae. Rostrum pallidè aurantium. Pedes fusco-flavicantes. Habitat in *Bengalensi* regno.

& les plumes scapulaires sont noires. De la bête du demi-bec supérieur part de chaque côté de la tête une large bande blanche, qui passe par les yeux, & de là s'étend en-arrière & va entourer l'occiput. La partie supérieure du col est aussi entourée d'une bande transversale, de blanc sale. Au-dessous de chaque œil est une tache blanche. Le bas de la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Celles du dessus des ailes sont noires, & variées de six taches longitudinales, blanches. Les plumes des ailes & celles de la queue sont tout-à-fait noires. Le bec est d'un orangé pâle. Les pieds sont d'un brun-jaunâtre. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

10. LE TROUPIALE DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

Icterus superne niger, infernè ex croceo & nigro varius; alis atro & candenti colore permixtis; rectricibus partim croceis, partim nigris ICTERUS NOVÆ HISPANIÆ.

Xochitotl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 39. cap. CXXII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 167. N°. 11.

Coztototl, seu Avis pallida. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 20. cap. XXVIII.*
 (junior.)

Coztototl, seu Avis pallida Mexicana Hernandezii. *Raj. Syn. Avi.*
pag. 90. N°. 4. (junior).

Les Mexiquains l'appellent XOCHITOTOTL; & le jeune, COZTOTOTL. *Fern.*

Magnitudine *Sturnum* adæquat. Caput, guttur, col-

Il est de la grandeur d'un Etourneau. La tête, la gorge,

le col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noires. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont presque tout-à-fait d'un jaune de safran, mêlé cependant d'un peu de noir. Les jambes sont de cette dernière couleur. Les aîles sont cendrées en-dessous, & variées en-dessus de noir & de blanc. La queue est d'un jaune de safran, varié d'un peu de noir. Son chant imite celui des *Pies*. Les Oiseaux de cette espèce, lorsqu'ils sont jeunes, sont tout jaunes, excepté les extrémités des aîles, qui sont noires. On le trouve à la *Nouvelle Espagne*.

lum, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigræ. Tectrices caudæ superiores concolores. Pectus, venter, latera & tectrices caudæ inferiores magna ex parte croceæ sunt, non sine mixtione coloris atrii. Crura nigra. Alæ subtus cinerascunt, superne verò atro & candenti colore permixtæ sunt. Cauda magna ex parte crocea, nigro variegatur. Cantu *Picas* imitatur. Hujus speciei Avis junior tota lutea est, extremis tamen alarum partibus nigris. Habitat in *Nova Hispania*.

11. LE TROUPIALE GRIS DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

Icterus nigro & luteo varius; dorso, ventre & cruribus cinereis. . . . *ICTERUS CINEREUS NOVÆ HISPANIÆ*.

Ococolin. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 54. cap. CCXI.

Raj. Syn. Avi. pag. 163.

Les Mexiquains l'appellent OCOCOLIN. Fern.

Il est de la grandeur & de la grosseur d'un *Etourneau*. Tout son corps est joliment varié de noir & de jaune, si l'on en excepte le dos, les jambes & le ventre, qui sont cendrés. Il habite les forêts, dans les ar-

Sturnum magnitudine & crassitie adæquat. In toto corpore nigro & luteo colore perpulchrè variegatur; in dorso tamen, cruribus & ventre cinereus est. Sylvas incolit, in quarum arboribus

arboribus sobolem educat. bres desquelles il fait son nid &
 Habitat in *Nova Hispania*. élève ses petits. On le trouve à
 la *Nouvelle Espagne*.

** 12. LE TROUPIALE A AISLES ROUGES.

Icterus niger (griseo admixto in foemina) ; tectricibus alarum
 minoribus coccineis *ICTERUS PTEROPHÆNICEUS*.

Sturnus niger, alis superne rubentibus. *Klein. Avi. pag. 64. N°. 2.*

Sturnus Pterophœnicus Indiarum. Jonst. Avi. pag. 157.

Pterophœnicus Indiarum. Euf. Nieremb. pag. 225.

Willugh. Ornith. pag. 302.

Acolchichi, seu *Avis rubeorum humerorum. Fern. Hist. Nov. Hisp.*
pag. 14. cap. IV.

Acolchichi Mexicanorum, seu *Sturnus Mexicanus humeris rubeis Her-*
nandezii. Raj. Syn. Avi. pag. 166. N°. 6.

Etourneau à aîles rouges. Catesb. Tom. I. pag. 13 ; avec une figure
exacte Pl. 13.

Etourneau rouge-aîle. Alb. Tom. I. pag. 33 ; avec une figure mal coloriée
Pl. 38.

Les Anglois l'appellent RED WING'D STARLING. Alb. Catesb.

Les Espagnols du Mexique, COMMENDADOZA. Fern. Jonst. Willugh.

Les Mexiquains, ACOLCHICHI. Fern. Willugh. Raj.

Crassitie Sturnum æmula-
tur. Ipsius longitudo ab api-
ce rostri ad caudam extre-
mam octo pollices & tres
lineas æquat, & ad extre-
mos unguis septem pollices
cum linea una. Rostrum ab
ipsius apice ad oris angulos
decem cum semi lineas lon-
gum est; cauda tres pollices
& quinque lineas; pes duo-
decim cum semi lineas; &
trium digitorum anticorum
medius cum ungue undecim
lineas: laterales paulò sunt

Tome II.

Il est de la grosseur d'un
Etourneau. Sa longueur depuis
 le bout du bec jusqu'à celui de
 la queue est de huit pouces trois
 lignes, & jusqu'à celui des on-
 gles de sept pouces une ligne.
 Son bec depuis sa pointe jus-
 qu'aux coins de la bouche a
 dix lignes & demie de long;
 sa queue trois pouces cinq li-
 gnes; son pied douze lignes &
 demie; & celui du milieu des
 trois doigts antérieurs, joint
 avec l'ongle, onze lignes :
 les latéraux sont un peu plus

N

courts ; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a treize pouces six lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un noir brillant , si l'on en excepte les petites couvertures des aîles , qui sont d'un beau rouge. Les yeux sont noirs ; & l'iris d'un beau blanc. Le bec , les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *la Caroline* , à *la Virginie* & à *la Louisiane* , d'où il a été envoyé au cabinet du Roi.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est plus petite. Elle en diffère aussi par sa couleur , qui est un noir mêlé de gris ; & en ce que le rouge de ses aîles n'est pas si vif.

Ils font leur nid au - dessus de l'eau & dans des joncs.

breviores ; & posticus anteriorum extimum longitudine adæquat. Alis expansis , extremitates majorum remigum tredecim pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ duas ferè tertias longitudinis caudæ partes attingunt. In universo corpore pennis vestitur splendentibus , nigris , exceptis tamen minoribus alarum tectricibus coccineis. Oculi sunt nigri ; eorum irides candidæ. Rostrum , pedes , unguesque nigri. Habitat in *Carolina* , *Virginia* & *Ludoviciana* , unde in museum Regium missus est.

Fœmina à mare discrepat magnitudine quâ ei cedit. Colore etiam ab illo differt ; in toto enim corpore nigra est , griseo admixto ; & tectrices alarum minores non ita splendidè rubent.

Supra aquas & in junce-
tis nidificant.

** 13. LE CASSIQUE ROUGE.

Voyez *Pl. VIII. Fig. 2.*

Icterus niger ; *uropygio coccineo* *CASSICUS RUBER.*

Les Guianois l'appellent CASSIQUE.

Il est un peu plus gros qu'un

Crassitie Merulam nonni-

hil antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat, & ad extremos ungues novem pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuordecim cum semi lineas longum est; cauda tres pollices & undecim lineas; pes quatuordecim cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales longitudine nonnihil superat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & quinque pollicum; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Caput, guttur, collum, dorsi suprema pars, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam subtus cooperientes, & tectrices alarum minores superiores & inferiores nigro splendenti perlustrantur. Dorsi pars infima, uropygium & tectrices caudæ superiores splendide coccineo imbuuntur colore. Tectrices alarum majores superiores & inferiores, remiges & rectrices nigro tinguntur minùs splendenti

Merle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long; sa queue trois pouces onze lignes; son pied quatorze lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est tant soit peu plus long que ces derniers. Il a un pied cinq pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la partie supérieure du dos, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessus & du dessous des aîles sont d'un noir brillant. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un rouge très-vif. Les grandes couvertures du dessus & du dessous des aîles, les plumes des aîles & celles de la queue sont d'un noir moins brillant que celui du reste du corps. Le bec est d'une couleur de soufre. Les pieds

& les ongles sont noirs. On le trouve au *Brésil* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

quàm reliquæ corporis pen-
næ. Rostrum colore sulphu-
reo imbutum. Pedes, un-
guesque nigri. Habitat in
Brasilia & *Cayana*, unde in
museum *Realmurianum* mis-
sus à *D. des Essars*.

** 14. LE CASSIQUE JAUNE.

Voyez *Pl. IX. Fig. 1.*

Icterus niger; maculâ in alis & uropygio luteis; rectricibus in exortu luteis, apice nigris *CASSICUS LUTEUS*.

Cissa nigra, alis caudâque luteis. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 40. sp. 10.*

Cissa Americana nigra, alis & caudâ luteis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XX. sp. 7.*

Picus ater, alis caudâque luteis. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 41. sp. 8.*

Picus minor, ater, alis & caudâ luteis. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 142.*

Picus Americanus, ater, alis & caudâ luteis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XIII. sp. 6.*

Pica Persica. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 793. hujus icon pessima pag. 795. Jonst. Avi. pag. 28.*

Willugh. Ornith. pag. 90.

Pica Persica Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag. 42. N°. 4.*

Jupujuba, seu *Japu Brasiliensibus*. *Marcgr. Hist. Br. pag. 193, in qua icon pessima.*

Jonst. Avi. pag. 132. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 57.

Jupujuba, seu *Japu Brasiliensium Marcgravii*. *Willugh. Ornith. pag. 98. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 46. N°. 7.

Pie de Brésil. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 292, dans laquelle il y a une mauvaise figure.*

Bel. Portr. d'Ois. pag. 71 b, dans laquelle est la même figure.

Les Italiens l'appellent *GAZZA DI TERRA NOVA*; *ZALLA DI TERRA NOVA*. *Bel.*

Les François de la *Guiane*, *CUL-JAUNE*, PETITE ESPECE. *Barr.*

Les Brâsiliens, *JUPUJUBA* ou *JAPU*. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.*

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur Præcedentem crassitie circiter adæquat. Ipsius longi-

tudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues decem pollices cum duabus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos sexdecim lineas longum est; cauda tres pollices & decem lineas; pes tredecim cum semi lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue tredecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales nonnihil longitudine superat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & quinque pollicum; alæ verò complicatæ duas tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caput, guttur, collum, dorfi suprema pars, pectus, venter, latera, crura, rectrices alarum inferiores, superiores minores, sicut & majores à corpore remotiores, nigro tinguntur colore. Dorfi pars infima, uropygium & rectrices caudæ superiores & inferiores sunt splendide luteæ. Alarum rectrices superiores majores corpori viciniore concolores, majusculam maculam in alis luteam efformant. Remiges sunt nigra. Rectrices ab exor-

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue trois pouces dix lignes; son pied treize lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a dix-sept pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la partie supérieure du dos, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de l'aîle, les petites du dessus & les grandes les plus éloignées du corps sont noires. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un beau jaune. Les grandes couvertures du dessus de l'aîle les plus proches du corps sont de ce même jaune, ce qui forme sur l'aîle une grande tache de cette couleur. Les plumes de l'aîle sont noires. Celles de la queue sont d'un beau jaune depuis leur origine jus-

que vers les deux tiers de leur longueur, le reste est noir. La prunelle des yeux est noire ; & leur iris est d'un bleu de Saphir. Le bec est d'une couleur de soufre. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Brésil* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Effars*.

Les Oiseaux de cette espece construisent leur nid de feuilles de chiendent sechées, & entrelassées avec des crins de cheval, ou des foyes de cochon. Ces nids sont bruns, & ont la figure d'une cucurbite étroite, surmontée de son alembic : leur longueur est d'un pied & demi, & leur hauteur de douze pouces. Ils sont attachés par une de leurs extrémités au bout des plus petites branches des arbres. Il y a des arbres, sur-tout parmi ceux qui se trouvent auprès des maisons, auxquels sont attachés plus de quatre cens de ces nids. Car ces Oiseaux sont très-communs, & font des petits trois fois l'année.

tu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque splendide luteæ, in reliqua longitudine nigræ. Oculorum pupilla nigra ; ipsorum irides cœruleo saphirino tinctæ. Rostrum sulphureo colore imbutum. Pedes, unguisque nigri. Habitat in *Brasilia* & *Cayana*, unde in *musæum Reaumurianum* missus à *D. des Effars*.

Nidos construunt hujus speciei Aves ex arido gramine & pilis equinis aut foliis mixtis conflatos, coloris fusci, figurâ cucurbitæ angustæ cum suo alembico, in totum sesquipedem circiter longos, unum pedem altos, & suâ extremitatē ex ramulis minimis extremis arborum dependentes. Sunt quædam arbores, præcipuè prope ædes, in quibus plusquam quadringeni nidi harum Avium pendent. Maximo enim numero sunt hæ Aves, & ter quotannis pullos excludunt.

** 15. LE TROUPIALE NOIR.

Voyez Pl. X. fig. 1.

Icterus niger, superne ad viride inclinans; remigibus, rectricibusque lateralibus interiùs & subtus nigris . . . ICTERUS NIGER.

Monedula tota nigra. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 299. N°. XIV. hujus icon pessima Tab. 257. Fig. 2.*

Raj. Syn. Avi. pag. 185. N°. 28.

Cornix parva profundè nigra. *Klein. Avi. pag. 59. N°. 6.*

Les Anglois de la Jamaïque l'appellent SMALL BLACK-BIRD. Sloane. Raj.

Ad *Merulæ* crassitiem accedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & decem lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda quatuor pollices & totidem lineas; pes quatuordecim cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extremum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quindecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem pertingunt. Caput, collum, dorsum, uro-

Il est environ de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue quatre pouces quatre lignes; son pied quatorze lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a quinze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à la moitié de la longueur de la queue. La tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des

âiles & celles du dessus de la queue sont d'un noir mêlé d'une légère teinte de verd, qui ne paroît que lorsqu'on les voit dans un certain jour. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle sont tout-à-fait noires & sans mélange de verd. Les plumes de l'aîle sont noires en-dessous, & en-dessus elles sont d'un noir mêlé d'une légère teinte de verd du côté extérieur seulement, & tout-à-fait noires du côté intérieur. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont en-dessus de la même couleur que le dos & tout-à-fait noires en-dessous : les latérales sont aussi noires en-dessous, & en-dessus elles sont noires du côté intérieur & d'un noir mêlé d'une légère teinte de verd du côté extérieur. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont un peu en diminuant par degrés. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *la Jamaïque* & à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

pygium, scapulares pennæ, alarum rectrices superiores & pennæ caudam superne tegentes sunt nigræ, cum aliqua viridis mixtura, secundum quasdam tantum ad lucem obversiones apparente. Pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus cooperientes penitus nigræ, nullo viridi admixto. Remiges infernè nigræ, superne verò in latere interiore concolores, in exteriori nigræ quidem, sed aliquâ viriditate mixtæ. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediae superne dorso concolores, infernè penitus nigræ : laterales subtus quoque nigræ, superne in latere interiore concolores, in exteriori nigræ, cum aliqua viridis mixtura. Rectrices binæ intermediae laterales nonnihil longitudine excedunt : laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Jamaica* & *S. Dominici Insula*, unde in museum *Realmurianum* missus à *D. Chervain*.

16. LE TROUPIALE A QUEUE FOURCHUE.

Icterus niger, superne ad cœruleum inclinans; rectricibus caudæ inferioribus albis; caudâ bifidâ *ICTERUS CAUDA BIFIDA.*

Sturnus caudâ divisa. Klein. Avi. pag. 64. N^o. 4.

Turdus niger Mexicanus. Seb. Vol. I. pag. 102. hujus icon pessima Tab. LXV. Fig. 4.

Magnitudine *Merulam* antecellit. Per universum corpus pennis vestitur nigris, in dorso tamen, uropygio & supra caudam ad cœruleum inclinantibus. Remiges & rectrices concolores. Rectrices caudæ inferiores albescentes. Longam, latamque gestat caudam, ut in *Hirundinibus* bifidam. Rostrum flavum. Pedes, unguisque nigri. Habitat in *Mexico*.

Il est plus gros qu'un *Merle*. Tout son corps est couvert de plumes noires : celles qui couvrent le dos, le croupion & le dessus de la queue tirent sur le bleu. Les plumes des ailes & celles de la queue sont de la même couleur. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Sa queue est longue, large & fourchue comme celle d'une *Hirondelle*. Son bec est jaune. Ses pieds & ses ongles sont noirs. On le trouve au *Mexique*.

** 17. LE TROUPIALE BRUN DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

Icterus superne fusco-nigricans, infernè luteus; capite luteo; vertice fusco-nigricante; remigibus, rectricibusque nigricantibus *ICTERUS FUSCUS NOVÆ HISPANIÆ.*

Merulam crassitie circiter æmulator. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices cum linea una. Ro-

Il est environ de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces une ligne. Son bec depuis sa

pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long ; sa queue trois pouces trois lignes ; son pied quatorze lignes & demie ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , treize lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a quatorze pouces six lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête (excepté son sommet) , la gorge , le col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue , celles du dessous de l'aîle & les petites du dessus sont jaunes. Le sommet de la tête , le dos , le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun-noirâtre. Les grandes couvertures du dessus de l'aîle sont de cette dernière couleur & bordées de gris-jaunâtre. Les plumes de l'aîle & celles de la queue sont noirâtres. Le bec , les pieds & les ongles sont jaunâtres. On le trouve à la *Nouvelle Espagne* , d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur*.

trum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim cum semi lineas longum est ; cauda tres pollices cum totidem lineis ; pes quatuordecim cum semi lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Alis extensis , extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput (vertice excepto) , guttur , collum , pectus , ventrem , latera & crura vestiunt pennæ luteæ. Quæ caudam subtùs cooperiunt , alarum rectrices inferiores , & minores superiores concolores. Vertex capitis , dorsum , uropygium , & rectrices caudæ superiores ex fusco nigricant. Alarum rectrices superiores majores eodem imbuuntur colore , & marginibus donantur griseo-flavicanibus. Remiges & rectrices nigricantes. Rostrum , pedes , unguesque flavicantes. Habitat in *Nova Hispania* , unde in *musæum Realmurianum* missus est.

** 18. LE TROUPIALE DE LA GUIANE.

Voyez Pl. XI. fig. 1.

Icterus nigricans, oris pennarum griseis; gutture, collo inferiore, pectore & tectricibus alarum minoribus rubris . . .
ICTERUS GUIANENSIS.

Turdus, sive *Merula Indica*, pectore cinnabarino. *Klein. Avi. pag. 69. N^o. 24.*

Merula Indica, pectore cinnabarino. *Willugh. Ornith. pag. 143. Raj. Syn. Avi. pag. 67. N^o. 10.*

Quoad crassitiem ad *Turdum Iliacum* accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & sex lineas; pes quatuordecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales nonnihil longitudine excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad mediam caudæ longitudinem usque protenduntur. Caput, partem superiorem & latera

Il approche de la grosseur du *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue deux pouces six lignes; son pied quatorze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Il a onze pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les plumes qui couvrent la tête, la partie supérieure & les côtés du col, le dos, le croupion, le ventre, les côtés & les jambes, ainsi

que les plumes scapulaires, les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessus, sont noirâtres, & bordées de gris. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont rouges, chaque plume étant bordée de blanchâtre. Les grandes couvertures du dessus de l'aile sont noirâtres & bordées de gris : les petites sont rouges & sans bordure. Le bord de l'aile, vers le pli qui repond à celui du poignet, est de la même couleur. Les couvertures du dessous de l'aile & les grandes plumes de l'aile sont noirâtres : les moyennes sont de la même couleur, & bordées extérieurement de gris. Les plumes de la queue & leurs grandes couvertures supérieures sont aussi noirâtres, & variées, vers leur bout seulement, de quelques rayes transversales, grises. Le bec, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve dans la *Guiane*, d'où il a été envoyé à *M^{de}. de Bandeville* qui le conserve dans son cabinet.

colli, dorsum, uropygium, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ nigricantes, oris griseis præditæ. Scapulares pennæ, caudæ rectrices inferiores, & minores superiores concolores. Guttur, collum inferius & pectus rubris cooperiuntur pennis, marginibus pennarum albidis. Alarum rectrices superiores majores nigricantes, oris griseis : minores penitus rubræ. Margines alarum, versus articulum carpo humano respondentem, concolores. Alarum rectrices inferiores & remiges majores nigricant : minores eodem colore tinguntur, oris tamen exterioribus griseis. Rectrices, sicut & ipsarum rectrices superiores majores, nigricantes, tamen quibusdam transversis, griseis, versus apicem tantum, striatæ. Rostrum, pedes, unguesque fuscæ. Habitat in *Guiana*, unde in museum *D. de Bandeville* missus est.

** 19. LE BALTIMORE.

Voyez Pl. XII. Fig. 1.

Icterus aurantius ; capite & dorso supremo nigris ; remigibus nigris , oris exterioribus albis , interioribus albidis ; rectricibus quatuor utrinque extimis primâ medietate nigris , alterâ aurantiis ICTERUS MINOR.

Turdus Icterus ex auro nigroque varius. *Klein. Avi. pag. 68. N^o. 15.*
Oiseau-Baltimore. *Catesb. Tom. I. pag. 48 ; avec une figure pas assez exacte Pl. 48.*

Les Anglois l'appellent BALTIMORE-BIRD. *Catesb.*

Crassitie Montifringillam circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & decem lineas explet , & ad extremos ungues quinque pollices cum decem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est ; cauda duos pollices & decem lineas ; pes decem cum semi lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum undecim pollicum & novem linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem

Il est à peu près de la grosseur du *Pinçon d'Ardennes*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces dix lignes , & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long ; sa queue deux pouces dix lignes ; son pied dix lignes & demie ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a onze pouces neuf lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge & les parties supérieures du col

& du dos font d'un noir brillant. La partie inférieure du dos, le croupion, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les petites du dessus font d'un très-bel orangé. Les grandes couvertures du dessus de l'aîle font noires, & terminées obliquement de blanc du côté extérieur; ce qui forme sur l'aîle une bande transversale, de cette couleur. Les plumes de l'aîle font noires; leur bord extérieur est blanc, & l'intérieur est blanchâtre. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu font noires: celle qui les suit de chaque côté est de la même couleur, & terminée d'orangé; & les quatre plus extérieures de chaque côté font noires depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, le reste est orangé: le noir s'étend d'autant plus loin que la plume est plus proche de celles du milieu. Le bec, les pieds & les ongles font d'une couleur de plomb. On le trouve à la *Virginie*, à *Mariland* & en *Canada*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. le Comte de la Galissonniere*.

protenduntur. Caput, guttur, collum superius & dorsum supremum sunt splendide nigra. Dorsi pars infima, uropygium, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam superne & inferne cooperientes, rectrices alarum inferiores, sicut & minores superiores, splendidissimo tinguntur aurantio. Alarum rectrices superiores majores sunt nigrae, apicibus exterius oblique albis; quod fit ut quælibet ala taniâ transversâ, albâ notetur. Remiges nigrae, oris exterioribus albis, interioribus albidis. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae nigrae: rectrix utrinque sequens concolor, attamen aurantio terminata; & quatuor utrinque extremae ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque nigrae, in reliqua longitudine aurantiae: niger autem color in qualibet penna eò magis versus apicem protenditur, quod rectrix binis intermediis vicinior est. Rostrum, pedes, unguesque plumbei. Habitat in *Virginia*, *Mari-landia* & *Canada*, unde in museum *Realmurianum* missus à *D. Comite de la Galissonniere*.

** 20. LE BALTIMORE BASTARD.

Voyez Pl. X. Fig. 3.

Icterus flavus, ad aurantium inclinans; dorso supremo griseo-olivaceo; gutture nigro; remigibus fuscis, oris albidis; rectricibus quatuor utrinque extimis flavo-olivaceis
ICTERUS MINOR SPURIUS.

Turdus minor, gutture nigro. *Klein. Avi. pag. 68. N^o. 14.*

Baltimore bastard. *Catesb. Tom. I. pag. 49*; avec les figures du mâle & de la femelle pas assez bien coloriées *Pl. 49.*

Les Anglois l'appellent BASTARD BALTIMORE. *Catesb.*

Ad præcedentis crassitiem accedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & octo lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices cum octo lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda duos pollices cum novem lineis; pes decem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem protenduntur. Ca-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue deux pouces neuf lignes; son pied dix lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ à la moitié de la longueur de la queue. La partie antérieure de la tête, sçavoir le front & les

joues, est variée de noirâtre & de jaunâtre. La gorge est noire. Le derrière de la tête & la partie supérieure du col sont d'un gris-olivâtre, varié de quelques taches noirâtres. La partie supérieure du dos est de même d'un gris-olivâtre, mais plus rembruni. La partie inférieure du dos, le croupion, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un jaune tirant sur l'orangé, plus vif à la poitrine & aux couvertures du dessus & du dessous de la queue qu'ailleurs. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un brun foncé; les grandes sont de la même couleur, & terminées d'un blanc sale & jaunâtre. Les plumes de l'aile sont brunes, & bordées extérieurement & intérieurement de blanchâtre. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont olivâtres à leur origine, ensuite noirâtres, & leur bout est marqué d'une tache longitudinale, jaunâtre; celle qui les suit de chaque côté est d'un olivâtre mêlé confusément de noirâtre; & les quatre plus extérieures de chaque côté sont d'un jaune-olivâtre. Le bec est d'une cou-

pitis pars anterior, frons scilicet & genæ, nigricante & flavicante variegatur. Guttur nigrum. Partes capitis posterior & colli superior sunt griseo-olivaceæ, maculis quibusdam nigricantibus variæ. Dorsum supremum similiter griseo-olivaceum, sed obscurius. Dorsi pars infima, uropygium, collum inferius, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ superiores & inferiores & pennæ alas subtus cooperientes flavo ad aurantium vergente, in pectore quidem & rectricibus caudæ superioribus & inferioribus intensiore, tinguntur. Alarum rectrices superiores minores saturatè fuscæ sunt; majores concolores, apicibus sordidè albo-flavicantibus. Remiges fuscæ, oris exterioribus & interioribus albidis. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ in exortu olivaceæ, deinde nigricantes, maculâ longitudinali, flavicante in apice notatæ; rectrix utrinque sequens olivacea, nigricante confusè mixta; & quatuor utrinque extimæ flavo-olivaceæ. Rostrum plumbeum. Pedes, unguesque cœrulecentes,

centes. Habitat in *Virginia* & *Canada*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Comite de la Galissonniere*.

leur de plomb. Les pieds & les ongles sont bleuâtres. On le trouve à la *Virginie* & en *Canada*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. le Comte de la Galissonniere*.

Avis à *Catesbeyo* *delineata* eâdem tabulâ (49), quamque istius *fœminam* dicit, *præcedentis* potius *fœmina* esse videtur. Caput habet, guttur, collum & dorsum supremum splendide nigra. Dorsi pars infima, uropygium, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam superne & infernè tegentes, tectrices alarum inferiores, & minores superiores obscurè rubent. Alarum tectrices superiores majores & remiges nigricant. Rectrices sunt nigræ. Rostrum plumbeum. Pedes, unguesque cœrulescentes.

L'Oiseau que *Catesby* a figuré dans la même planche que celui-ci, & qu'il donne pour sa femelle, paroît être plutôt celle du précédent. Sa tête, sa gorge, son col & la partie supérieure de son dos sont d'un noir brillant. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les petites du dessus sont d'un rouge terni. Les grandes couvertures du dessus & les plumes des aîles sont noirâtres. Celles de la queue sont noires. Le bec est d'une couleur de plomb. Les pieds & les ongles sont bleuâtres.

** 21. LE BALTIMORE VERD.

Voyez Pl. X. Fig. 2.

Icterus superne fuscus ad olivaceum inclinans, infernè & uropygio viridi-olivaceus; remigibus fuscis, oris exterioribus olivaceis, interioribus albicantibus . . . ICTERUS MINOR VIRIDIS.

On l'appelle à *S. Domingue* SIFFLEUR.
Tome II.

Il est de la grosseur d'un *Pinçon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes & demie de long; sa queue trois pouces; son pied dix lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, & la partie supérieure du dos sont d'un brun tirant sur l'olive. La poitrine est de la même couleur, mêlée d'une légère teinte de roux. Le synciput est d'une couleur plus claire. La partie inférieure du dos, le croupion, le ventre, les côtés, les couvertures du dessus & du dessous de la queue & les petites du dessus des aîles sont d'un verd d'olive. Les jambes sont d'un jaune d'olive. Les couvertures du dessous des aîles sont jaunes. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poi-

Crassitie *Fringillam* æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & decem lineas æquat, & ad extremos unguis quinque pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem cum semi lineas longum est; cauda tres pollices; pes decem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales nonnihil longitudine superat. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, guttur, collum & dorsi suprema pars ex fusco ad olivaceum inclinant. Pectus eodem colore tingitur, cum aliqua rufi mixtura. Synciput colore imbuitur dilutior. Partem dorsi infimam, uropygium, ventrem & latera vestiunt pennæ viridi-olivaceæ. Quæ caudam superne & infernè cooperiunt, & tectrices alarum superiores minores concolores. Crura sunt flavo-olivacea. Alarum tectrices inferiores flavæ. Ip-

farum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, eodem colore tinctæ. Rectrices alarum superiores majores fuscæ, oris flavicantibus præditæ. Remiges fuscæ, oris exterioribus olivaceis, interioribus albicantibus. Caudam componunt duodecim rectrices infernè viridi-olivaceæ, superne verò obscurè olivaceæ, oris exterioribus viridi-olivaceis. Rectrices binæ intermediæ laterales nonnihil longitudine excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur. Rostrum colore corneo tingitur. Pedes, unguisque sunt grisei. Habitat in *S. Dominici Insula*, unde in *musæum Reaumurianum* missus à *D. Chervain*.

gnet, est de cette même couleur. Les grandes couvertures du dessus des aîles sont brunes & bordées de jaunâtre. Les plumes des aîles sont brunes; & elles ont leur bord extérieur olivâtre, & l'intérieur blanchâtre. La queue est composée de douze plumes, d'un verd d'olive en-dessous, & qui sont en-dessus d'un olive rembruni, & ont leur bord extérieur verd-d'olive. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont un peu en diminuant par degrés. Le bec est d'une couleur de corne : les pieds & les ongles sont gris. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

* * 22. LE CAROUGE.

Voyez le mâle Pl. XII. fig. 2.

Icterus saturatè aurantius ; capite, collo & pectore saturatè castaneis ; dorso supremo, remigibus, rectricibusque nigris XANTHORUS.

Icterus minor nidum suspendens. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 299. N°. XVI. fœminæ icon minùs accurata Tab. 257. Fig. 1.*

Raj. Syn. Avi. pag. 184. N°. 27.

Icterus minor nidum suspendens alter. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 300. N°. XVII. maris icon minùs accurata Tab. 258. Fig. 3.*

Turdus minor varius. *Klein. Avi. pag. 68. N°. 13.*

Xanthornus minor, nigro varius. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 477.*

Xochitototl. Charlet. Exer. pag. 117. N°. XI.

Charlet. Onomazt. pag. 113. N°. XI.

Xochitototl altera, feu Avis florida. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 40. cap. CXXV.

Raj. Syn. Avi. pag. 167. N°. 12.

Les Anglois de la Jamaïque l'appellent WATCHY PICKET ; SPANISH-NIGHTINGALE. Sloane. Raj. AMERICAN HANG-NEST. Raj. HANG-NEST OF AMERICA. Charlet. BANANA-BIRD. Browne.

Les Mexiquains , XOCHITOTOTL. Fern.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Pinçon* d'*Ardenne*s. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces , & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces cinq lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long ; sa queue trois pouces trois lignes ; son pied dix lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , huit lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est plus long que ces derniers. Il a onze pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête , la gorge , le col & la poitrine sont d'un beau marron foncé. La partie supérieure du dos est d'un noir de velours. La partie inférieure du dos , le croupion , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue , celles du dessous de l'aîle & les petites du

Montifringillæ nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices æquat , & ad extremos ungues quinque pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est ; cauda tres pollices cum totidem lineis ; pes decem lineas ; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue octo lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus laterales nonnihil longitudine excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput , guttur , collum & pectus sunt splendide saturatè castanea. Dorsi suprema pars nigra , holoserici instar villosi splendens. Dorsum infimum , uropygium , venter , latera , crura ,

pennæ caudam infernè tegentes, teñtrices alarum inferiores, sicut & minores superiores, saturato imbuuntur aurantio. Teñtrices caudæ superiores concolores, sed apicibus donantur castaneis. Alarum teñtrices superiores majores, remiges & reñtrices splendidissimè nigræ. Rostrum quoque nigrum, exceptâ mandibulæ inferioris basi griseâ. Pedes, unguesque nigricantes.

Fœmina à mare differt coloribus minùs splendentibus & non ità lucidis. Habitat in Martinica, unde in museum Realmurianum missi sunt à D. Thibault de Chanvalon.

Singularis figuræ nidos construunt hujus speciei Aves. Nidus autem conflatur foliorum fibrillis, aliæ in alias intertextis, & quartam globi vacui partem efformantibus, infra *Musæ* folium cum arte sutam; ità ut nidus in uno latere folio ipso consistet.

dessus sont d'un orangé foncé. Celles du dessus de la queue sont de la même couleur, & terminées de marron. Les grandes couvertures du dessus des ailes, les plumes de l'aile & celles de la queue sont d'un très-beau noir. Le bec est de la même couleur, excepté la bête du demi-bec inférieur, qui est grise. Les pieds & les ongles sont noirâtres.

La femelle diffère du mâle en ce que ses couleurs sont moins vives & moins belles. On les trouve à la Martinique, d'où ils ont été envoyés à M. de Reaumur par M. Thibault de Chanvalon.

Ces Oiseaux construisent leur nid d'une forme tout-à-fait singulière. Ce nid est composé de petites fibres de feuilles, entrelassées les unes dans les autres, & qui forment une des portions d'un globe coupé en quatre, artistement cousue sous une feuille de *Bananier*; de façon que cette feuille fait elle-même un des côtés du nid.

** 23. LE CAROUGE DU MEXIQUE.

Voyez Pl. XI. Fig. 2.

Icterus luteus; gutture, remigibus, rectricibusque nigris, remigibus interiùs versùs exortum albis; rectricibus alarum majoribus exteriùs apice albis. **XANTHORNUS MEXICANUS.**

Lanius Ayoquantototl dictus. Klein. Avi. pag. 54. N^o. 7.

Avis de Ayoquantototl. Seb. Vol. II. pag. 102. hujus icon satis accurata Tab. XCVI. Fig. 4.

Ayoquantototl. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 54. Cap. CCVII.

Raj. Syn. Avi. pag. 171.

Oiseau Bonana minor. Edwards. Glanur. pag. 68. Chap. XXXIII; avec une figure assez exacte Pl. 243.

Les Anglois l'appellent LESSER BONANA BIRD. Edwards.

Les Mexiquains, AYOQUANTOTOTL. Fern. Raj.

Il n'est pas si gros que notre petite Grive. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes & demie de long; sa queue trois pouces quatre lignes; son pied onze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a douze pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-

Turdo minori nostrati crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem cum semi lineas longum est; cauda tres pollices & quatuor lineas; pes undecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim polli-

cum & trium linearum; alæ verò complicatæ paulò ultra tertiam longitudinis caudæ partem protenduntur. Pennæ nigræ basin rostri ambiunt, exceptâ tamen mandibulæ superioris parte superiore: color autem niger utrinque ad oculos usque protenditur. Guttur quoque nigrum; quæ nigredo supra partem colli inferiorem extenditur & in aciem definit. Caput, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ splendidissimè luteæ. Quæ caudam superne & infernè obtegunt, alarum tectrices inferiores & minores superiores concolores. Tectrices alarum superiores majores sunt nigræ, marginibus interioribus albis: omnes ferè in latere interiore albo quoque terminantur. (In illo ab *Edwardo* descripto tectricum istarum pinulæ exteriores erant penitus candidæ). Remiges nigræ, excepto tamen latere interiore versùs pennæ exortum albo; quæ albedo eò magis versùs pennæ apicem protenditur, quò remix fit corpori vicinior: minorum quoque margines exteriores albent. Duodecim rectrici-

delà du tiers de la longueur de la queue. La bâte du bec est entourée de plumes noires, si l'on en excepte le dessus du demi-bec supérieur: cette couleur s'étend de chaque côté jusqu'aux yeux. La gorge est aussi noire; & cette couleur descend en pointe sur la partie inférieure du col. La tête, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous de l'aîle & les petites du dessus sont d'un très-beau jaune. Les grandes couvertures du dessus de l'aîle sont noires & bordées de blanc du côté intérieur: presque toutes sont aussi terminées de blanc du côté extérieur. (Celui qu'*Edwards* a décrit, avoit les barbes extérieures de ces couvertures toutes blanches). Les plumes des aîles sont noires, mais leur côté intérieur est blanc vers l'origine de la plume; & cette couleur s'étend d'autant plus loin, que la plume est plus voisine du corps: les moyennes sont aussi bordées extérieurement de blanc. La queue est composée de douze plumes noires, dont les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extré-

rieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir, excepté l'origine du demi-bec inférieur, qui est rougeâtre. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve au *Mexique* & à la *Jamaïque*. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

bus nigris cauda constat : binæ intermediæ laterales non nihil longitudine excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuantur ad utrinque extremam usque brevior. Rostrum nigrum, exceptâ mandibulæ inferioris basi rubescente.

Pedes, unguisque fusci. Habitat in *Mexico* & *Jamaica*. Ex museo D. Aubry.

24. LE CAROUGE DU BRÉSIL.

Iæterus luteus ; capite, collo inferiore, remigibus, rectricibusque nigris ; taniâ per dorsum transversâ, nigrâ ; rectricibus alarum majoribus intermediis albis . . . XANTHORNUS BRASILIENSIS.

Jamacaii Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 198, in qua icon pessima. Jonst. Avi. pag. 136. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 58.*

Jamacaii Brasiliensibus Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 173. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XLII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 75. N°. 4.

Les Brasiliens l'appellent JAMACAI. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Il est de la grosseur d'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes de long ; sa queue presque quatre pouces ; son pied treize lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze

Quoad crassitiem *Alaudam* æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos duodecim lineas longum ; cauda quatuor ferè pollices ; pes tredecim lineas ; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue undecim

undecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Caput & collum inferius nigris vestiuntur pennis. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ superiores & inferiores luteæ ; attamen ad exortum alarum transversim per dorsum tendit nigra macula. Rectrices alarum superiores minores sunt nigrae : majores à corpore remotiores, sicut & corpori finitimæ, concolores ; intermediae verò albæ, quæ maculas albas efficiunt, in qualibet ala unam. Remiges & rectrices nigrae. Rostrum quoque nigrum, at prope exortum mandibulae inferioris coeruleascens. Pedes fusci. Habitat in *Brazilia*.

lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. La tête & la partie inférieure du col sont noires. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont jaunes ; il y a cependant une bande transversale, noire, qui s'étend sur le dos d'une aîle à l'autre. Les petites couvertures du dessus des aîles sont noires : les grandes les plus éloignées du corps & celles qui en sont les plus proches sont de la même couleur, mais celles qui occupent le milieu sont blanches ; ce qui forme sur chacune des aîles une tache de cette couleur. Les plumes des aîles & celles de la queue sont noires. Le bec est pareillement noir, excepté vers la base du demi-

bec inférieur, où il est bleuâtre. Les pieds sont bruns. On le trouve au *Brésil*.

** 25. LE CAROUGE DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. XII. Fig. 3.

Icterus niger ; rectricibus alarum minoribus & imo corpore luteis XANTHORNUS DOMINICENSIS.

On l'appelle à S. Domingue DEMOISELLE.
Tome II.

Q

Il est à peu près de la longueur d'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue trois pouces sept lignes; son pied dix lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est presque aussi long que celui du milieu de ceux de devant. Il a douze pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la partie supérieure du dos, la poitrine, le haut du ventre & des côtés sont noirs. Tout le bas du corps, savoir la partie inférieure du dos, le croupion, le bas-ventre, le bas des côtés & les jambes, est jaune. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des ailes, les petites du dessus & le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, sont de cette dernière couleur. Les grandes couvertures du dessus des ailes,

Quoad crassitiem *Alaudam* circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices explet, & ad extremos ungues sex pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda tres pollices cum septem lineis; pes decem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum medium longitudine ferè adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum duodecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, guttur, collum, dorsi suprema pars, pectus, venter supremus & laterum pars suprema pennæ vestiuntur nigris. Totum corpus infimum, dorsi scilicet partem infimam, uropygium, imum ventrem, laterum partem infimam & crura, vestiunt pennæ luteæ. Quæ caudam superne & infernè cooperiunt, alarum tectrices inferiores, minores superiores, sicut & alarum margines,

versus articulum carpo humano respondentem, concolores. Tectrices alarum superiores majores, remiges & rectrices nigrae. Rectrices binæ intermediæ laterales nonnihil longitudine excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur. Rostrum, pedes, unguisque nigri. Habitat in *S. Dominici Insula*, unde in *musæum Reaumurianum* missus à *D. Chervain*.

les plumes des ailes & celles de la queue sont noires. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont un peu en diminuant par degrés. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

** 26. LE CAROUGE DE CAYENNE.

Voyez Pl. IX. Fig. 2.

Icterus niger; tectricibus alarum minoribus luteis . . .
XANTHORHUS CAYANENSIS.

Autre espèce de Merle de l'Isle de S. Thomas. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 126. (ed. 1725).*

Craffitie *Alaudam* adæquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem octo pollices & tres lineas explet, & ad extremos unguis quinque pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est; cauda tres pollices cum decem lineis; pes decem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue decem

Il est de la grosseur d'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue trois pouces dix lignes; son pied dix lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont un peu

plus courts ; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a treize pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes noires , si l'on en excepte les couvertures du dessous des aîles , qui sont variées de noir & de jaune , & les petites du dessus , qui sont d'un beau jaune. Les plumes des aîles & celles de la queue sont noires. Les deux du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à l'*Isle de S. Thomas* & à *Cayenne* , d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus laterales nonnihil longitudine excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Per universum corpus pennis vestitur nigris , exceptis tamen rectricibus alarum inferioribus nigro & luteo variis , & minoribus superioribus splendide luteis. Remiges & rectrices nigrae. Rectrices binæ intermediae laterales paululum longitudine excedunt. Rostrum nigrum. Pedes , unguisque nigricantes. Habitat in *Insula S. Thomæ & Cayana* , unde in *museum Reaumurianum* missus à *D. des Essars*.

**** 27. LE CAROUGE A TESTE JAUNE DE CAYENNE.**

Voyez Pl. XII. fig. 4.

Icterus niger ; capite & collo inferiore luteis
XANTHORNUS ICTEROCEPHALUS CAYANENSIS.

Il est de la grosseur du *Pinçon d'Ardennes*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces onze lignes , & jusqu'à ce-

Crassitie Montifringillam æquat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & undecim lineas explet , & ad ex-

tremos ungues sex pollices cum quatuor lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo cum semilineas longum est; cauda duos pollices & septem lineas; pes duodecim lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue decem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem laterales longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Caput, guttur & partem colli inferiorem cooperiunt pennæ splendide luteæ. In toto reliquo corpore pennis vestitur nigris. Remiges & rectrices eodem imbuuntur colore. Plumulæ nigrae basin rostri ambiunt. Rostrum nigricat. Pedes, unguesque sunt fusci. Habitat in *Cayana*, unde in *musæum Reaumurianum* missus à *D. des Effars*.

lui des ongles de six pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes & demie de long; sa queue deux pouces sept lignes; son pied douze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que ces derniers. Il a onze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un beau jaune. Tout le reste de son corps est couvert de plumes noires. Les plumes de ses ailes & celles de sa queue sont de cette dernière couleur. La base du bec est entourée de petites plumes noires. Le bec est noirâtre. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Effars*.

28. LE CAROUGE BLEU.

Icterus niger aut cinereus; capite, alis & caudâ cœruleis . . .
XANTHORHUS CÆRULEUS.

Pica Maderaspatana minima, è cœruleo nigrescens. *Raj. Syn. Avi. pag. 195. N°. 11. hujus icon minimè accurata Tab. I. Fig. 11.*

Les Anglois l'appellent SMALL BLEW JAY. *Raj.*

Les Gentils, PEACH CAYE. Raj.

Tout son corps est couvert de plumes noires ou cendrées, si l'on en excepte cependant la tête, les aîles & la queue, qui sont bleues. Cette couleur est plus foncée sur la tête & les aîles que sur la queue. Le bec & les pieds sont roussâtres. On le trouve à *Madraſt*.

In univerſo corpore penis veſtitur nigris aut cinereis, exceptis tamen capite, alis & caudâ coeruleo tinctis colore, intenſiore quidem in capite & alis, in cauda dilutior. Roſtrum, pedesque ruſeſcunt. Habitat in *Maderaſpatano*.

29. LE CAROUGE TACHETÉ.

Icterus fuscus ad ruſum inclinans, ſuperne ſaturatiùs, infernè dilutiùs, maculis nigris variegatus; genis & gutture nigris; remigibus, rectricibusque nigricantibus, oris fuſco-ruſeſcentibus XANTHORNUS NÆVIUS.

Fringilla ex fuſco & nigro varia, Americana; caudâ ſuperbiens. Klein. Avi. pag. 98. N^o. 17.

Schomburger, ſorte d'Alouette d'Amérique. Edwards. Tom. II. pag. LXXXV; avec une figure exaëte Pl. 85.

Il eſt un peu plus gros que le *Pinçon*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ cinq poüces dix lignes, & juſqu'à celui des ongles de cinq poüces huit lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long; ſa queue deux poüces; ſon pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux ſont un peu plus courts;

Crasſitie Fringillam. non-nihil antecellit. Ipfius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam quinque circiter pollices & decem lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices & octo lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos octo lineas longum eſt; cauda duos pollices; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum mediùs cum ungue novem li-

neas : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem laterales longitudine adæquat. Alæ complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem extenduntur. Capitis verticem cooperiunt pennæ fuscæ ad rufum inclinantes. Quæ partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt, concolores, maculis nigris variegatæ ; nigredine scilicet cujuslibet pennæ medium occupante. Guttur & genæ sunt nigræ ; quæ nigredo in utroque colli latere deorsum tendit, in acumen desinit, & ferè ad alarum exortum usque protenditur. Pars colli inferior, pectus & venter supremus ex dilutè fusco ad rufum vergunt, maculisque variegantur nigris, sicut in dorso, uniuscujusque pennæ medium occupantibus. Venter imus, crura & rectrices caudæ superiores & inferiores fusco tinguntur magis diluto, & maculis destituuntur. Scapulares pennæ ex dilutè fusco flavicant. Alarum rectrices superiores iisdem ac dorsum coloribus ornantur. Remiges & rectrices sunt nigricantes, oris fuscorufescentibus. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum obs-

& celui de derriere est de la même longueur que ces derniers. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est d'un brun tirant sur le roux. La partie supérieure du col, le dos & le croupion sont de la même couleur, variée de taches noires, cette dernière couleur occupant le milieu de chaque plume. La gorge & les joues sont noires : cette couleur descend en pointe le long de chaque côté du col, & s'étend presque jusqu'à la naissance de l'aile. La partie inférieure du col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un brun clair tirant sur le roux, & varié de taches noires, qui occupent, comme sur le dos, le milieu de chaque plume. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un brun encore plus clair, & sans taches. Les plumes scapulaires sont d'un brun clair & jaunâtre. Les couvertures du dessus des ailes sont variées des mêmes couleurs que le dos. Les plumes des ailes & celles de la queue sont noirâtres, & bordées d'un brun tirant sur le roux. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Le bec est d'une cou-

leur de chair ternie. Les pieds sont d'une couleur de chair plus vive ; & les ongles sont bruns. On le trouve au *Mexique*.

curè carneum. Pedes eodem colore, sed vividiorè, tincti ; unguës verò fuscî. Habitat in *Mexico*.

** 30. LE CAROUGE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Icterus superne fusco-olivaceus, infernè flavus; uropygio olivaceo; remigibus superne fuscis, infernè griseis, oris exterioribus olivaceis; rectricibus olivaceis, superne obscuriùs, infernè dilutiùs XANTHORNUS CAPITIS BONÆ SPEI.

Il est à peu près de la grosseur du *Baltimore*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces sept lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long ; sa queue deux pouces deux lignes ; son pied onze lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce : les latéraux sont beaucoup plus courts ; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a dix pouces trois lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un gris tirant sur l'olive. La partie supérieure du col, le dos, les plumes scapu-

Iderum minorem crassitie circiter æquat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & totidem lineas explet, & ad extremos unguës sex pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est ; cauda duos pollices & totidem lineas ; pes undecim lineas ; & trium digitorum anticorum mediùs cum ungue duodecim lineas : laterales multò sunt breviores ; & posticus laterales nonnihil longitudine excedit. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum & trium linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Partem capitis superio-
rem



Fig. 1.

Fig. 2.

Martinet del. et sculp.

1. Troupiale .

2. Cassique rouge .



Fig. 2.

Fig. 1.

Dessiné et Gravé par Martinet

1. Cassique jaune.

2. Carouge de Cayenne.



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Troupiale noir. 2. Baltimore verd. 3. Baltimore bâtard.



Designé et Gravé par Martinet

1. Troupiale de la Guiane.

2. Carouge du Mexique.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Baltimore
2. Carouge, Mâle.

3. Carouge de St. Domingue.
4. Carouge à Tête Jaune de Cayenne.

rem vestiunt pennæ griseæ ad olivaceum vergentes. Pars colli superior, dorsum, scapulares pennæ & tectrices alarum superiores minores sunt fusco-olivaceæ. Uropygium & tectrices caudæ superiores dilutiùs olivaceæ. Guttur & collum inferius ex flavo ad aurantium inclinant. Pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores flavæ, cum aliqua in cruribus & lateribus olivacei mixtura. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, luteæ. Ipsarum tectrices inferiores griseæ, cum paucò olivaceo mixto : superiores majores fuscae, marginibus exterioribus & apicibus viridi-olivaceo-flavicanibus. Remiges sunt superne fuscae, infernè griseæ, oris exterioribus viridi-olivaceis. Prima remigum brevissima ; tertia & quarta omnium longissimæ. Caudam componunt duodecim rectrices olivaceæ, superne obscuriùs, infernè dilutiùs. Rostrum, pedes, unguesque fusci. Habitat in *Capite Bonæ Spei*, unde in *musæum D. Aubry* allatus est.

laïres & les petites couvertures du dessus des aïles sont d'un olive-brun. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un olive plus clair. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un jaune tirant sur l'orangé. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un assez beau jaune, mêlé d'un peu d'olivâtre sur les jambes & sur les côtés. Le bord de l'aïle, vers le pli qui repond à celui du poignet, est jaune. Les couvertures du dessous de l'aïle sont d'un gris mêlé d'un peu d'olivâtre : les grandes du dessus sont brunes, bordées extérieurement & terminées d'un verd-d'olive jaunâtre. Les plumes des aïles sont brunes en-dessus, grises en-dessous ; & leur bord extérieur est d'un verd-d'olive. La première de ces plumes est extrêmement courte ; la troisième & la quatrième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un olive un peu sombre en-dessus & plus clair en-dessous. Le bec, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où il a été apporté à *M. l'Abbé Aubry* qui le conserve dans son cabinet.

Le genre de l'Oiseau-de-Paradis.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derrière ; tous séparés environ jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec en cône allongé, droit, très-pointu & un peu comprimé par les côtés :

Les plumes de la base du bec tournées en-arrière, & laissant les narines à découvert :

Deux plumes au-dessus de la queue plus longues que tout l'Oiseau, & qui n'ont des barbes qu'à leur origine & à leur bout.

Genus Manucodiata.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus ; omnes circiter usque ad exortum discreti :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum conico-elongatum, rectum, acutissimum, paululum lateraliter compressum :

Plumæ basis rostri retrorsum versæ ; naresque detectæ :

Pennæ binæ supra caudam totâ Ave longiores, & pinnulis per totam longitudinem, exceptis exortu & apice, destitutæ.

** I. L'OISEAU-DE-PARADIS.

Voyez Pl. XIII. Fig. 1.

Manucodiata castanea ; collo inferiore viridi-aureo ; pennis laterum longissimis, decompositis ; pennis duabus ex uropygio ortis apice rectis MANUCODIATA.

Manucodiata. *Euf. Nieremb. pag. 210, in qua icon à Bellonio mutuata, Mus. Worm. pag. 294, in qua icon minimè accurata.*

Marcgr. Hist. Br. pag. 201.

Jonst. Avi. pag. 137.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 44. sp. 2.

Manucodiata prima. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 809. hujus icon minùs accurata pag. 810.*

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre IV.* 131

- Manucodiata prima Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 56. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XI.*
Raj. Syn. Avi. pag. 20. N° 1.
- Manucodiata, prima species. *Jonst. Avi. pag. 117. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 55, sub titulo, Manucodiata Aldrovandi.*
- Manucodiata, Avis Paradisi. *Klein. Avi. pag. 63. N° 1.*
- Manucodiata, seu Avis Paradisea. *Gaz. Rup. Best. hujus icones non satis accuratæ Tab. 21.*
- Manucodiata, seu Avis Paradisi. *Marcgr. Hist. Br. pag. 219.*
- Manucodiata, seu Avis Paradisi altera Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 58.*
- Manucodiata altera Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag. 21. N° 7.*
- Manucodiata altera. *Euf. Nieremb. pag. 211, in qua icon minùs accurata.*
- Manucodiata altera Nierembergii. *Willugh. Ornith. hujus icon ab Eusebio Nierembergio mutuata Tab. XI.*
- Manucodiata Wormii. *Willugh. Ornith. pag. 55. hujus icon à Wormio mutuata Tab. XI.*
- Manucodiata, Apos Indica. *Charlet. Exer. pag. 116. N° 1.*
Charlet. Onomazt. pag. 111. N° 1.
- Manucodiata Rex Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 57.*
- Manucodiata Rex Marcgravii, Willughbeji. *Raj. Syn. Avi. pag. 21. N° 6.*
Klein. Avi. pag. 63. N° 6.
- Manucodiata minoris generis. *Clus. Exot. Auâuar. pag. 361.*
- Manucodiata minoris generis Clusii. *Willugh. Ornith. pag. 60.*
- Manucodiata alba longa. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIX. sp. 1.*
- Manucodiata, tertia species; Hippomanucodiata. *Jonst. Avi. pag. 118. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 55, sub titulo, Manucodiata longa.*
- Manucodiata tertia Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 56.*
Klein. Avi. pag. 63. N° 3.
- Manucodiata tertia Aldrovandi, Hippomanucodiata dicta. *Raj. Syn. Avi. pag. 21. N° 3.*
- Tertia Manucodiata species, seu Hippomanucodiata. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 811. hujus icon pessima pag. 813.*
- Manucodiata quinta, seu vulgaris Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 57.*
- Manucodiata quinta, seu vulgaris Aldrovandi, Gesneri. *Raj. Syn. Avi. pag. 21. N° 5.*
Klein. Avi. pag. 63. N° 5.
- Manucodiata ultima species. *Jonst. Avi. pag. 118.*
- Quinta Manucodiata species, seu vulgaris. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 816. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 815.*
- Paradisea lutea, caudâ, pectore, abdomineque brunneis; gulâ azureâ. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 44. sp. 1.*

Paradisæa. *Moehr. Avi. Gen.* 2.

Paradisea, vel Paradisi Avis. *Gesn. Avi. pag.* 636. *hujus icon à Bellonio mutuata pag.* 637.

Paradisi Avis, vel Paradisea. *Gesn. icon. Avi. pag.* 20, *in qua eadem icon.*

Paradisæa minoris generis Clusii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 22. N^o. 9.

Paradisea Avis majoris generis. *Clus. Exot. Auctuar. pag.* 360, *in qua icon minimè accurata.*

Paradisea Avis majoris generis Clusii. *Jonst. Avi. hujus icon à Clusio mutuata Tab.* 55.

Willugh. Ornith. pag. 59.

Paradisæa Avis majoris generis Clusii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 22. N^o. 8.

Avis Paradisea. *Hernand. Hist. Mex. pag.* 317. *hujus icon minùs accurata pag.* 318.

Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 41. *cap.* CXXIX.

Avis Paradisia, sive Manucodiata. *Jonst. Avi. hujus icon à Bellonio mutuata Tab.* 55.

Avis Paradisiaca. *Mus. Besl. pag.* 32. N^o. 1. *hujus icon non satis accurata Tab. IX. N^o. I.*

Avis Paradisiaca Aroëfica, maxima subrubra. *Seb. Vol. I. pag.* 99. *icones satis accuratæ Tab. LXIII, maris Fig. 1. & feminae Fig. 2.*

Avis Paradisi Aroëfica. *Klein. Avi. pag.* 64. N^o. 8.

Oiseau de Paradis. *Alb. Tom. III. pag.* 5; *avec une très-mauvaise figure Pl. 9.*

Phoenix. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 23 *a*; *avec une mauvaise figure pag.* 23 *b.*

Les Portugais l'appellent PASSAROS DE SOL. *Worm.*

Les Italiens, MANUCODIATA. *Gesn.*

Les Allemands, PARADYSS-VOGEL; LUFFT-VOGEL. *Gesn.*

Les Suédois, PARADIS FOGEL. *Linn.*

Les Anglois, BIRD OF PARADISE. *Charlet. Alb.*

Les Indiens, BOERES. *Worm.*

Il paroît de la grosseur d'un Pigeon, quoique cependant son corps ne soit réellement pas plus gros que celui d'un Etourneau. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jus-

Corporis crassitie Columbam æquare videtur, quamquam revera Sturnum non superet. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris

angulos usque octodecim lineas longum est; cauda sex pollices cum quatuor lineis; pes unum pollicem & undecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue viginti lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus verò laterales non nihil longitudine superat. Alæ complicatæ caudam extremam, exceptâ quindecim linearum distantia, pertingunt. Caput, guttur & collum plumis obteguntur brevissimis, densissimis & rigidis. Quæ partes capitis & colli superiores vestiunt, sunt pallidè aureæ. Basin rostri cingunt pennæ nigræ, holoserici villosi instar splendentes, & viridi colore, qualis in collo *Anatum* refulget, variantes. Guttur & genæ ad oculos usque concoloribus pennis vestiuntur. Pars colli inferior viridi-aureo splendenti colore micat. Dorsum, uropygium, venter imus, rectrices caudæ superiores & inferiores, pennæ alas superne & infernè tegentes, remiges & rectrices sunt dilutè castaneæ. Pectus futuratissimo imbuatur castaneo. Venter supremus eodem colore tingitur, sed dilutior multò, attamen quàm

qu'aux coins de la bouche à dix-huit lignes de long; sa queue six pouces quatre lignes; son pied un pouce onze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la distance de quinze lignes du bout de la queue. La tête, la gorge & le col sont couverts de plumes très-courtes, fort épaisses & roides. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'une belle couleur d'or pâle. La bâte du bec est entourée de plumes d'un noir de velours, changeant en un verd pareil à celui du col d'un *Canard*. Les plumes qui couvrent la gorge & les joues jusqu'aux yeux sont de la même couleur. La partie inférieure du col est d'un verd-doré éclatant. Le dos, le croupion, le bas-ventre, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessus & du dessous des aîles, les plumes des aîles & celles de la queue sont d'un marron clair. La poitrine est d'un marron très-foncé. Le haut du ventre est de la même couleur, mais beaucoup plus claire, quoique cependant plus foncée

que celle du bas-ventre. Les côtés sont garnis d'une grande quantité de très-longues plumes, dont les plus grandes ont jusqu'à dix-huit pouces huit lignes de longueur. Toutes ces plumes sont décomposées, c'est-à-dire que leurs barbes sont séparées les unes des autres, & n'ont aucune connexion entr'elles. Les supérieures sont mêlées de blanchâtre & de marron-pourpré; les autres sont d'un blanc-jaunâtre: quelques-unes des extérieures & des plus courtes sont d'une belle couleur d'or; & parmi ces dernières il y en a qui sont terminées d'un marron-pourpré très-brillant. Du croupion, au-dessus de l'origine de la queue, naissent deux plumes, longues d'environ deux pieds neuf pouces, qui n'ont des barbes qu'à leur origine & à leur bout, savoir depuis leur origine jusqu'à environ quatre pouces de distance, dans lequel espace elles sont d'un marron clair: ensuite la tige est absolument nue; il y paroît seulement, lorsqu'on la regarde avec attention, l'origine des barbes qu'on croiroit avoir été coupées. Cette tige est noirâtre, & elle s'obscurcit de plus en plus en approchant vers le bout, où elle est garnie, dans l'espace d'environ trois

in imo ventre saturatiore. Latera obsita sunt maximâ pennarum longissimarum copiâ, quarum longiores quidem unum pedem sex pollices & octo lineas æquant. Pennæ autem istæ sunt decompositæ, id est, ipsarum pinnulæ à se invicem sunt disjunctæ, & nullo modo inter se connectuntur. Quæ superiorem locum obtinent, albidò & castaneo-purpureo mixtæ sunt; reliquæ ex albo flavicant: quædam tamen exterius positæ, & quidem breviores, aureo splendenti refulgent; inter quas aliquæ castaneo-purpureo splendidissimo terminantur. Supra caudæ exortum, ab uropygio binæ oriuntur pennæ, duos pedes & novem circiter pollices longæ, in exortu & apice tantum pinnulis obsitæ, ab exortu scilicet ad quatuor circiter pollicum distantiam usque, in quo intervallo castaneo tinguntur diluto: ultra quod intervallum scapus penitus nudus evadit; attamen, attentè quidem intuenti, pinnularum quasi abscissarum rudimenta quædam apparent. Scapus autem nigricat, & sensim atque sensim fit obscurior versùs apicem procé-

dendo; in apice verò, idque secundum trium pollicum & sex circiter linearum distantiam, pinnulis obsitus est nigris, holoserici instar villosi splendentibus & viridi *Anatino* variantibus. Caput, servatâ corporis proportionem, exiguum. Oculi quoque minutissimi. Rostrum ex flavo viridescit. Pedes crassi, unguis longiusculi fufcescunt.

Fœmina in omnibus cum *mare* convenit, præterquam quod pinnulæ, quibus binæ longissimæ pennæ, ab uropygio ortæ, in apice obsitæ sunt, multò quàm in *mare* sint breviores.

Habitat in *Moluccis Insulis*, unde in *musæum Real-murianum* à *D. Godeheu* allata est.

Species prima, tertia & quinta ab *Aldrovando* descriptæ, binæ species à *Clusio*, duæ species à *Nieremberg*, & species binæ à *Marcgrave* descriptæ, unam eandemque constituunt speciem. Secunda *Aldrovandi* species Avis est alterius generis, ut infra patebit. Species verò quarta, scilicet

pouces six lignes, de barbes d'un noir de velours changeant en un verd de *Canard*. Sa tête est petite, à proportion du corps. Ses yeux sont aussi fort petits. Son bec est d'un jaune-verdâtre. Ses pieds sont gros & bruns, ainsi que ses ongles, qui sont assez longs.

La femelle diffère du mâle par les barbes du bout des deux longues plumes, qui sortent du croupion, lesquelles barbes sont beaucoup plus courtes que dans le mâle.

On le trouve aux *Molouques*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Godeheu*.

Les première, troisième & cinquième espèces décrites par *Aldrovande*, les deux espèces décrites par *Clusius*, les deux décrites par *Nieremberg*, & les deux décrites par *Marcgrave* ne sont qu'une seule & même espèce. La seconde espèce d'*Aldrovande* est un Oiseau d'un autre genre, comme on le verra ci-après. A l'égard de sa quatrième espèce, sçavoir

Manucodiata quarta species, seu Manucodiata cirrata. *Aldrov. Avi. Tom I. pag. 811, cujus icon pessima pag. 814.*

Manucodiata, quarta species. *Jonst. Avi. pag. 118.*

Manucodiata quarta, seu cirrata Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 57.*

Manucodiata quarta Aldrovandi, seu cirrata. *Raj. Syn. Avi. pag. 21.*

Nº. 4.

Klein. Avi. pag. 63. Nº. 4.

Cette espece est si mal décrite & si mal figurée, qu'il est impossible de connoître l'Oiseau & de déterminer son genre. Hujus speciei ità manca est descriptio & pessima icon, ut istius Avis speciem & genus assignare nequeam.

**** 2. LE PETIT OISEAU-DE-PARADIS.**

Voyez Pl. XIII. Fig. 2.

Manucodiata superne castaneo - purpurea, infernè albida; pectore taniâ transversâ, viridi-aureâ notato; pennis laterum longioribus; pennis duabus ex uropygio ortis apice reflexis MANUCODIATA MINOR.

Manucodiata Rex. *Mus. Besl. pag. 33. Nº. 2. hujus icon minùs accurata Tab. IX. Nº. 2.*

Manucodiata minor sanguinea; Rex Paradys. *Petiv. Gaz. Nat. hujus icon minùs accurata Tab. LIII. Fig. 2.*

Rex Avium Paradisearum majoris generis. *Clus. Exot. Aucuar. pag. 362, in qua icon minùs accurata.*

Rex Avium Paradisearum majoris generis Clusii. *Willugh. Ornith. pag. 61. hujus icon à Clusio mutuata Tab. LXXVII, sub titulo, Manucodiata Rex Clusii.*

Raj. Syn. Avi. pag. 22. Nº. 10.

Rex Avium Paradisearum Clusii. *Euf. Nieremb. pag. 211, in qua icon à Clusio mutuata.*

Jonst. Avi. hujus icon à Clusio mutuata Tab. 55.

Rex Avium Paradisearum majoris moduli. *Klein. Avi. pag. 64. Nº. 7.*

Avis regia, seu Paradisiaca, minor, Amboinensis. *Seb. Vol. I. pag. 63. hujus icon non satis accurata Tab. XXXVIII. Fig. 5.*

Avis regia, seu Paradisi, minor Amboinensis. *Klein. Avi. pag. 64. Nº. 8. Les Anglois l'appellent KING OF BIRDS OF PARADISE. Willugh.*

Il n'est guères plus gros qu'une Alouette hupée. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de Crassitie Alaudam cristatam non multum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor

quatuor pollices & novem lineas æquat, & ad extremos unguis quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem longum est; cauda eâdem longitudine pollet; pes duodecim cum semi lineas longus; & trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas : laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales nonnihil longitudine superat. Alæ complicatæ ad quatuordecim linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput pennis obsitum est brevissimis, densissimis, rigidis & sursum erectis : quæ pennæ mandibulam superiorem ad mediam usque longitudinem, aut etiam ultra, cooperiunt. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pennæ caudam superne tegentes, alarumque tectrices splendidissimo imbuuntur castaneo-purpureo : qui color in capite superiore dilutior, in collo inferiore saturatior. Pennæ dorsum & uropygium vestientes serici instar sunt mollissimæ. In pectore tænia est transversa, quatuor aut quinque lineas lata, viridi-aureo colore,

Tome II.

quatre pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue est de la même longueur; son pied a douze lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quatorze lignes au-delà du bout de la queue. La tête est couverte de plumes très-courtes; fort épaisses, roides & redressées vers le haut : ces plumes s'étendent sur le demi-bec supérieur jusque vers la moitié de sa longueur, ou même au-delà. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & celles des aîles sont d'un marron-pourpre très-brillant : cette couleur est moins foncée sur la tête, & l'est le plus à la partie inférieure du col. Les plumes du dos & du croupion ressemblent à de la soie. La poitrine est traversée par une bande de quatre ou cinq lignes de largeur, d'un verd-doré pareil à celui du col d'un *Canard*. Le reste de la poitrine, le ventre,

S

les jambes & les couverturès du dessous de la queue sont blanchâtres. Les côtés sont couverts de larges plumes, longues d'environ seize lignes, d'un gris-brun, & terminées par une bande transversale, du même verd-doré que celui de la poitrine : ces plumes semblent être coupées quarrément par le bout. Les plumes des aîles sont rousses. Celles de la queue sont brunes. Du croupion, au-dessus de l'origine de la queue, naissent deux plumes longues de six pouces, ressemblantes à des filets, d'abord rousses & ensuite noirâtres, & dégarnies de barbes dans toute leur longueur, excepté à leur origine, où elles en ont quelques-unes teintes de la même couleur que les plumes de la queue, & à leur bout, où ces barbes sont d'un verd-doré pareil à celui du col d'un *Canard*. Le bout de ces deux plumes est recourbé en spirale vers le côté intérieur. La tête est petite, à proportion du corps, & fort allongée. Les yeux sont aussi fort petits. Le bec est blanchâtre. Les pieds sont gros & noirâtres, ainsi que les ongles, qui sont assez longs. On le trouve à l'*Isle d'Amboine*. Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

qualis in collo *Anatino* refulget, imbuta. Reliquum pectoris, venter, crura & rectrices caudæ inferiores albidæ. Latera vestiunt pennæ latæ, sexdecim circiter lineas longæ, griseo-fuscæ, & taniâ transversâ, eodem viridi-aureo colore ac in pectore tinctâ, terminatæ : pennæ autem istæ in apice quasi quadratim abscissæ videntur. Remiges pennæ sunt rufæ. Rectrices fuscæ. Supra caudæ exortum, ab uropygio binæ oriuntur pennæ sex pollices longæ, filiformes, primum rufæ, dein nigricantes, pinnulis destitutæ per totam longitudinem, exceptis exortu, in quo quædam sunt pinnulæ rectricibus concolores, & apice pinnulis prædito viridi-aureo *Anatino* colore tinctis. Pennarum autem istarum apices versùs partem intimam spiraliter reflectuntur. Caput, pro corporis proportionem, parvum & maximè elongatum. Oculi quoque exigui. Rostrum albicat. Pedes crassi, unguesque longiusculi nigricant. Habitat in *Amboinensi Insula*. Ex museo D. Aubry.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Oiseau-de-Paradis.

2. Petit Oiseau-de-Paradis.



ORDO V.

ORDRE V.

A V E S

LES OISEAUX

Digitis quatuor, membranis destitutis, tribus scilicet anticis, uno postico, omnibus circiter usque ad exortum discretis: cruribus ad calcaneum usque plumosis: & rostro recto; mandibulâ superiore apice utrinque emarginatâ donatæ.

Qui ont quatre doigts, dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon: le bec droit; & les bords de la mandibule supérieure échancrés vers le bout.

OMNIUM hujus Ordinis Avium digitus trium anticorum medius ab exortu ad primum usque articulum cum extimo arctè cohæret (*vide Vol. I. Tab. I. Fig. 3*).

Aliæ rostrum habent superne convexum: aliæ rostro donantur horizontaliter basi compresso & ferè triangulari. In duas sectiones illas dividimus. Prima continet eas quæ rostrum habent superne convexum (*vide Vol. I. Tab. VI. Fig. 1 & 2*), ut

TOUS les Oiseaux de cet Ordre ont celui du milieu des trois doigts antérieurs étroitement uni avec l'extérieur depuis son origine jusqu'à la première articulation (*voyez Tom. I. Pl. I. Fig. 3*).

Les uns ont le bec convexe en-dessus; & les autres ont le bec comprimé horizontalement à sa base & presque triangulaire. Nous les divisons en deux sections: dans la première sont ceux qui ont le bec convexe en-dessus (*voyez Tom. I. Pl. VI. Fig. 1. & 2*), comme la

Sij

Pie-grièche, la *Grive*, le *Cotinga*: & dans la seconde ceux dont le bec est comprimé horizontalement à sa b  se & presque triangulaire (voyez Tome I. Pl. VI. Fig. 3), comme le *Gobe-mouche*.

Lanius, *Turdus*, *Cotinga*: secunda illas qu   rostro donantur horizontaliter basi compresso & fer   triangulari (vide Vol. I. Tab. VI. Fig. 3), ut *Muscicapa*.

SECTION I.

Ceux dont le bec est convexe en-dessus.

Cette section contient trois genres d'Oiseaux. Les uns ont le bec aussi   pais que large    sa b  se ; & parmi ceux-ci, dans les uns le bout de la mandibule sup  rieure est crochu, comme dans la *Pie-gri  che* : & dans d'autres le bout de la mandibule sup  rieure est presque droit, comme dans la *Grive* : les autres ont le bec plus large qu'  pais    sa b  se, comme le *Cotinga*.

XXI.

Le genre de la Pie-gri  che.

Son caract  re est d'avoir Quatre doigts, d  nu  s de membranes ; trois devant, un derri  re ; tous s  par  s environ jusqu'   leur origine :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

SECTIO I.

E   qu   rostrum habent superne convexum.

IN illa sectione tria continentur Avium genera. In aliis basis rostri crassities latitudinem   quat ; inter quas alia mandibulam superiorem habent apice aduncam, ut *Lanius* ; alia mandibulam superiorem apice subrectam, ut *Turdus* : in alteris basis rostri latitudo crassitiem superat, ut *Cotinga*.

XXI.

Genus Lanii.

Hujus character est Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus ; omnes circiter usque ad exortum discreti :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre V.* 14

Rostrum rectum , superne convexum , basis crassitie latitudinem æquante :	Le bec droit , convexe en-dessus , aussi épais que large à sa bâte :
Mandibula superior apice utrinque emarginata :	Les bords de la mandibule supérieure échancrés vers le bout :
Apex mandibulæ superioris aduncus.	Le bout de la mandibule supérieure crochu.

** I. LA PIE-GRIESCHE GRISE.

Lanius superne dilutè cinereus , infernè albus ; tæniâ utrinque per oculos nigrâ ; pennis scapularibus albis ; rectricibus in exortu & apice albis , in medio nigris ; extimâ in utroque latere , proximè sequenti in latere exteriori per totam longitudinem albis LANIUS CINEREUS.

Lanius cinereus. *Gesn. Avi. pag. 579, in qua maris icon minimè accurata.*

Lanius cinereus mediæ magnitudinis. *Gesn. icon. Avi. pag. 13, in qua eadem icon.*

Lanius cinereus major. *Willugh. Ornith. pag. 53.*

Lanius cinereus major Willughbeyi. *Klein Avi. pag. 53. N°. 1.*

Lanius cinereus major Willughbeyi ; Sylvarum Dominus ; Spinitorquus. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 387.*

Lanius major. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 291.*

Lanius , seu Collurio cinereus major. *Raj. Syn. Avi. pag. 18. N°. A. 3.*

Lanio. *Charlet. Exer. pag. 72. N° 13.*

Charlet. Onomast. pag 65. N°. 13.

Collurio. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag 384. fæminæ icon non satis accurata pag. 386.*

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 78. sp. 3.

Collurio major. *Jonst. Avi. pag. 12. hujus icon non satis accurata Tab. 43 ; sub titulo , Collurio , seu Lanarius ; & insuper maris icon à Gesnero mutuata Tab. X, sub titulo , Lanius minor , & fæminæ icon ab Aldrovando mutuata Tab. IX, sub titulo , Lanius cinereus fœmina.*

Collyrio. *Moehr Avi. Gen. 1.*

Ampelis cœrulescens ; alis caudâque nigricantibus. *Faun. Suec. Linn. N°. 181.*

Pica mediæ magnitudinis ; Lanius medius , seu secundus. *Frisch. maris & fæminæ icones accuratæ Tab. 60.*

Castrica Palombina. *Olina. pag. 41, in qua icon satis accurata.*

Grande Pie-grièche. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 126 ; avec une figure peu exacte pag. 127.*

Pie-grièche grise. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 20 b , dans laquelle est la même figure.*

Grand Ecorcheur cendré. *Alb. Tom. II. pag. 9 ; avec une figure mal coloriée Pl. 13.*

Les Grecs l'appellent *Κολυρίων*. *Bel. Εννεόκλονος*. *Schwenck.*

Les Turcs , *GEZEGAN*. *Gesn. Aldrov.*

Les Italiens , *GAZA SPERVIERA*. *Gesn. Aldrov. Olina. GAZA MARINA ; PASSERA GAZERA ; REGESTOLA ; REGESTOLA FALCONIERA. Gesn. Aldrov. FALCONELLO. Bel. Aldrov. Olina.*

Les Italiens , aux environs du Lac majeur , *ORESTO. Gesn. Aldrov.*

Les Italiens dans la campagne de Rome , *CASTRICA ; CASTRICA PALOMBINA. Olina.*

Les Ferrarois , *DESTOLO FALCONIERO. Gesn. Aldrov.*

Les Habitans des montagnes d'Ombrie , *CASTRIGA. Aldrov.*

Les Toscans , *VERLA. Olina.*

Les Lombards , *STRAGAZZINA ; RAGAZZOLA. Olina.*

Les Savoyards , *MATAGASSE ; ARNEAT. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands , *THORN - KRETZER ; THORN-TRAEER. Gesn. Aldrov. WALDT-HERR ; WALDT-HOEHER. Schwenck. WALD-HERR ; WALD-HOEHER. Rzac. NEGHEN-DOER. Willugh.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg & de Francfort , *WER-KENGEL ; WAR-KENGEL. Gesn. Willugh. WAR-KRENGEL ; WURG-ENGEL. Schwenck.*

Les Silésiens , *WAN-KRENGEL. Schwenck.*

Les Westphaliens , les Hessois & les Thuringiens , *NEUN-MOERDER. Schwenck. Rzac. NUN-MOERDER ; NUN-TOEDER. Gesn. Aldrov. MITLERE NEUN-TODER. Frisch.*

Les Suisses aux environs de Fribourg , *WALD-HAER ; WALD-HERR. Gesn. Aldrov.*

Les Polonois , *D'ZIERZBA ; SROKOS WIEKSZY. Rzac.*

Les Oiseleurs Suédois , *WAR-FOGEL. Linn.*

Les Anglois , *BUTCHER-BIRD ; ADDER-BIRD. Charlet. GREATER BUTCHER-BIRD. Willugh. Raj. ASH COLOURED BUTCHER-BIRD. Alb. MATTAGESS. Willugh. MATTAGASSE. Raj.*

Les Habitans de la Province d'York , *WIERANGEL. Willugh. WEREANGEL. Raj.*

Elle est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces quatre lignes, & jusqu'à

Turdum Iliacum crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & quatuor lineas ex-

plet., & ad extremos ungues septem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsis unco ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices cum duabus lineis; pes duodecim cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue decem cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; posticus verò laterales longitudine superat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & novem linearum; alæ verò complicatæ paulò ultra quartam longitudinis caudæ partem protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium pennis vestiuntur dilutè cinereis. Pennæ scapulares albescent. In utroque capitis latere lata extat tænia nigra, ab oris angulis orta, per oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Nares pennis cooperiuntur nigris, supra quas, sicut & versùs oris angulos, longiusculi rigent pili concolores, setarum instar rigidi. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam superne & inferne

celui des ongles de sept pouces sept lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; sa queue quatre pouces deux lignes; son pied douze lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est plus long que ces derniers. Elle a douze pouces neuf lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du quart de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont d'un fort joli cendré clair. Les plumes scapulaires sont blanches. De chaque côté de la tête est une large bande noire, qui commence aux coins de la bouche, & s'étend jusque vers l'occiput, en passant par les yeux. Les narines sont couvertes de plumes noires, au-dessus desquelles, ainsi qu'aux coins de la bouche, sont de longs poils de la même couleur, roides comme des foyes. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blan-

ches. Les petites du dessus de l'aîle sont d'un cendré clair : les grandes sont noires. Les plumes de l'aîle sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur ; cependant cette couleur s'étend d'autant plus loin , que les plumes se rapprochent plus du milieu de l'aîle , & il y a d'autant moins de blanc , que les plumes , partant du milieu de l'aîle , s'éloignent ou se rapprochent plus du corps ; le reste de leur longueur est noir : le bord extérieur des trois premières est d'un blanc sale : les moyennes sont terminées de blanc , & ont leur bord intérieur de cette couleur , si l'on en excepte les deux ou trois plus proches du corps , qui n'ont de blanc qu'à leur bout & un peu à leur origine. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont blanches à leur origine , le reste de leur longueur est noir & terminé par une petite tache blanche : les trois suivantes de chaque côté sont blanches à leur origine , ensuite noires & terminées de blanc , cette dernière couleur occupant d'autant plus d'espace , que la plume est plus extérieure : la cinquième est blanche dans toute sa longueur du côté extérieur ; le côté intérieur est de cette

regentes , alarumque rectrices inferiores albescent. Rectrices alarum superiores minores sunt dilute cinereae : majores vero nigrae. Remiges ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque albæ ; quæ albedo eò magis versus pennæ apicem protrahitur , quò remix alæ medio fit proximior ; & eò minus albore tinguntur remiges , quò ab alæ medio fiunt remotiores , sive ad corpus accedant , sive à corpore discedant ; in reliqua longitudine nigricant : trium priorum remigum margines exteriores sordide albescent : minores remiges apicibus & marginibus interioribus donantur albis , exceptis tamen binis aut tribus corpori finitimis , apice tantum & versus exortum candidis. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediae sunt in exortu albæ , in reliqua longitudine nigrae , exigua macula albâ terminatae : tres utrinque sequentes in exortu albæ , deinde nigrae , apicibus albis ; quæ tamen albedo eò magis versus pennæ exortum extenditur , quò rectrix fit exterior : quinta in latere exteriori per totam longitudinem alba , in latere vero

verò interiore versùsexortum candida, deinde ad mediam circiter longitudinem usque nigra, & rursum in ultima medietate candida : utrinque tandem extima in toto alba est, excepto tamen scapo, in prima pennæ medietate nigro. Rectrices binæ intermediæ lateralibus sunt longiores; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur, ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum, pedes, unguesque nigri. *Insectis* præcipuè victitat. Aviculas quoque insectatur, easque dilaniat ac devorat. *Ex museo Realmuriano.*

dernière couleur vers l'origine de la plume, ensuite noir jusqu'à la moitié de sa longueur, & la dernière moitié est blanche : enfin la plus extérieure de chaque côté est toute blanche, excepté une partie de sa tige, qui est noire dans sa première moitié. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. Elle se nourrit ordinairement d'*Insectes*. Elle court aussi sur les petits Oiseaux & les mange. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

A. LA PIE-GRIESCHE BLANCHE.

Lanius albus.

Lanius albus. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 387, in qua icon non satis accurata.

Collurio totus albus. Jonst. Avi. pag. 13. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. IX, sub titulo, Lanius albus.

Magnitudine & crassitie cum præcedenti convenit; ab illo autem colore discrepat. In universo enim corpore albus est. Rostrum, unguesque nigricant. Pedes lutescunt.

Elle est de la même grosseur & de la même grandeur que la précédente; mais elle en diffère par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. Son bec & ses ongles sont noirâtres; & ses pieds jaunâtres.

2. LA GRANDE PIE-GRIESCHE GRISE.

Lanius superne dilutè cinereus, infernè albus; tæniâ utrinque per oculos nigrâ; pennis scapularibus rufescentibus; rectricibus in exortu & apice albis, in medio nigris; extimâ in utroque latere, proximè sequenti in latere exteriori per totam longitudinem albis LANIUS CINEREUS MAJOR.

Lanius major. Gesn. Avi. pag. 581, in qua icon minùs accurata.

Gesn. icon. Avi. pag. 13, in qua eadem icon.

Lanius major Gesnero. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 285.

Lanius cinereus maximus Gesneri. Willugh. Ornith. pag. 53.

Lanius cinereus maximus Gesneri & Willughbeyi. Rzac. Auçt. Hist. Nat. Pol. pag. 388.

Lanius. Jonst. Avi. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. X.

Aliud Laniorum genus majus Ornithologi. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 389.

Pica cinerea, seu Lanius major. Frisch. maris & fœminæ icones accuratæ Tab. 59.

Les Allemands l'appellent WER-KENGEL; WAR-KENGEL. Gesn. Aldrov. BERG-AELSTER; GROSSERE NEUN-TODER. Frisch. NEUN-MOERDER; ALLER-GROESTER; FINCKEN-HABICHT. Rzac.

Les Polonois, SROKOS; DZIERZBA; SROKOS NAYWIEKSZY POPIELASTY. Rzac.

Elle est plus grande & plus grosse que la *Pie-grièche grise ordinaire*. D'ailleurs elle lui ressemble assez par la forme du corps & les couleurs, si l'on en excepte les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des aîles, qui sont roussâtres.

Je ne connois point cette espèce.

Magnitudine & crassitie *Lanium cinereum vulgarem* antecellit. Attamen cum illo convenit formâ corporis & colorum varietate, si tamen excipias scapulares pennas & rectrices alarum superiores minores rufescentes.

Speciem istam non novi.

** 3. LA PIE-GRIESCHE ROUSSE.

Lanius superne tricolor, infernè albus, rufescente admixto; taniâ utrinque per oculos nigrâ; pennis scapularibus albis; rectricibus primâ medietate albis, alterâ medietate nigris; lateralibus apice albis; extimâ exterius per totam longitudinem albâ. (*Mas*).

Lanius superne rufus, fusco transversim striatus, infernè sordidè albo-rufescens; pectore & lateribus lineis fuscis, circumferentiæ pennarum parallelis, notatis; rectricibus obscure rufis, taniâ fuscâ versùs apicem, apice rufescente; extimâ taniâ fuscâ per totam longitudinem exterius donatâ, margine rufescente. (*Fœmina*) LANIUS RUFUS.

Lanius pectore, gulâ & ventre niveis; ex albo & fusco variegatus; superiore corporis parte & colli æruginosâ. *Klein. Avi. pag. 54. N°. 4.* (*Mas*).

Lanius an minor primus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 54. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. X, sub titulo*, *Lanius cinereus major.* (*Mas*).

Lanius minor cinerascens, seu rufo-cinereus, cum macula in scapulis alba. *Raj. Syn. Avi. pag. 19. N°. A. 6.* (*Mas*).

Lanius minor cinerascens Raji, Willughbeyi. *Klein. Avi. pag. 54. N°. 5.* (*Mas*).

Lanius minor rufo-cinereus Raji. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 388.* (*Mas*).

Lanius fœmina, similis secundo Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 54.*

Lanius minor rutilus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 292.* (*Fœmina*).

Lanius minor rutilus Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag. 53. N°. 3.* (*Fœmina*).

Lanius minor rutilus, seu *Lanius parvus rubeus* Schwenckfeldii. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 388.* (*Fœmina*).

Lanius Collurio. *Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XI.* (*Mas*).

Collurionis parvi primum genus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 389, in qua hujus icon minimè accurata.* (*Mas*).

Pica minima; *Lanius minor* seu tertius. *Frisch. maris & fœminæ icones satis accuratæ Tab. 61.*

Ampelis dorso griseo, maculâ ad oculos longitudinali: *Fœmina.* *Faun. Suec. Linn. N°. 180. hujus icon non satis accurata Tab. II. N°. 180.* (*Fœmina*).

Ecorcheur à tête rouge. *Alb. Tom. II. pag. 11 ; avec une figure mal coloriée du mâle Pl. 16.*

Petit Ecorcheur femelle. *Alb. Tom. II. pag. 10 ; avec une figure mal coloriée Pl. 15.*

On l'appelle aux environs d'Alais TARGANAS DE LA TESTO ROUJHO.

Les Boulonnois l'appellent BUFERULA. *Aldrov.*

Les Anglois, WOOD-CHAT ; LESSER ASH-COLOURED BUTCHER-BIRD. *Raj.*

Elle est à peu près de la grosseur d'une *Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces deux lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long ; sa queue trois pouces ; son pied onze lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes : les latéraux sont beaucoup plus courts ; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a onze pouces six lignes de vol ; & ses ailes lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les plumes de la bête du bec sont d'un blanc-rouffâtre. Au-dessus de ces plumes, ainsi qu'aux coins de la bouche, sont de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le synciput est noirâtre. De chaque côté de la tête s'étend une large bande

Alaudam cristatam crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & tres lineas explet ; & ad extremos ungues sex pollices cum duabus lineis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque decem lineas longum est ; cauda tres pollices ; pes undecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas : laterales multò sunt breviores ; posticus autem laterales paululum longitudine superat. Alis expansis, extremitates majorum remigum undecim pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam ferè caudæ longitudinem attingunt. Pennæ basi rostri incumbentes ex albo rufescunt. Supra quas pennas & versùs oris angulos longiusculi extant pili, antrorsum versi, & setarum instar rigidi. Synciput nigricat ; & in

utroque capitis latere lata adest tania pariter nigricans, per oculos ducta, & secundum colli latera protensa. Partes capitis & colli superiores sunt dilute castaneæ. Dorsum supremum nigricat. Dorsum infimum & uropygium sunt cinerea. Tectrices caudæ superiores & pennæ scapulares albescent. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ albæ, aliquâ rufescentis mixturâ tinctæ. Tectrices caudæ inferiores concolores. Pennæ alas subtus tegentes, & quidem corpori viciniiores nigricantes; à corpore verò remotiores candidæ. Alarum tectrices superiores nigricant, minorum & quarundam majorum marginibus griseis. Remiges majores ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque candidæ, à medietate ad extremitatem fuscæ : minores per totam longitudinem fuscæ, apicis margine albido : color fuscus trium quatuorve remigum corpori viciniorum saturatissimus est & ad nigredinem accedit. Cauda duodecim constat rectricibus, quarum binæ intermediae sunt ab exortu ad tertiam

de la même couleur, qui passe par les yeux, & descend le long des côtés du col. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un marron clair. La partie supérieure du dos est noirâtre. La partie inférieure du dos & le croupion sont cendrés. Les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont blanches. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc mêlé d'une très-légère teinte de roussâtre. Celles du dessous de l'aîle les plus proches du corps sont noirâtres; & les plus éloignées du corps sont blanches. Les couvertures du dessus des aîles sont noirâtres : les petites & quelques-unes des grandes sont bordées de gris. Les grandes plumes de l'aîle sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; l'autre moitié est brune : les moyennes sont de cette dernière couleur, & bordées de blanchâtre par le bout : la couleur brune est très-foncée & presque noire dans les trois ou quatre de ces plumes, qui sont les plus proches du corps. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont blanches

depuis leur origine jusque vers le tiers de leur longueur, & le reste est noir : les quatre suivantes de chaque côté sont pareillement blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, l'autre moitié est noire & terminée de blanc : enfin la plus extérieure de chaque côté est blanche dans toute sa longueur du côté extérieur ; & le côté intérieur est blanc à l'origine de la plume, ensuite noir, & terminé de blanc : le blanc, placé à l'origine & au bout, occupe d'autant plus d'espace dans chacune de ces plumes, qu'elles sont plus extérieures ; & le noir dans quelques-unes est très-peu foncé. Le bec est noirâtre. Les pieds & les ongles sont bruns. Ceci est la description du *mâle*.

La *femelle* en diffère par ses couleurs. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont rousses & rayées transversalement de brun. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des ailes sont pareillement rousses, & chacune est marquée d'une raye brune, qui en fait le tour & qui est parallèle à sa circonférence. La gorge, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc

circiter longitudinis partem usque albæ, in reliqua longitudine nigræ: quatuor utrinque sequentes pariter albæ ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque, in altera medietate nigræ, attamen apicibus albis: utrinque tandem extrema in latere exteriori per totam longitudinem alba; in latere verò interiori in exortu alba, dein nigra, & rursus apice candida: albedo autem exortum & apicem rectricum tingens eò majus spatium occupat, quò rectrix fit exterior; & color niger in quibusdam rectricibus fit dilutior. Rostrum nigricat. Pedes, unguesque fuscescunt. Hæc est *maris* descriptio.

Fœmina ab illo colore discrepat. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium & pennæ caudam superne tegentes sunt rufæ, fusco transversim striatæ. Scapulares pennæ, alarumque rectrices superiores similiter rufæ, taniâ fuscâ unamquamque pennam ambiente, & circumferentiæ pennarum parallelâ. Guttur, venter & caudæ rectrices inferiores sunt sordidè albo-rufescentes. Pars colli inferior, pec-

tus, latera, alaeque subtus cooperientes pennæ concolores, sed quælibet penna, alarum rectricum superiorum instar, tæniâ fuscâ, ipsius circumferentiæ parallelâ, notatur. Remiges fuscae sunt, marginibus exterioribus rufis. Caudam componunt duodecim rectrices obscurè rufæ, tæniâ fuscâ versùs apicem præditæ, apice dilutè rufescentes : utrinque extrema, quæ quidem cæteris paulò brevior, tæniâ insuper donatur fuscâ, per totam longitudinem protensâ, sed in latere exteriori tantùm, margine dilutè rufescente. Rostrum, pedes, unguesque griseo-fusci. *Insectis* præcipuè victitat. Aviculas quoque insectatur, & cùm eas capit, illas dilaniat ac devorat. *Ex museo Realmuriano.*

fale & rouffâtre. La partie inférieure du col, la poitrine, les côtés & les couvertures du dessous de l'aîle sont de la même couleur, mais chaque plume est marquée, comme les couvertures du dessus des aîles, d'une raye brune, parallèle à sa circonférence. Les plumes des aîles sont brunes, & ont leur bord extérieur roux. La queue est composée de douze plumes d'un roux rembruni, marquées à leur bout d'une raye brune, & terminées de rouffâtre clair : la plus extérieure de chaque côté, qui est un peu plus courte que les autres, est aussi marquée dans toute sa longueur, mais du côté extérieur seulement, d'une pareille raye brune, après laquelle suit un rouffâtre clair. Le bec, les pieds & les ongles sont gris-bruns. Elle se nourrit ordinairement d'*Insectes*. Elle mange aussi de petits Oiseaux, lorsqu'elle en peut attraper. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 4. L'ECORCHEUR.

Lanius superne cinereus, infernè pallidè roseus ; dorso supremo rufo ; tæniâ utrinque per oculos nigrâ ; reatricibus lateralibus in exortu albis, apice nigricantibus, apicis margine albo ; tribus extimis exteriùs albo marginatis
COLLURIO.

Lanius minor primo ; capite & collo cinereis ; gutture & pectore incarnatis ; alis & dorso ex ærugine & nigredine variegatis, rostro & pedibus nigris. Klein. Avi. pag. 53. N°. 2.

- Lanius tertius Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 54.*
 Lanius minor, tertius nempè Aldrovandi. *Charlet. Exer. pag. 72. N^o. 13.*
 Lanius minor rufus, seu tertius Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag. 18. N^o. 4.*
 Lanius minor varius; Spinitorquus minor. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 292.*
 Lanius minor varius Schwenckfeldii; Collurio mas Aldrovandi. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 387.*
 Lanius. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 78. sp. 2.*
 Collurionis parvi tertium genus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 390, in qua hujus icon minimè accurata.*
 Merulæ congener alia. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 625, in qua icon minùs accurata.*
 Merulæ congener altera. *Jonst. Avi. pag. 76.*
 Merulæ congener alia Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 144. N^o. 3. Raj. Syn. Avi. pag. 67. N^o. 13.*
 Ampelis dorso griseo, maculâ ad oculos longitudinali. *Faun. Suec. Linn. N^o. 180. maris icon non satis accurata Tab. II. N^o. 180.*
 Petite Pie-grièche. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 128, dans laquelle il y a une mauvaise figure.*
 Pie-grièche; Pie escrayere; Pie ancrouelle. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 21 a, dans laquelle est la même figure.*
 Petit Ecorcheur. *Alb. Tom. II. pag. 10; avec une figure mal coloriée du mâle Pl. 14.*
Les Grecs l'appellent Κολλurioν. Bel.
Les Italiens, REGESTOLA FALCONIERA; GAZA SPERVIERA; GAZA MARINA; PASSERA GAZERA; FALCONELLO. Bel.
Les Boulonnois, BUFERLOTTO MASCHIO. Aldrov.
Les Savoyards, MATAGASSE; ARNEAT. Bel.
Les Allemands, KLEINER BUNDTER WAR-KRENGEL; KLEIN WAHN-KRENGEL; DORN-TRAEHER. Schwenck. KLEINER NEUN-MOERDER. Rzac.
Les Polonois, SROKOS MNIEYSSY PSTRY. Rzac.
Les Anglois, BUTCHER-BIRD; ADDER-BIRD. Charlet. LESSER BUTCHER-BIRD. Willugh. Alb. LESSER RED-BACKT BUTCHER-BIRD. Raj.
Les Habitans de la Province d'York, FLUSHER. Willugh. Charlet.

Il est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces trois lignes, & jus-

Præcedentem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & tres lineas explet, & ad extremos

Extremos ungues sex pollices cum lineis binis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda duos pollices & undecim lineas; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsi partem infimam & uropygium vestiunt pennæ cineræ. Teatrices caudæ superiores concolores. Quæ dorsum supremum obtegunt, sunt rufæ. Supra nares & versùs oris angulos longiusculi extant pili nigri, antrorsum reflexi, & setarum instar rigidi. In utroque capitis latere lata adest tania nigra, supra nares orta, per oculos ducta, & partem capitis posteriorem versùs protensa. Guttur & pars colli inferior albescent. Pectus, venter & latera roseo diluto colore tinguntur. Crura sunt cinerea.

Tome II.

qu'à celui des ongles de six pouces deux lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue deux pouces onze lignes; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a onze pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, la partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont cendrées. La partie supérieure du dos est rousse. Il y a au-dessus des narines, ainsi qu'aux coins de la bouche, de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. De chaque côté de la tête est une large bande noire, qui commence au-dessus des narines & s'étend vers le derrière de la tête, en passant par les yeux. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches. La poitrine, le ventre & les côtés sont d'une couleur de rose pâle. Les jambes sont cendrées. Les couvertures du

dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle sont blanches. Les petites du dessus de l'aîle sont brunes & bordées de roux : les grandes sont de la même couleur , mais la bordure rousse ne s'étend que du côté extérieur seulement. Les plumes de l'aîle sont brunes & leur bord extérieur est roussâtre. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noirâtres : les latérales sont blanches à leur origine , & noirâtres vers leur bout ; le blanc dans chacune de ces plumes s'étend d'autant plus loin vers son bout , que la plume est plus extérieure : les trois plus extérieures de chaque côté sont aussi bordées de blanc du côté extérieur & à leur bout ; & les deux latérales de chaque côté , les plus voisines des deux plumes du milieu , ne sont bordées de blanc qu'à leur bout seulement. De plus les tiges de toutes les plumes latérales sont noirâtres dans toute leur longueur. Le bec est noir. Les pieds sont bruns ; & les ongles noirâtres. Il se nourrit des mêmes alimens que les précédentes. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus cooperientes candidæ. Alarum tectrices superiores minores fuscæ , marginibus rufis : majores concolores , sed marginibus rufis in latere exteriori tantum præditæ. Remiges quoque fuscæ , oris exterioribus rufescentibus. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediae nigricantes : laterales in exortu albæ , apice nigricantes ; albedo autem eò magis versùs pennæ extremitatem protenditur , quò rectrix fit exterior : tres utrinque extremae sunt exteriùs & apice albo marginatæ ; & binæ utrinque laterales , duabus intermediis finitimæ , marginibus albis apice tantum præditæ sunt. Omnium insuper lateralium rectricum scapi per totam longitudinem nigricant. Rostrum nigrum. Pedes fusci ; ungues verò nigricantes. Eodem ac præcedentes cibo utitur. *Ex museo Realmuriano.*

** 5. L'ÉCORCHEUR VARIÉ.

Lanius superne griseus , infernè albo rufescens , fusco superne & infernè transversim striatus ; scapularibus pennis albo-rufescentibus , taniâ nigricante circumferentiæ parallelâ

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre V.* 155

præditis ; rectricibus tribus extimis in exortu & apice alborufescentibus , in reliqua longitudine nigricantibus ; extimâ exterius albo-rufescente COLLURIO VARIUS.

Lanius minor lineis albis & nigris semicircularibus variegatus. *Raj.*

Syn. Avi. pag. 19. N°. A. 5.

Lanius Arundinum. *Klein. Avi. pag. 54. N°. 10. hujus icon satis accurata pag. 186.*

Lanius alius. *Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XI.*

Collurio. *Charlet. Exer. pag. 72. N°. 12.*

Charlet. Onomazt. pag. 65. N°. 12.

Collurio, seu Lanius minor. *Willugh. Ornith. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. X.*

Collurionis parvi secundum genus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 390. hujus icon non satis accurata pag. 391.*

Les Boulonnois l'appellent BUFERLA. *Aldrov.*

Les Ferrarois, VERLE. *Aldrov.*

Les Anglois, LESSER VARIEGATED BUTCHER-BIRD. *Raj. LITTLE LANAR. Charlet.*

Præcedenti nonnihil craf-
fitie cedit. Ipsi-
us longitu-
do ab apice rostri ad cau-
dæ extremitatem sex polli-
ces & totidem lineas æquat,
& ad extremos ungues quin-
que pollices & undecim li-
neas. Rostrum ab ipsius un-
co ad oris angulos octo cum
femi lineas longum est ; cau-
da duos pollices & novem
lineas ; pes undecim lineas ;
& trium digitorum antico-
rum medius cum ungue no-
vem lineas ; laterales multò
sunt breviores ; & posticus
laterales nonnihil longitu-
dine excedit. Ab extremo ad
extremum alarum extensa-
rum distantia est decem pol-

Il est un peu moins gros que
le précédent. Sa longueur de-
puis le bout du bec jusqu'à ce-
lui de la queue est de six pouces
six lignes ; & jusqu'à celui des
ongles de cinq pouces onze li-
gnes. Son bec depuis son cro-
chet jusqu'aux coins de la bou-
che a huit lignes & demie de
long ; sa queue deux pouces
neuf lignes ; son pied onze li-
gnes ; & celui du milieu des
trois doigts antérieurs, joint
avec l'ongle, neuf lignes : les
latéraux sont beaucoup plus
courts ; & celui de derriere est
un peu plus long que ces der-
niers. Il a dix pouces neuf lignes
de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles
sont pliées, s'étendent un peu

au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont d'un gris rayé transversalement de brun. Les couvertures du dessus de la queue sont roussâtres, & variées de bandes transversales, noirâtres, formant chacune un arc de cercle. Les plumes scapulaires sont d'un blanc tirant un peu sur le roussâtre, & chacune est marquée d'une assez large bande noirâtre, qui en fait le tour, & qui est parallèle à sa circonférence. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont d'un blanc-roussâtre, varié, comme sur le dos, de lignes transversales, brunes. Le bas-ventre & les jambes sont d'un blanc-roussâtre & sans taches. Les couvertures du dessous de la queue sont roussâtres, & variées de quelques petites taches brunes, situées sur le milieu de la plume & tout le long de sa tige. Les petites couvertures du dessous de l'aile sont d'un blanc-roussâtre & sans taches : les grandes sont grises. Les petites du dessus sont noirâtres, & ont chacune une tache roussâtre, située au milieu de leur bout ; elles sont aussi bordées de cette dernière couleur : les grandes les plus proches du

licum & novem linearum ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ griseæ, fusco transversim striatæ. Quæ caudam superne obtegunt, rufescunt, & tæniis variegantur transversis ; nigricantibus paululùm arcuatis. Pennæ scapulares ex albo ad rufescentem colorem nonnihil inclinant, & unaquæque tæniâ notatur latiusculâ nigricante, eam ambiente, & circumferentiæ pennæ parallelâ. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter supremus & latera pennis vestiuntur albo-rufescentibus ; similiter ac in dorso, fusco transversim striatis. Venter imus & crura pennis albo-rufescentibus & immaculatis. Tectrices caudæ inferiores rufescunt, & minutis quibusdam maculis variegantur fuscis, in medio cujuslibet pennæ & secundùm scapi longitudinem collocatis. Alarum tectrices inferiores minores sunt albo-rufescentes & immaculatæ : majores griseæ. Superiores minores nigricantes, maculâ rufescente, in apicis

medio collocatâ, donatæ, oris insuper rufescentibus : majores corpori finitimæ concolores, marginibus tamen exterioribus rufis ; margo autem rufæ eò latior est, quò penna fit corpori vicinior : majores tandem à corpore remotiores nigricantes, oris albo-rufescentibus, sed in apice tantùm. Alam componunt novemdecim remiges, quarum prima brevissima, quarta verò omnium longissima. Decem primores sunt in exortu rufescentes, in reliqua longitudine superne nigricantes, infernè cineræ : novem reliquæ similiter superne nigricantes, infernè cineræ, sed per totam longitudinem : omnium autem remigum apicis margines sunt albo-rufescentes ; & oræ exteriores tertiæ, quartæ & quintæ, sicut & oræ exteriores octo remigum corpori viciniorum, sunt rufæ : margo autem rufæ eò latior est, quò remix fit corpori vicinior. Cauda duodecim constat rectricibus, quarum utrinque extrema decem intermediis paululùm longitudine cedit ; decem autem intermediæ æqualis sunt inter se longitudinis. Binæ intermediæ nigricant,

corps sont de la même couleur, mais elles sont bordées extérieurement de roux ; cette bordure est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées de blanc-rouffâtre seulement par le bout. Il y a dans chaque aîle dix-neuf plumes, dont la première est extrêmement courte, & la quatrième est la plus longue de toutes. Les dix premières sont rouffâtres à leur origine ; le reste de leur longueur est noirâtre en-dessus & cendré en-dessous : les neuf autres sont aussi noirâtres en-dessus & cendrées en-dessous, mais dans toute leur longueur : le bout de chacune de ces plumes est bordé de blanc-rouffâtre ; & le bord extérieur de la troisième, la quatrième & la cinquième, ainsi que celui des huit plus proches du corps, est roux : cette bordure est d'autant plus large, que la plume est plus voisine du corps. La queue est composée de douze plumes, dont la plus extérieure de chaque côté est un peu plus courte que les dix du milieu, qui sont toutes d'égale longueur entr'elles. Les deux du milieu sont noirâtres & bordées de roux extérieurement, intérieurement & par le bout : les deux

suivantes de chaque côté sont pareillement noirâtres, & bordées de rouffâtre extérieurement & au bout seulement : les trois plus extérieures de chaque côté sont d'un blanc-rouffâtre à leur origine & à leur bout ; le reste de leur longueur est noirâtre, excepté le côté extérieur de la plus extérieure & le bord extérieur des deux autres, qui sont aussi d'un blanc-rouffâtre. La bête du bec est hérissée de longs poils noirs, roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont gris-bruns. Il se nourrit des mêmes alimens que les précédents. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Je ne sçais si celui-ci n'est pas la femelle du précédent.

marginibus exterioribus, interioribus & in apice rufis : duæ utrinque sequentes similiter nigricantes, oris exterioribus & in apice tantum rufescentibus : tres utrinque extremæ in exortu & apice ex albo rufescunt, in reliqua longitudine nigricant, exceptis tamen latere exteriori extremæ & marginibus exterioribus duarum utrinque sequentium albo-rufescentibus. Circa basin rostri longiusculi rigent pili nigri, setarum instar rigidi. Rostrum pedes, unguisque griseofusci. Eodem ac præcedentes cibo utitur. *Ex museo Realmuriano.*

An præcedentis foemina ?

** 6. LA PIE-GRIESCHE GRISE DE CAYENNE.

Voyez Pl. XIV. Fig. 1.

Lanius dilutè cinereus ; capite rectricibusque nigris ; remigibus majoribus superne nigris, subtus cinereis LANIUS CAYANENSIS CINEREUS.

Elle est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces cinq lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bou-

Crassitie *Merulam* circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & quinque lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris

angulos quatuordecim lineas longum; cauda duos pollices cum undecim lineis; pes undecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum duodecim pollicum & decem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Capitis latera, sicut & superior pars, nigra sunt. Guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ superiores & inferiores & pennæ alas subtus tegentes sunt dilutè cinereæ. Alarum rectrices superiores corpori finitimæ concolores; à corpore verò remotiores nigrae. Remiges sunt superne nigrae, subtus verò cinereæ, exceptis tamen tribus corpori vicinioribus dorso concoloribus. Caudam componunt duodecim rectrices superne & infernè nigrae: laterales intermedias paululum longitudine excedunt; quo fit cauda nonnihil bifurca. Circa basin mandibulæ su-

che a quatorze lignes de long; sa queue deux pouces onze lignes; son pied onze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Elle a douze pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure & les côtés de la tête sont noirs. La gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle sont d'un cendré clair. Les couvertures du dessus de l'aîle les plus proches du corps sont de la même couleur; & les plus éloignées du corps sont noires. Les plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur en-dessus, & cendrées en-dessous; il faut cependant en excepter les trois plus proches du corps, qui sont du même cendré que le dos. La queue est composée de douze plumes noires dessus & dessous: les latérales sont un peu plus longues que celles du milieu; ce qui rend la queue un peu fourchue. Autour de la bête du demi-bec

supérieur font quelques petits poils noirs, roides comme des foyes. Le bec est rouge à son origine & noir à son bout. Les pieds sont cendrés; & les ongles noirâtres. On la trouve à *Cayenne*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

superioris quidam extant exigui pili nigri, setarum instar rigidi. Rostrum in exortu rubrum, apice nigrum. Pedes cinerei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Cayana*, unde in *museum Realmuriani* missus à *D. des Essars*.

** 7. LA PIE-GRIESCHE TACHETÉE DE CAYENNE.

Voyez *Pl. XIV. Fig. 2.*

Lanius dilutè cinereus, lineolis longitudinalibus nigris notatus; capite, rectricibusque nigris; remigibus majoribus superne nigris, subtus cinereis . . . LANIUS CAYANENSIS NÆVIUS.

Elle est de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue deux pouces huit lignes; son pied onze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière l'est encore davantage. Elle a douze pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce de distance du bout de la queue. La tête est noire:

Crassitie præcedentem æmulatur. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem octo pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pes undecim lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue decem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus adhuc brevior. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam, excepto pollicis

licis intervallo , pertingunt. Caput nigrum est ; guttur albicat. Collum , dorsum , uropygium , pectus , venter , latera , crura , pennæ caudam superne & infernè tegentes , alarumque tectrices superiores corpori finitimæ , sunt dilutè cinereæ , lineolis notatæ longitudinalibus , nigris , in collo & pectore crebrioribus , quàm in aliis corporis partibus. Tectrices alarum superiores à corpore remotiores nigræ : inferiores candidæ. Remiges majores superne nigræ , infernè cinereæ : minores in latere exteriori nigræ , in interiori ab exortu ad mediam circiter longitudinem candidæ , à medietate ad apicem nigræ ; attamen excipiendæ sunt quatuor corpori viciniore , eodem ac dorsum cinereo tinctæ. Rectrices penitùs nigræ. Circa basin mandibulæ superioris quidam extant exigui pili nigri , setarum instar rigidi. Rostrum in exortu obscurè rubrum , apice nigrum. Pedes cinerei ; ungues verò nigri. Habitat in *Cayana* , unde in *musæum D. Aubry* missus est.

la gorge blanche. Le col, le dos, le croupion , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessus de l'aîle les plus proches du corps sont d'un cendré clair marqué de petites lignes longitudinales , noires , qui sont plus fréquentes au col & à la poitrine que par-tout ailleurs. Les autres couvertures du dessus de l'aîle sont noires : celles du dessous sont blanches. Les grandes plumes de l'aîle sont noires en-dessus & cendrées en-dessous : les moyennes , excepté les quatre plus proches du corps , qui sont du même cendré que le dos , sont aussi noires , & ont depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur leur côté intérieur blanc. Celles de la queue sont tout-à-fait noires. Autour de la bâte du demi-bec supérieur sont quelques petits poils noirs , roides comme des foyes. Le bec est d'un rouge obscur à son origine , & noir vers le bout. Les pieds sont cendrés ; & les ongles noirs. On la trouve à *Cayenne* , d'où elle a été envoyée à *M. l'Abbé Aubry* , qui la conserve dans son cabinet.

** 8. LA PIE-GRIESCHE DE LA LOUISIANE.

Voyez Pl. XV. Fig. 2.

Lanius superne cinereus, internè albus; taniâ infra oculos nigrâ; remigibus majoribus primâ medietate albis, alterâ medietate nigris; rectricibus nigris, lateralibus in exortu & apice albis . . . LANIUS LUDOVICIANUS.

Elle est un peu moins grosse que notre *Pie-grièche grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue trois pouces neuf lignes; son pied douze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a douze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des ailes sont cendrées. De chaque côté de la tête, sur chaque joue, est une bande longitudinale, noire, qui passe sous les

Lanio cinereo nostrati nonnihil crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem cum semi lineas longum est; cauda tres pollices cum novem lineis; pes unum pollicem; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue novem lineas: laterales multo sunt breviores; & posticus laterales nonnihil longitudine excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum; alæ verò complicatæ ad tertiam longitudinis caudæ partem usque protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & rectrices alarum superiores minores sunt cinereæ. In utroque capitis la-

tere, supra utramque genam, tania extat longitudinalis, nigra, infra oculos ducta. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, pennæ caudam superne & infernè coeperientes, alarumque tectrices inferiores albescent. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, concolores. Tectrices alarum superiores majores nigrescent. Novem primores remiges ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque albæ, à medietate ad apicem nigrescentes: sequentes omnes nigrescent, orisque donantur interioribus albidis: omnes insuper remiges minores albo terminantur. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediæ nigrae: laterales omnes in exortu & apice albæ, in medio verò nigrae. Binæ rectrices intermediæ lateralibus sunt longiores, laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque brevior. Supra nares & versùs oris angulos pili extant longiusculi, nigri, antrosum versi, & setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguisque nigrescentes.

yeux. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont blanches. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est de cette dernière couleur. Les grandes couvertures du dessus de l'aile sont noirâtres. Les neuf premières plumes de l'aile sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, l'autre moitié est noirâtre: toutes les suivantes sont noirâtres, & ont leur bord intérieur blanchâtre: de plus toutes les moyennes sont terminées de blanc. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont noires: toutes les latérales sont blanches à leur origine & à leur bout, & noires dans leur milieu. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en-devant, & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve à la *Louisiane*, d'où

elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. le Comte de la Galissoniere*.

Habitat in *Ludovicia*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Comite de la Galissoniere*.

** 9. LA PETITE PIE-GRIESCHE DE MADAGASCAR.

Voyez *Pl. XVI. le mâle Fig. 1. & la femelle Fig. 2.*

Lanius superne cinereus, infernè albus, paucò rufescente admixto; (gutture & collo inferiore nigris; mas) rectricibus binis intermediis in exortu rufis, in reliqua longitudine griseo-fuscis; extimâ extus & apice griseo-fuscâ, intus rufâ, aliis lateralibus rufis, apice griseo-fuscis . . . LANIUS MADAGASCARIENSIS MINOR.

Les Habitans de Madagascar appellent le mâle CALI-CALIC, & la femelle BRUIA.

Elle est à peu près de la grosseur du *Moineau de campagne* ou *Friquet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces onze lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a six lignes & demie de long; sa queue un pouce neuf lignes; son pied huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Elle a neuf pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont

Crassitie Passerem campestrum circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & undecim lineas æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque sex cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem & novem lineas; pes octo lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue sex lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anteriorum intimum longitudine adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum novem pollicum inter-

vallo distant; alæ verò complicate ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsum, vestiunt pennæ cinereæ. Quæ uropygium & caudam superne cooperiunt, sunt rufæ. In utroque capitis latere, rostrum inter & oculum, macula extat nigra, supra quam linea est alba, supra oculum quoque protensa. Genæ sunt albidæ. Guttur nigrum, sicut & collum inferius. Pectus, venter, latera, caudæ rectrices inferiores & pennæ alas subtus tegentes albæ, cum aliqua in pectore & imo ventre rufi mixtura. Crura ex albo & rufo variegata. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, ipsarumque rectrices superiores minores rufæ : majores griseo-fuscæ. Remiges fuscæ, oris exterioribus griseo-fuscis, ad rufescentem nonnihil vergentibus. Caudam componunt duodecim rectrices : binæ intermediæ sunt in exortu rufæ, in reliqua longitudine griseo-fuscæ : quatuor utrinque sequentes rufæ, apicibus griseo-fuscis : utrinque

pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, ainsi que le dos, sont cendrées. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont rouffes. De chaque côté de la tête ; entre le bec & l'œil, est une tache noire, au-dessus de laquelle il y a une ligne blanche, qui s'étend aussi par-dessus l'œil. Les joues sont blanchâtres. La gorge & la partie inférieure du col sont noires. La poitrine, le ventre, les côtés, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle sont blanches, avec un peu de roux mêlé à la poitrine & au bas-ventre. Les jambes sont variées de roux & de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, sont rouffes : les grandes sont d'un gris-brun. Les plumes de l'aîle sont brunes, & leur bord extérieur est d'un gris-brun tirant un peu sur le rouffâtre. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont rouffes à leur origine, & d'un gris-brun dans le reste de leur longueur : les quatres suivantes de chaque côté sont rouffes & terminées de gris-brun : & la plus exté-

rière est d'un gris-brun du côté extérieur & à son bout, & roufse du côté intérieur. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont quelques petits poils noirs, roides comme des foyes. Le bec est noir. Les pieds sont d'une couleur de plomb; & les ongles bruns.

La *femelle* diffère du *mâle* par ses couleurs. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont d'un cendré moins beau & moins vif que celui du *mâle*. Les couvertures du dessus de la queue sont rouffes. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un blanc mêlé d'un peu de rouffâtre. Les petites couvertures du dessus des aîles sont cendrées: les grandes sont d'un gris-brun. Les plumes des aîles & celles de la queue sont des mêmes couleurs que celles du *mâle*.

On les trouve à *Madagascar*, d'où elles ont été apportées à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

tandem extima exteriùs & apice griseo-fusca, interiùs verò rufa. Supra nares & versùs oris angulos quidam rigent exigui pili nigri, fetarum instar rigidi. Rostrum nigrum. Pedes plumbei; ungues verò fusci.

Fœmina coloribus à *mare* discrepat. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium cinerascunt quidem, sed minùs splendidè quam in *mare*. Teètrices caudæ superiores sunt rufæ. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, caudæ teètrices inferiores, & pennæ alas subtus tegentes albæ, cum aliqua rufescentis mixtura. Teètrices alarum superiores minores cineræ: majores verò griseo-fusca. Remiges & rectrices remigibus & rectricibus *maris* concolores.

Habitant in *Madagascariensi Insula*, unde in *museum Realmurianum* à *D. Poivre* allati sunt.

** 10. LA PIE-GRIESCHE GRISE DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XVII. Fig. 1.

Lanius superne griseus, infernè cinereo-albus; capite superiùs nigro; taniâ per oculos nigrâ; rectricibus binis intermediis griseo-fuscis, colore obscuriore transversim striatis; latera- libus nigris, apice albis; extimæ margine exteriorè albo . . .
 LANIUS SENEGALENSIS CINEREUS.

Collurionem nostratem cras- sitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pol- lices & decem lineas ex- plet, & ad extremos ungues septem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est; cauda quatuor pollices; pes tredecim cum semi lineas; & trium digitorum antico- rum medius cum ungue no- vem cum semi lineas: late- rales paulò sunt breviores; & posticus anticorum inti- mum longitudine æmulatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum; alæ verò complicatæ non ultra quartam longitudinis caudæ partem protenduntur. Ca- put superius nigrum est. In utroque capitis latere tania extat longitudinalis, sordi- dè alba, supra oculos duc-

Elle est à peu près de la gros- seur de *notre Ecorcheur*. Sa lon- gueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces dix lignes, & jus- qu'à celui des ongles de sept pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bou- che a onze lignes de long; sa queue quatre pouces; son pied treize lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts an- térieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie: les laté- raux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la mê- me longueur que l'intérieur de ceux de devant. Elle a douze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'é- tendent que jusqu'au quart de la longueur de la queue. La par- tie supérieure de la tête est noi- re. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale, d'un blanc sale, qui s'étend jusque vers l'occiput, en passant par-

dessus les yeux. Au-dessous de celle-là en est une noire, qui passe par les yeux. Les joues, le col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'une couleur grise, qui devient de plus en plus foncée à mesure qu'elle s'approche du croupion. La gorge, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un gris-blanc. Celles du dessus des aîles sont rousses. Les plumes scapulaires sont brunes & bordées de roux. Les plumes des aîles (si l'on en excepte les trois plus proches du corps, qui sont de la même couleur que les scapulaires) sont rousses du côté extérieur, brunes du côté intérieur & à leur bout, & leur bord intérieur est roux. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-brun, qui, regardé attentivement, paroît rayé transversalement d'une couleur plus sombre : les latérales sont noires & terminées de blanc : la plus extérieure de chaque côté a aussi son bord extérieur de cette dernière couleur. Autour de la base du bec sont quelques longs poils noirs, tournés en-devant, & roides comme des foyes. Le bec est noir.

ta, & versùs occipitium usque protensa; infra quam taniam altera est nigra per oculos ducta. Genæ, colum, dorsum, uropygium & tectrices caudæ superiores colore imbuuntur griseo, qui color, versùs uropygium procedendo, fit saturationior. Guttur, pectus, venter, latera, crura, caudæ tectrices inferiores & pennæ alas subtus tegentes sunt cinereo-albæ. Alarum tectrices superiores rufæ. Pennæ scapulares fuscæ, marginibus rufis. Remiges (si tamen excipias tres corpori viciniore, pennis scapularibus concolores) sunt in latere exteriori rufæ, in latere interiori & apice fuscæ, marginibus tamen interioribus rufis. Cauda duodecim conflatur rectricibus : binæ intermediae sunt griseo-fuscæ, & attentè intuenti colore obscuriore transversim striatæ apparent : laterales nigrae, apicibus albis : utrinque insuper extrema margo exterior albet. Circa basin rostri quidam extant longiusculi pili nigri, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque griseofusci. Habitat in *Senegalensi regione*,

*regione, unde in museum
Realmurianum missus à D.
Adanson.*

Les pieds & les ongles sont
d'un gris-brun. On la trouve
au *Sénégal*, d'où elle a été
envoyée à *M. de Reaumur* par
M. Adanson.

** 11. LA PIE-GRIESCHE DE LUÇON.

Voyez Pl. XVIII. Fig. 1.

*Lanius superne griseo-rufescens, internè albo-rufescens; pec-
tore fusco diluto transversim striato; maculâ ponè oculos
fuscâ; rectricibus griseo-rufescentibus, lateralibus lineolâ
transversâ, fuscâ apice notatis & albo-rufescente termina-
tis LANIUS LUCIONENSIS.*

Les Habitans de l'Isle de Luçon l'appellent CABECOTÉ.

Ad *Lanii rufi nostratis*
crassitiem accedit. Ipsi-
us longitudo à rostri apice ad
caudam extremam septem
pollices & quinque lineas
æquat, & ad extremos un-
gues sex pollices cum linea
una. Rostrum ab ipsius unco
ad oris angulos novem cum
semi lineas longum est; cau-
da tres pollices & lineam
unam; pes decem cum semi
lineas; & trium digitorum
anticorum medius cum un-
gue octo cum semi lineas: la-
terales paulò sunt breviores;
& posticus laterales non-
nihil longitudine excedit.
Alis expansis, extremitates
majorum remigum decem
pollicum & totidem linea-
rum intervallo distant; alæ
verò complicatæ tertiam

Elle est à peu près de la gros-
seur de *notre Pie-grièche rousse*.
Sa longueur depuis le bout du
bec jusqu'à celui de la queue est
de sept pouces cinq lignes, &
jusqu'à celui des ongles de six
pouces une ligne. Son bec de-
puis son crochet jusqu'aux coins
de la bouche a neuf lignes &
demie de long; sa queue trois
pouces une ligne; son pied dix
lignes & demie; & celui du mi-
lieu des trois doigts antérieurs,
joint avec l'ongle, huit lignes
& demie. Les latéraux sont un
peu plus courts; & celui de
derrière est un peu plus long
que ces derniers. Elle a dix pou-
ces dix lignes de vol; & ses aî-
les, lorsqu'elles sont pliées,
s'étendent jusqu'au tiers de la
longueur de la queue. Le dessus
de la tête, la partie supérieure

du col & le dos sont d'un gris tirant sur le roux. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont roussâtres & rayées transversalement de brun. De chaque côté de la tête est une tache longitudinale, brune, placée au-dessous & derrière l'œil. La gorge & le ventre sont blancs. La partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, les côtés & les jambes sont d'un blanc-roussâtre, varié de petites lignes transversales, d'un brun clair. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-roussâtre & sans taches. Les petites du dessus des ailes sont d'un gris tirant sur le roux : les grandes sont d'un gris-brun, bordées extérieurement & terminées de roussâtre ; cette couleur étant séparée du gris-brun par une petite ligne brune, très-étroite. Les grandes plumes de l'aile sont d'un gris-brun, & ont leur bord extérieur roussâtre : les moyennes sont de la même couleur que les grandes couvertures. La queue est composée de douze plumes d'un gris tirant sur le roux : toutes les latérales sont terminées d'un blanc-roussâtre, séparé de l'autre couleur par une petite ligne transversale, brune. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les

longitudinis caudæ partem attingunt. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsum, ex griseo ad rufum inclinant. Uropygium & rectrices caudæ superiores sunt rufescentes, fusco transversim striatæ. In utroque capitis latere macula extat longitudinalis, fusca, infra & ponè oculos collocata. Guttur & venter albet. Collum inferius & ad latera, pectus, latera & crura ex albo rufescunt, lineolisque transversis, dilutè fuscis variegantur. Pennæ caudam subtus tegentes sunt albo-rufescentes & immaculatæ. Alarum rectrices superiores minores griseo-rufescentes : majores griseo-fuscae, marginibus exterioribus & apicibus rufescentibus ; quem colorem rufescentem à griseo-fusco lineola strictissima, fusca separat. Remiges majores sunt griseo-fuscae, oris exterioribus rufescentibus : minores rectricibus alarum majoribus concolores. Cauda duodecim constat rectricibus griseo-rufescentibus : laterales omnes lineolâ transversâ, fuscâ apice donantur, & albo-rufescente terminantur. Binæ rectrices intermediae latera

libus sunt longiores ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Circa basin rostri longiusculi quidam extant pili fusci , antrorsum versi , & setarum instar rigidi. Rostrum , pedes , unguisque griseo-fusci. Habitat in *Lucionensi Insula* , unde in *museum Realmurianum* à *D. Poivre* allatus est. latérales , qui vont toutes en diminuant un peu & par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte. Autour de la bête du bec sont quelques longs poils bruns , tournés en-devant , & roides comme des foyes. Le bec , les pieds & les ongles sont gris-bruns. On la trouve à l'*Ile de Luçon* , d'où elle a été apportée à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

** 12. LA PIE-GRIESCHE DE CANADA.

Voyez *Pl. XVIII. Fig. 3.*

Lanius cristatus , superne fusco-rufescens , infernè dilutè cinereus ; cristâ & pectore dilutè rufis ; rectricibus nigricantibus , marginibus & apice albis LANIUS CANADENSIS.

Ad *Collurionis* crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices æquat , & ad extremos ungues quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulòs octo lineas longum est ; cauda duos pollices cum sex lineis ; pes undecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anti-

Elle est à peu près de la grosseur de l'*Ecorcheur*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces , & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long ; sa queue deux pouces six lignes ; son pied onze lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , huit lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est

de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Elle a dix pouces huit lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusque vers la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un roux clair. Les côtés de la tête sont noirâtres , & piquetés de blanchâtre terni. Les plumes du dessus de la tête sont plus longues que les autres & forment une hupe. La partie supérieure du col & le dos sont d'un brun tirant sur le roux. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont brunes. La gorge , la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un roux clair , varié de quelques taches longitudinales , brunes. Le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré clair. Les couvertures du dessus des aîles sont noirâtres & terminées de blanc. Les plumes des aîles sont pareillement noirâtres , bordées extérieurement & terminées de blanc. La queue est composée de douze plumes noirâtres , bordées des deux côtés & terminées de blanc : les deux du milieu sont plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus

corum intimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum & octo linearum ; alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Superior capitis pars rufo tingitur diluto. Capitis latera nigricant , & sordide albido punctata sunt. Capitis verticem vestientes pennæ cæteris sunt longiores & cristam efformant. Pars colli superior & dorsum ex fusco rufescunt. Uropygium & tectrices caudæ superiores sunt fuscae. Guttur , collum inferius & pectus dilutè rufa ; maculis quibusdam longitudinalibus , fuscis variegata. Venter , latera , crura & caudæ tectrices inferiores dilutè cinereæ. Alarum tectrices superiores nigricant ; apicibusque donantur albis. Remiges similiter nigricantes , marginibus exterioribus & apicibus albis. Cauda duodecim constat rectricibus nigricantibus , oris exterioribus & interioribus , sicut & apicibus , albis : binæ intermediae laterales longitudine excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque , omnium

brevissimam. Supra nares & circa angulos oris pili quidam extant antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum saturatè fuscum. Pedes, unguisque nigri. Habitat in *Canada*, unde in *musæum D. Aubry* missus est.

courte de toutes. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont quelques poils tournés en-devant & roides comme des soyes. Le bec est d'un brun foncé. Les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve en *Canada*, d'où elle a été envoyée à *M. l'Abbé Aubry*, qui la conserve dans son cabinet.

13. LA PIE-GRIESCHE ROUSSE DE BENGALE.

Lanius cristatus, superne rufescens, infernè sordidè aurantius; lineis transversis nigris varius; maculâ ponè oculos lunulatâ nigrâ; remigibus fuscis, oris exterioribus fusco dilutiore tinctis; rectricibus superne rufescentibus, infernè griseis *LANIUS BENGALENSIS RUFUS.*

Lanius Bengalensis, Charah dictus. *Klein. Avi. pag. 54. N^o. 8.*

Pie-grièche rousse hupée. *Edwards. Tom. II. pag. LIV; avec une figure très-exacte Pl. 54.*

Les Habitans de Bengale la nomment CHARAH. Edwards.

Præcedentem crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & totidem lineas explet, & ad extremos ungues quinque pollices cum quatuor lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices cum octo lineis; pes octo lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue septem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces quatre lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes & demie de long; sa queue deux pouces huit lignes; son pied huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la

même longueur que ces derniers. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à un pouce au-delà de l'origine de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont roussâtres : cette couleur est plus vive sur le sommet de la tête. Là les plumes sont plus longues que les autres, & forment une hupe. La bête du demi-bec supérieur est hérissée de longs poils noirs, roides comme des foyes. De chaque côté de la tête derrière l'œil est une tache noire en forme de croissant. Les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un orangé terni, varié de lignes transversales, noires. Les couvertures du dessus des aîles sont brunes. Les plumes des aîles sont d'un brun un peu plus foncé, & bordées extérieurement d'un brun plus clair. La queue est composée de douze plumes roussâtres en-dessus & grises en-dessous : les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés, jusqu'à la plus extérieure de chaque

laterales longitudine adæquat. Alæ complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium & pennæ caudam superne tegentes rufescunt : qui color rufescens in summo capite magis elucet. Pennæ capitis verticem vestientes cæteris sunt longiores, & cristam efficiunt. Circa basin mandibulæ superioris longiusculi rigent pili nigri, setarum instar rigidi. In utroque capitis latere ponè oculum macula extat lunulata, nigra. Genas, guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ sordidè aurantia, lineis transversis, nigris variegatæ. Tectrices caudæ inferiores concolores. Pennæ alas superne cooperientes fusca. Alarum remiges saturatiùs fuscescunt, ipsarumque margines exteriores fusco dilutiore tinguntur. Caudam componunt duodecim rectrices superne rufescentes, infernè griseæ, quarum binæ intermediae lateralibus sunt longiores ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur, ad utrin-

que extimam usque brevior. Rostrum ad basin car-
neum, qui color sensim at-
que sensim fit obscurior &
in apice nigricat. Pedes, un-
guisque nigri. Habitat in
Bengalensi regno.

côté, qui est la plus courte.
Le bec est à sa base d'une cou-
leur de chair, qui dégénère par
degrés en noir vers son bout.
Les pieds & les ongles sont
noirs. On la trouve dans le
Royaume de *Bengale*.

14. LA PIE-GRIESCHE BRUNE DE BENGALE.

*Lanius superne fuscus, infernè albus; imo ventre rubro; ver-
tice nigro; maculâ ponè oculos coccineâ; maculis in utro-
que colli latere arcuatis, nigris; rectricibus dilutè fuscis...*
LANIUS BENGALENSIS FUSCUS.

Rouge-queue de Bengale. *Alb. Tom. III. pag. 24; avec une figure mal
coloriée Pl. 56.*

Merulam saxatilem crassiti-
e nonnihil superat. Caput
superius & occipitium nigra
sunt. Pars colli superior,
dorsum, uropygium, pennæ
caudam superne tegentes,
alarum tectrices superiores,
sicut & scapulares, fuscæ. In
utroque capitis latere infra
oculos macula extat coccine-
a, in parte infima albo
circumdata. Utrumque colli
latus quatuor præditum est
maculis arcuatis, nigris, quæ
maculæ eò minores sunt,
quò fiunt corpori vicini-
ores. Circa oris angulos &
supra nares longi rigent pili
nigri, antrorsum versi & se-
tarum instar rigidi. Guttur,
pars colli inferior, pectus,

Elle est un peu plus grande
que le *Merle de roche*. Le des-
sus de la tête & l'occiput sont
noirs. La partie supérieure du
col, le dos, le croupion, les
couvertures du dessus de la
queue, celles du dessus des
ailes & les plumes scapulaires
sont brunes. De chaque côté
de la tête au-dessous des yeux
est une tache d'un rouge vif,
dont le bas est entouré de
blanc. Sur chacun des côtés
du col sont quatre taches noi-
res, en arcs de cercle, qui
sont d'autant plus petites qu'el-
les s'approchent plus du corps.
Vers les coins de la bouche &
au-dessus des narines sont de
longs poils noirs, tournés en-
devant & roides comme des

foyes. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre, les côtés, & les jambes sont blanches. Le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont rouges. Les plumes des ailes sont brunes. La queue est composée de douze plumes d'un brun plus clair. L'iris des yeux est blanchâtre. Le bec est d'un cendré foncé. Les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve dans le Royaume de *Bengale*.

venter supremus, latera & crura albescent. Venter imus & rectrices caudæ inferiores sunt rubræ. Alarum remiges fuscæ. Cauda duodecim constat rectricibus fusco dilutiore tinctis. Oculorum irides albidæ. Rostrum saturatè cinereum. Pedes, unguesque nigri. Habitat in *Bengalensi* regno.

** 15. LA PIE-GRIESCHE JAUNE DE CAYENNE.

Voyez Pl. XVI. Fig. 4.

Lanius superne fuscus, infernè sulphureus; capite nigricante; vertice taniâ albicante circumdato; rectricibus fuscis, oris exterioribus, interioribusque rufis . . . LANIUS CAYANENSIS LUTEUS.

Elle est un peu plus grosse que le *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue trois pouces deux lignes; son pied dix lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont beaucoup plus

Crassitie Turdum Iliacum nonnihil antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas, longum est; cauda tres pollices cum duabus lineis; pes decem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas: laterales multò sunt breviores;

breviores ; & posticus laterales nonnihil longitudine excedit. Alis expansis , extremitates majorum remigum tredecim pollicum & octo linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput nigricat. Ipsius vertex coronâ circumdatur albicante , binis conflatâ tæniis concoloribus , circa basin mandibulæ superioris inter se connexis , in utroque capitis latere protensis , supra oculos ductis & versùs occipitium sibimetipsis rursus adnexis. Pennæ summum caput cooperientes sunt in exortu sulphureæ ; qui color sulphureus nullo modo apparet nisi pennis erectis. Pars colli superior , dorsum & uropygium fuscescunt. Tectrices caudæ superiores eodem imbuuntur colore , sed marginibus donantur rufis. Guttur & collum inferius albent. Pectus , venter , latera , crura , tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes splendido tinguntur sulphureo. Alarum superiores tectrices fuscæ , marginibus rufis. Remiges similiter fuscæ , oris exterioribus & lateris interioris

courts ; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a treize pouces huit lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête est noirâtre. Son sommet est entouré d'une couronne blanchâtre , formée par deux bandes de cette couleur , qui se réunissent à l'origine du demi-bec supérieur , s'étendent de chaque côté de la tête en passant par-dessus les yeux & vont se joindre vers l'occiput. Les plumes du sommet de la tête sont à leur origine d'une couleur de soufre ; mais cette couleur ne paroît que lorsque les plumes sont relevées. La partie supérieure du col , le dos & le croupion sont bruns. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur , & bordées de roux. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches. La poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle sont d'une belle couleur de soufre. Celles du dessus des aîles sont brunes & bordées de roux. Les plumes des aîles sont pareillement brunes ; leur

bord extérieur , ainsi que la plus grande partie de leur côté intérieur, est roux. La queue est composée de douze plumes brunes , bordées extérieurement & intérieurement de roux. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont quelques longs poils noirs , tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec & les ongles sont noirâtres; & les pieds sont gris. On la trouve à *Cayenne* d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

maximâ parte rufis. Caudam componunt duodecim rectrices fuscæ, marginibus præditæ exterioribus & interioribus rufis. Supra nares & versùs oris angulos quidam extant longiusculi pili nigri; antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum, unguisque nigricant; pedes sunt grisei. Habitat in *Cayenna*, unde in *museum Reaumurianum* missus à *D. des Essars*.

** 16. LA PIE-GRIESCHE ROUSSE DE MADAGASCAR.

Voyez le mâle Pl. XVIII. fig. 4.

Lanius superne rufus , infernè ex albo cinerascens ; capite ex nigro ad viride inclinante ; remigibus interiùs fuscis ; rectricibus rufis , duabus utrinque extimis fusco mixtis....
LANIUS MADAGASCARIENSIS RUFUS.

Les Habitans de Madagascar appellent le mâle SCHET-BÉ , & la femelle TCHA-CHERT-DAE.

Elle est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long ; sa queue deux pouces

Turdum Iliacum crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem septem pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est ; cauda

duos pollices cum novem lineis; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & quatuor linearum; alæ vero complicatæ ad duas ferè tertias longitudinis caudæ partes protenduntur. Caput, guttur & collum ex nigro ad viridem colorem inclinant. Dorsum, uropygium, tectrices caudæ superiores, pennæ alas superne tegentes, sicut & scapulares, sunt rufæ. Pectus, venter, latera & caudæ tectrices inferiores ex albo cinerascunt. Crura sunt cinerea. Alarum tectrices inferiores cinereo & nigricante variegantur. Remiges in latere interiore fuscæ, in latere exteriori fusco & rufo confusim mixtæ sunt. Rectrices rufæ, marginibus in utroque latere fuscis, sed versùs pennæ apicem tantùm: in binis utrinque extremis aliquid etiam fusci admixtum est. Supra nares quidam rigent longiusculi pili nigri, antrorsum versi, se-

neuf lignes; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Elle a douze pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge & le col sont d'un noir changeant en verd. Le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, celles du dessus des aîles & les plumes scapulaires sont rousses. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc tirant sur le gris. Les jambes sont cendrées. Les couvertures du dessous des aîles sont variées de cendré & de noirâtre. Les plumes des aîles sont brunes du côté intérieur, & mêlées confusément de brun & de roux du côté extérieur. Celles de la queue sont rousses & bordées de brun de chaque côté vers le bout seulement: les deux plus extérieures de chaque côté sont aussi mêlées d'un peu de brun. Au-dessus des narines sont quelques

longs poils noirs , tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont d'une couleur de plomb.

La femelle diffère du mâle en ce que ses couleurs sont moins vives , & qu'elle a la gorge & la partie inférieure du col de la même couleur que la poitrine, c'est-à-dire, d'un blanc tirant sur le gris. Le côté extérieur des plumes de ses aîles est aussi tout-à-fait roux & sans mélange de brun. Quant à tout le reste elle ressemble parfaitement au mâle.

On les trouve à *Madagascar*, d'où elles ont été apportées à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

tarum instar rigidi. Rostrum , pedes , unguisque plumbei.

Fœmina à *mare* discrepat coloribus non ita splendentibus , gutture & collo inferiore pectori concoloribus , ex albo scilicet cinerascens. Insuper alarum remiges in latere exteriori sunt penitus rufæ , absque ulla fusci mixtura. In reliquis omnibus cum *mare* perfectè convenit.

Habitant in *Madagascar*, unde in *museum Reaumurianum* allati à *D. Poivre*.

** 17. LA PIE-GRIESCHE DE MANILLE.

Voyez *Pl. XVIII. Fig. 2.*

Lanius superne nigricans , internè albus ; collo nigricante ; uropygio candido ; remigibus , rectricibusque nigricantibus LANIUS MANILLENSIS.

Les Habitans de Manille l'appellent LANGNI-LANGNAIEN.

Elle n'est pas si grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces , & jusqu'à celui des ongles de six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins

Præcedenti crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices æquat , & ad extremos ungues sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem

cum semi lineas longum est; cauda duos pollices cum tribus lineis; pes sex cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis extensis, extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, guttur, collum, dorsum & scapulares pennæ nigricant. Uropygium, pectus, venter, latera, crura, tectrices caudæ superiores & inferiores & pennæ alas subtus tegentes albent. Alarum tectrices superiores sunt nigricantes. Remiges & rectrices eodem imbuuntur colore. Circa basin mandibulæ superioris quidam sunt exigui pili nigri, setarum instar rigidi. Rostrum ex cinereo albet. Pedes, unguisque nigricant. Habitat circa *Manillam*, *Lucionensis Insulæ*. Caput, unde in *musæum D. Aubry* missus est.

de la bouche a neuf lignes & demie de long; sa queue deux pouces trois lignes; son pied six lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Elle a quatorze pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos & les plumes scapulaires sont noirâtres. Le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blanches. Celles du dessus de l'aile sont noirâtres. Les plumes des aîles & celles de la queue sont de cette dernière couleur. Autour de la bête du demi-bec supérieur sont quelques petits poils noirs, roides comme des foyes. Le bec est gris-blanc. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve aux environs de *Manille*, Capitale de l'*Isle de Lucçon*, d'où elle a été envoyée à *M. l'Abbé Aubry*, qui la conserve dans son cabinet.

** 18. LA PIE-GRIESCHE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Voyez Pl. XV. fig. 1.

Lanius superne nigricans, infernè albus; rectricibus alarum corpori finitimis albis; remigibus nigricantibus, majoribus in exortu albis; rectricibus nigris, binis utrinque extimis exteriùs & apice, duabus proximè sequentibus apice albis . . . LANIUS CAPITIS BONÆ SPEI.

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que *notre Pie-grièche grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue quatre pouces; son pied douze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a treize pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont noirâtres. La gor-

Lanio nostrati cinereo non-nihil crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos decem cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices; pes unum pollicem; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus laterales longitudine paululùm antecellit. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, rectrices caudæ superiores & scapulares pennæ nigricant. Guttur, pars colli inferior,

pectus, venter, latera & rectrices caudæ inferiores albescent. Crura eodem colore tinguntur, si tamen excipias partem infimam anteriùs fuscam. Alarum margines, versus articulum carpo humano respondentem, candidæ. Ipsarum rectrices inferiores nigricantes, marginibus exterioribus albis: superiores corpori viciniore albae; reliquæ nigricantes. Decem primores remiges sunt in exortu albae, in reliqua longitudine nigricantes: reliquæ omnes quoque nigricant. Duodecim rectricibus cauda constat: quatuor intermediae nigrae: utrinque sequens concolor, attamen apice donatur albo: quarta nigra, margine exteriori & apice albis: binæ tandem utrinque extremae in latere interiore nigrae, in latere exteriori & apice albae. Binæ rectrices intermediae laterales sunt longiores; laterales autem gradatim longitudine minuuntur, ad utrinque extremam usque breviores. Supra nares & circa angulos oris quidam rigent longiusculi pili nigri, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigricant. Habitat in *Capite*

ge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les jambes sont de la même couleur, excepté dans le bas à la partie antérieure, où elles sont brunes. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est blanc. Les couvertures du dessous de l'aile sont noirâtres & bordées extérieurement de blanc: celles du dessus les plus proches du corps sont blanches; les autres sont noirâtres. Les dix premières plumes de l'aile sont blanches à leur origine, & noirâtres dans le reste de leur longueur: toutes les autres sont de cette dernière couleur. La queue est composée de douze plumes: les quatre du milieu sont noires: celle qui les suit de chaque côté est de la même couleur, & terminée de blanc: la quatrième est noire, bordée extérieurement & terminée de blanc: enfin les deux plus extérieures de chaque côté sont noires du côté intérieur, & blanches du côté extérieur & à leur bout. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque

côté, qui est la plus courte. *Bonæ Spei*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Abbate de la Caille*.
 quelques longs poils noirs, tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur*, par *M. l'Abbé de la Caille*.

19. LA PIE-GRIESCHE NOIRE DE BENGALÉ.

Lanius niger (*mas*) *nigricans* (*fœmina*); ventre, *teſtricibus alarum corpori finitimis & remigibus minoribus albis*; *caudâ ſubtus candidâ* **LANIUS BENGALENSIS NIGER.**

Fringilla nigra. Klein. Avi. pag. 98. N°. 14.

Pie-grièche de Bengale. Alb. Tom. III. pag. 8; avec les figures mal coloriées, du mâle Pl. 17, & de la femelle Pl. 18.

Les Habitans de Bengale l'appellent DIAL-BIRD. Alb.

Elle est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont noires. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les grandes couvertures des ailes les plus éloignées du corps & les grandes plumes des ailes sont noires; les autres couvertures & les moyennes plumes de l'aile sont blanches. La queue, qui est composée de douze plumes, toutes d'égale longueur, est noire en-

Ad Turdi Iliaci crassitiem accedit. Caput, guttur, colum, pectus, dorsum & uropygium nigris vestiuntur pennis. Teſtrices caudæ superiores & scapulares pennæ concolores. Venter, latera, crura & caudæ teſtrices inferiores albescent. Teſtrices alarum majores à corpore remotiores, sicut & majores remiges, sunt nigrae; reliquæ alarum teſtrices & minores remiges candidæ. Cauda superne nigra est, ſubtus verò candida; & duodecim constat reſtricibus, omnibus longitudine æqualibus.

libus. Oculorum irides flavæ. Oris angulos idem tingit color. Rostrum nigrum. Pedes, unguisque fusci.

dessus & blanche en-dessous. L'iris des yeux est jaune. Les coins de la bouche sont de la même couleur. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns.

Fœmina colore à *mare* discrepat. Caput, guttur, colum, pectus, dorsum, uropygium, rectrices caudæ superiores & scapulares pennæ saturatè fuscescunt aut nigricant. Venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores albescent. Alæ & cauda iisdem ac in *mare* coloribus ornantur. Rostrum ex fusco ad nigrum inclinat. Pedes, unguisque sunt fusci. Reliqua sicut in *mare* se habent.

La *femelle* diffère du *mâle* par sa couleur. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un brun foncé ou noirâtres. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les ailes & la queue sont colorées comme celles du *mâle*. Le bec est d'un brun tirant sur le noir. Les pieds & les ongles sont bruns. Le reste est comme dans le *mâle*.

Habitant in *Bengalensi* regno.

On les trouve dans le Royaume de *Bengale*.

** 20. LA PIE-GRIESCHE ROUGE DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XVII. Fig. 2.

Lanius superne niger, infernè ruber; vertice, cruribusque fulvis; remigibus, rectricibusque nigris . . . LANIUS SENEGALENSIS RUBER.

Præcedenti nonnihil craf-
sitie cedit. Ipsi longitudo
à rostri apice ad caudam ex-
tremam octo pollices & no-
vem lineas æquat, & ad ex-
tremos ungues septem pol-

Elle est un peu moins gros-
se que la précédente. Sa lon-
gueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est
de huit pouces neuf lignes,
& jusqu'à celui des ongles de

sept pouces deux lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long ; sa queue quatre pouces ; son pied quatorze lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , onze lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Elle a quatorze pouces quatre lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est fauve. Les côtés de la tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont noires. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre & les côtés sont d'un très-beau rouge. Les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont fauves. Les plumes des aîles & celles de la queue sont noires. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche , sont quelques poils noirs , tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec , les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve au *Sénégal* , d'où elle a été

lices cum duabus lineis. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque undecim lineas longum est ; cauda quatuor pollices ; pes quatuordecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum intimum longitudine æmuletur. Alis expansis , extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ fulvæ. Caput ad latera , pars colli superior , dorsum , uropygium , scapulares pennæ , quæ alas superne cooperiunt & rectrices caudæ superiores sunt nigræ. Guttur , pars colli inferior , pectus , venter & latera pennis vestiuntur splendè rubris. Crura fulva. Caudæ rectrices inferiores quoque fulvæ. Alarum remiges , sicut & rectrices , nigræ. Supra nares & versùs oris angulos quidam extant pili nigri , antrorsum versi , setarum instar rigidi. Rostrum , pedes , unguesque nigri. Habitat in *Senegalenst*

regione, unde in *musæum* envoyée à M. de Reaumur par *Realmurianum* missus à D. M. Adanson.

** 21. LA PIE-GRIESCHE RAYÉE DE CAYENNE.

Voyez Pl. XXIX. Fig. 3.

Lanius superne niger albo transversim striatus, infernè albus nigro transversim varius; remigibus, rectricibusque nigris; maculis transversis albis utrinque notatis . . . LANIUS CAYANENSIS STRIATUS.

Pie-grièche noire & blanche. *Edwards. Glanur. pag. 35; avec une figure exacte (excepté la huppe, qui est de trop) Pl. 226.*

Les Anglois l'appellent BLACK AND WHITE BUTCHER-BIRD. *Edwards.*

Crassitie Alaudam cristatam non multum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & septem lineas æquat, & ad extremos ungues sex tantum pollices. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos decem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices cum sex lineis; pes duodecim lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue octo cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales nonnihil longitudine excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longi-

Elle n'est guères plus grosse que l'*Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces sept lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue deux pouces six lignes; son pied douze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête

est variée de noir & de blanc ; les plumes de son sommet sont blanches à leur origine & terminées de noir ; & les autres sont noires , & ont une petite tache blanche de chaque côté vers le bout. La partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont noires , & rayées transversalement de blanc. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle sont blanches , & rayées transversalement de noir. Les plumes des aîles sont noires , & variées extérieurement & intérieurement de taches transversales , blanches. La queue est composée de douze plumes , de la même couleur que celles des aîles , & variées de même de taches transversales , blanches. Autour de la bête du demi-bec supérieur sont quelques petits poils noirs , roides comme des foyes. Le bec , les pieds & les ongles sont bruns. On la trouve à *Cayenne* , d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. des Effars* & *M. Artur*.

tudinem attingunt. Caput nigro & albo variegatur ; pennæ scilicet verticem cooperientes sunt in exortu candidæ , nigro terminatæ ; reliquæ verò nigræ , exiguâ maculâ albâ in utroque latere versùs apicem præditæ. Pars colli superior , dorsum , uropygium , scapulares pennæ , alarum rectrices superiores & pennæ caudam superne tegentes sunt nigræ , albo transversim striatæ. Guttur , pars colli inferior , pectus , venter , latera , crura , caudæ rectrices inferiores & pennæ alas subtus cooperientes albæ , nigro transversim variæ. Alarum remiges nigræ , maculis transversis , albis in utroque latere variegatæ. Caudam component duodecim rectrices remigibus concolores & similiter maculis transversis , albis notatæ. Circa basin mandibulæ superioris quidam sunt exigui pili nigri , setarum instar rigidi. Rostrum , pedes , unguesque fusci. Habitat in *Cayana* , unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. des Effars* & *D. Artur*.

22. LA PIE-GRIESCHE A QUEUE FOURCHUE DE BENGALÉ.

Lanius superne splendide niger, cœruleo & viridi colore varians, inferne albus; pectore obscure cinereo; remigibus majoribus & rectricibus nigro-ferrugineis; rectrice extimâ sordide albo maculatâ; caudâ bifurcâ . . . LANIUS BENGALENSIS CAUDA BIFURCA.

Lanius Bengalensis, Fingah dictus. Klein. Avi. pag. 54. N^o. 9.

Pie des Indes à queue fourchue. Edwards. Tom. II. pag. LVI; avec une figure exacte Pl. 36.

Les Habitans de Bengale l'appellent FINGAH. Edwards.

Crassitie Lanium cinereum nostratem circiter æmulatur. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudam extremam septem pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum duabus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo lineas longum est; cauda tres pollices & lineas binas; pes novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales longitudine æmulatur. Alæ complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem usque protenduntur. Caput guttur, collum, dorsum, uropygium, scapulares penne & rectrices caudæ superiores sunt splendide nigræ, cœruleo, purpureo & viridi colore variantes, pro vario

Elle est à peu près de la grosseur de notre Pie-grièche grise. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long; sa queue trois pouces deux lignes; son pied neuf lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que ces derniers. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir brillant & changeant en

bleu , en pourpre & en verd , selon qu'on les expose à différens jours. La poitrine est d'un cendré obscur & tirant sur le noir. Les côtés & les jambes sont d'un blanc varié de quelques taches transversales , noirâtres. Le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont blanches & sans taches. Les grandes couvertures des aîles les plus éloignées du corps & les grandes plumes des aîles sont d'un noir ferrugineux : les autres couvertures & les moyennes plumes de l'aîle sont de la même couleur que le dos. La queue est composée de douze plumes d'un noir-ferrugineux : la plus extérieure de chaque côté est de plus tachée d'un blanc sale. Les deux plumes du milieu sont plus courtes que les latérales , qui vont en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure , qui est plus longue que les deux du milieu d'environ huit lignes : ce qui rend la queue très - fourchue. La bête du demi-bec supérieur est hérissée de longs poils noirs , tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec est d'un brun sombre ou noirâtre , plus clair cependant vers la bête & plus foncé vers le bout. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve dans le Royaume de *Bengale*.

quo lucis radii incidunt modo. Pectus obscurè cinerascit & ad nigrum inclinat. Latera & crura albescent , & maculis quibusdam transversis , nigricantibus variegantur. Venter & tectrices caudæ inferiores albæ sunt & immaculatæ. Alarum tectrices majores à corpore remotiores , sicut & majores remiges , nigro-ferrugineæ : reliquæ tectrices alarum & remiges minores dorso concolores. Cauda duodecim constat rectricibus nigro-ferrugineis , quarum utrinque extrema sordidè albo maculata est. Rectrices binæ intermediae lateralibus sunt breviores ; laterales autem sensim atque sensim longiores fiunt ad utrinque extremam , binas intermedias octo circiter linearum longitudine excedentem : unde fit cauda maximè bifurca. Circa basin mandibulæ superioris longiusculi rigent pili nigri , antrorsum versi , setarum instar rigidi. Rostrum obscurè fuscum aut nigricans , dilutius tamen circa basin , & in apice saturatius. Pedes , unguisque nigricantes. Habitat in *Bengalensi* regno.

** 23. L'ÉCORCHEUR DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XIX. Fig. 1.

Lanius superne niger, oris pennarum nigro-viridescentibus, infernè albus; capite albo; occipitio nigro-viridescente; rectricibus primâ medietate cinereis, alterâ medietate nigris, apicē albis . . . COLLURIO MADAGASCARIENSIS.

Les Habitans de Madagascar l'appellent VANGA.

Craffitie *Merulam* circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices explet, & ad extremos ungues octo pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque sexdecim cum semi lineas longum est; cauda tres pollices cum decem lineis; pes quatuordecim lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue undecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anteriorum medium longitudine ferè adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput (excepto tamen occipitio nigro-viridescente), guttur, collum, pectus, ventrem, latera &

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces six lignes. Son bec depuis son crochet jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes & demie de long; sa queue trois pouces dix lignes; son pied quatorze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est presque aussi long que celui du milieu de ceux de devant. Il a quatorze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête (si l'on en excepte l'occiput, qui est d'un noir tirant sur le verd), la gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés,

les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blanches. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue & les petites du dessus des aîles sont noires, chaque plume étant bordée tout autour d'un noir changeant en verd. Les grandes couvertures du dessus des aîles sont noires, & terminées de blanc du côté extérieur, cette couleur coupant obliquement chaque plume : ce qui forme sur chaque aîle une large bande transversale, blanche. Les plumes des aîles sont noires, & ont leur bord intérieur blanc : les cinq premières des grandes ont aussi une petite tache blanche sur leur côté extérieur, vers la moitié de leur longueur. La queue est composée de douze plumes cendrées depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, ensuite noires & terminées de blanc. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en-devant & roides com-

crura vestiunt pennæ albæ. Tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus cooperientes concolores. Dorsum, uropygium, scapulares pennæ, quæ caudam superne obtegunt, alarumque tectrices superiores minores sunt nigræ, uniuscujusque pennæ margine nigro-viridescente. Alarum tectrices superiores majores sunt quoque nigræ, exterius albo terminatæ, albedine cujuslibet pennæ apicem obliquè occupante, & in utraque ala latam tæniam transversam, albam efficiente. Alarum remiges nigræ, marginibus interioribus candidis : majorum quinque primores exiguâ insuper maculâ albâ in latere exteriori donantur, idque versùs ipsarum mediam longitudinem. Caudam componunt duodecim rectrices ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque cinereæ, alterâ medietate nigræ, apicibus tamen albis. Binæ intermediae lateralibus sunt longiores; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Supra nares & versùs oris angulos longiusculi rigent pili nigri, antrorsum versi, setarum

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre V.* 193

rum instar rigidi. Rostrum me des foyes. Le bec est noir, nigrum, maximè aduncum, fort crochu, & très-propre à & ad dilaniandum optimè déchirer : le bout du demi-bec comparatum : mandibulæ inférieur est crochu comme inferioris apex aduncus est, celui du demi-bec supérieur; sicut & apex mandibulæ supérieur; quod quidem huic speciei peculiare. Pedes couleur de plomb; & les plumbeo colore tinguntur; ongles noirâtres. On le trouve ungues verò nigricant. Habitat à Madagascar, d'où il a été in museum Realmurianum apporté à M. de Reaumur par allatus à D. Poivre. M. Poivre.

** 24. LA GRANDE PIE-GRIESCHE VERTE DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XIX. Fig. 2.

Lanius superne nigro-viridans, infernè candidus; capite albo; remigibus nigris, oris exterioribus nigro-viridescentibus; rectricibus superne nigro-viridescentibus, subtus nigris
LANIUS MADAGASCARIENSIS MAJOR VIRIDIS.

Les Habitans de Madagascar l'appellent TCHA-CHERT-BÉ.

Præcedentem crassitie circiter æquat aut etiam paululum antecellit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices explet, & ad extremos ungues sex pollices cum novem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim cum semi lineas longum est; cauda tres pollices; pes decem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum un-

Elle est à peu près de la grosseur du précédent ou même un peu plus grosse. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes & demie de long; sa queue trois pouces; son pied dix lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec

l'ongle, huit lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Elle a quinze pouces de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont blanches. La partie du dessous du col la plus proche du dos, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un noir changeant en verd. Les plumes des ailes sont noires, & ont leur bord extérieur d'un noir changeant en verd. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que le dos en-dessus, & tout-à-fait noires en-dessous. Le bec, les pieds & les ongles sont d'une couleur de plomb. On la trouve à *Madagascar*, d'où elle a été apportée à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

gue octo lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis extensis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ paulò ultra duas tertias longitudinis caudæ partes protenduntur. Caput, guttur, collum, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ albæ. Tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes albo similiter imbuuntur. Pars colli superior dorso finitima, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, quæ alas superne cooperiunt & tectrices caudæ superiores sunt nigro-viridescentes. Alarum remiges nigrae, oris exterioribus nigro-viridescentibus. Cauda duodecim constat rectricibus superne dorso concoloribus, subtus verò penitus nigris. Rostrum, pedes, unguesque plumbei. Habitat in *Madagascar*, unde in *musæum Realmurianum* à *D. Poivre* allatus est.

** 25. LA PETITE PIE-GRIESCHE VERTE DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XV. Fig. 3.

Lanius superne obscurè viridis , infernè albus ; rectricibus lateralibus nigricantibus , oris exterioribus obscurè viridibus LANIUS MADAGASCARIENSIS MINOR VIRIDIS.

Les Habitans de Madagascar l'appellent TCHA-CHERT.

Crassitie Passerem domesticum æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & octo lineas æquat , & ad extremos ungues quinque pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo cum semi lineas longum est ; cauda unum pollicem & undecim lineas ; pes octo lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus laterales nonnihil longitudine excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum & decem linearum ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput , pars colli superior , dorsum , uropygium , rectrices caudæ superiores , pennæ alas superne & infernè tegentes , sicut &

Elle est de la grosseur d'un Moineau franc. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces huit lignes , & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes & demie de long ; sa queue un pouce onze lignes ; son pied huit lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , six lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a onze pouces dix lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les couvertures du dessus de la queue , celles du dessus & du dessous des aîles & les plumes scapulaires sont d'un verd sombre : cette cou-

leur est cependant sur la tête un peu plus brillante qu'ailleurs. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les jambes sont, du côté extérieur de la même couleur que le dos, & leur côté intérieur est varié de blanc & de noirâtre. Les plumes des ailes sont noirâtres, excepté leur bord extérieur & leur bout, qui sont d'un verd sombre. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont en-dessus de ce même verd sombre, & en-dessous elles sont noirâtres; toutes les latérales sont de cette dernière couleur, excepté leur bord extérieur, qui est aussi d'un verd sombre. Autour de la base du demi-bec supérieur sont quelques petits poils noirs, roides comme des foyes. Le bec est d'une couleur de plomb foncée, excepté son bout, qui est blanchâtre. Les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve à *Madagascar*, d'où elle a été apportée à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

scapulares, sunt obscurè virides, virore tamen in capite nonnihil splendidior. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera & caudæ rectrices inferiores albent. Crura in latere exteriori eodem ac dorsum colore tinguntur, ad latus verò interius albo & nigricante variegantur. Remiges nigricant, exceptis oris exterioribus & apicibus obscurè viridibus. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediæ superne eodem viridi obscuro tinguntur, infernè nigricant; laterales omnes nigricantes, exceptis oris exterioribus obscurè viridibus. Circa basin mandibulæ superioris quidam extant pili nigri, exiles, setarum instar rigidi. Rostrum saturatè plumbeum, apice tamen albidum. Pedes, unguesque nigri. Habitat in *Madagascaria*, unde in *musæum Realmurianum* à *D. Poivre* allatus.

** 26. LA PIE-GRIESCHE BLEUE DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XVI. Fig. 3.

Lanius superne splendidè cœruleus, infernè niveus (mas) cinereo-albus (fœmina); basi rostri nigro circumdatâ; rectricibus binis intermediis superne cœruleis, apice nigris....
LANIUS MADAGASCARIENSIS CÆRULEUS.

Les Habitans de Madagascar l'appellent TCHA-CHERT-DAE.

Craffitie præcedentem æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo cum semi lineas longum; cauda duos pollices & sex lineas; pes octo cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales nonnihil longitudine excedit. Alis expansis, extremitates majorum remigum undecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ duas tertias longitudinis caudæ partes non attingunt. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ splendidè cœruleæ. Scapula-

Elle est de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes & demie de long; sa queue deux pouces six lignes; son pied huit lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Elle a onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue, celles

du dessus des aîles & les petites du dessous sont d'un bleu très-éclatant. Les plumes qui entourent la bâte du bec, sont d'un noir de velours. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les couvertures du dessous de la queue & les grandes du dessous de l'aîle sont d'un blanc de neige. Les jambes sont de la même couleur, excepté les plumes qui entourent le talon, qui sont bleues. Les grandes plumes des aîles sont noires en-dessus & en-dessous, excepté la partie supérieure de leur côté extérieur, qui est bleue depuis l'origine de la plume jusque vers les deux tiers de sa longueur : les moyennes sont en-dessus bleues du côté extérieur, noires du côté intérieur, & en-dessous elles sont tout-à-fait noires. La queue est composée de douze plumes, toutes noires en-dessous ; & en-dessus les deux du milieu sont bleues & terminées de noir ; leur tige est de cette dernière couleur : les quatre qui les suivent de chaque côté sont bleues du côté extérieur, & noires du côté intérieur & à leur bout : la plus extérieure de chaque côté est noire dans toute sa longueur, excepté le côté ex-

res, quæ caudam superne cooperiunt, teñtrices alarum superiores & minores inferiores concolores. Basin rostri ambiunt pennæ nigræ, holoserici villosi instar splendentes. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, pennæ caudam subtus tegentes, alarumque teñtrices inferiores majores niveæ. Crura vestiunt pennæ concolores, exceptis illis calcaneum ambientibus, cœruleis. Remiges majores superne & infernè nigræ, si tamen excipias lateris exterioris partem superiorem ab exortu pennæ ad duas circiter tertias longitudinis partes usque cœruleam : minores superne in latere exteriori cœruleæ, in latere interiori, sicut & subtus in utroque latere, nigræ. Cauda duodecim constat rectricibus subtus nigris ; superne verò binæ intermediae sunt cœruleæ, apicibus & scapis nigris : quatuor utrinque sequentes in latere exteriori cœruleæ, in interiori & apice nigræ : utrinque tandem extrema in tota longitudine nigra, excepto tamen exortu pennæ in latere exteriori tantum cœruleo. Supra nares & versùs oris angulos

longiusculi extant pili nigri, antrorsum versi, setarum infar rigidi. Rostrum splendide cœruleum. Pedes, unguisque nigri.

foyes. Le bec est d'un bleu vif. Les pieds & les ongles sont noirs.

Fœmina à *mare* differt coloribus multò minùs splendentibus. Præterea in universo corpore inferiore, parte scilicet colli inferiore, pectore, ventre, lateribus, cruribus & tectricibus caudæ inferioribus, ex cinereo albet. Alarum tectrices inferiores majores sunt saturatius cinereæ. Pennæ calcaneum ambientes ad cœruleum vergunt. Remiges nigricant, oris tantum exterioribus donantur cœruleis. Rectrices binæ intermediæ cœruleæ, apicibus & scapis nigris : quatuor utrinque sequentes superne in latere exteriori cœruleæ, in latere interiore nigricantes, subtus verò cinereæ : utrinque tandem extrema superne nigricans, infernè cinerea. In reliquis cum *mare* convenit.

est noirâtre en-dessus & cendrée en-dessous. Du reste elle ressemble au *mâle*.

Habitant in *Madagascar*, unde in *musæum Real-*

térieur, qui est bleu vers l'origine de la plume seulement. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des

La *femelle* diffère du *mâle* par ses couleurs, qui sont beaucoup moins vives. De plus elle a tout le dessous du corps, sçavoir la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue, d'un gris-blanc. Les grandes couvertures du dessous de l'aile sont d'un gris plus foncé. Les plumes qui entourent le talon, tirent sur le bleu. Les plumes des ailes sont noirâtres, & n'ont de bleu que leur bord extérieur. Les deux du milieu de la queue sont bleues & terminées de noir ; leur tige est de cette dernière couleur : les quatre plumes qui les suivent de chaque côté sont en-dessus bleues du côté extérieur, noirâtres du côté intérieur, & en-dessous elles sont cendrées : la plus extérieure de chaque côté

On les trouve à *Madagascar*, d'où elles ont été appor-

tées à *M. de Reaumur* par *M. murianum* à *D. Poivre* allati
Poivre. sunt.

XXII.

Le genre de la Grive.

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de mem-
 branes ; trois devant , un der-
 rière ; tous séparés environ
 jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plu-
 mes jusqu'au talon :

Le bec droit , convexe en-
 dessus , aussi épais que large
 à sa base :

Les bords de la mandibule su-
 périeure échancrés vers le
 bout :

Le bout de la mandibule supé-
 rieure presque droit.

XXII.

Genus Turdinum.

Hujus character est
 Digiti quatuor , membranis
 destituti ; tres scilicet an-
 tici , posticus unus ; om-
 nes circiter usque ad exor-
 tum discreti :

Crura ad calcaneum usque
 plumosa :

Rostrum rectum , superne
 convexum ; basis crassitie
 latitudinem æquante :

Mandibula superior apicè
 utrinque emarginata :

Apex mandibulæ superioris
 subrectus.

Les Grecs appellent la GRIVE en général , Κίχλη. Aldrov. Schwenck. Jonst.
Κίχλα. Schwenck. Jonst. Ζίχλα. Schwenck. Ίχλα. Jonst.

Les Espagnols , TORDO ; ZORZOL. Aldrov.

Les Italiens , TORDO ; & en quelques endroits , GIGENIA. Aldrov.

Les Allemands , ZIEMER. Gesn. Aldrov. Schwenck. KRAMET-VOGEL ;
WECKHOLTER-VOGEL. Schwenck.

Les Flamands , CRAMER. Aldrov.

Les Habitans des Pays-Bas , LIJSTER , ou LIJSTER VOGHEL. Aldrov.

Les Illyriens , KWICZIELA. Aldrov.

Les Polonois , GLUCH ; JEMIOLUCHA. Aldrov. DROZD. Rzac.

Les Anglois , FELDEFARE ; FIELDFARE ; FILFAR. Aldrov.

* * I. LA GROSSE GRIVE.

Turdus superne griseo-fuscus , infernè albo-flavicans , macu-
lis nigricantibus varius ; remigibus & rectricibus lateralibus
superne griseo-fuscis , oris albidis , infernè cinereis ; rectrici-
bus tribus extimis albo terminatis TURDUS MAJOR.

Turdus



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Pie-grièche grise de Cayenne.

2. Pie-grièche tachetée de Cayenne.



Marburet del. et Sculp.

1. Pic-grièche du Cap de Bonne Espérance. 2. Pic-grièche de la Louisiane. 3. Petite Pic-grièche verte de Madagascar.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Petite Pie-grièche de Madagascar, mâle. 3. Pie-grièche bleue de Madagascar.
 2. Petite Pie-grièche de Madagascar, femelle. 4. Pie-grièche jaune de Cayenne.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Pie-grièche grise du Sénégal.

2. Pie-grièche rouge du Sénégal.



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Pie-grièche de Luçon.
2. Pie-grièche de Manille.

3. Pie-grièche de Canada.
4. Pie-grièche rousse de Madagascar.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Ecorcheur de Madagascar.

2. Grande Pie-grieche verte de Madagascar.

- Turdus cinereus*, nigris punctis, rostro pallido. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXII. sp. 1.
- Turdus viscivorus*. Gesn. Avi. pag. 759. hujus icon satis accurata pag. 760.
- Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 593. hujus icon non satis accurata pag. 582.
- Jonst. Avi. pag. 73. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 39.
- Charlet. Exer. pag. 89. N°. 1.
- Charlet. Onomast. pag. 83. N°. 1.
- Bell. Obs. pag. 17.
- Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.
- Turdus viscivorus*, vel major; *Turdela* quibusdam Recentioribus. Gesn. icon. Avi. pag. 30, in qua hujus icon satis accurata.
- Turdus viscivorus* major. Willugh. Ornith. pag. 137. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXVI.
- Raj. Syn. Avi. pag. 64. N°. A. 1.
- Turdus viscivorus* maximus. Klein. Avi. pag. 65. N°. 1.
- Frisch. maris & fœminæ icones accuratæ Tab. 25.
- Turdus* maximus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 359.
- Turdus* maximus, seu *Turdus viscivorus* major Aldrovandi, & Jonstoni; *Turdela* Isidori. Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 423.
- Turdus* major & *viscivorus* Gesnero; *Turdus baccivorus* aliis. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 296.
- Tordo*. Olina. pag. 25, in qua hujus icon accurata.
- Grive. Alb. Tom. I. pag. 28; avec une figure mal coloriée Pl. 33.
- Grande Grive, , qu'on nomme autrement à Paris Calandre. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 324, avec une mauvaise figure pag. 325.
- Grive; Siserre. Bel. Portr. d'Ois. pag. 82 a, dans laquelle est la même figure.
- Les Lionois l'appellent Siserre. Bel. Gesn. Aldrov.
- Les Grecs, Κίχλα; Κίχλας ἰσοβόρος; Ὄζοφαγος μέγας. Bel. Ἰξοβόρος. Aldrov. Jonst. Charlet. Ἰξιόβος; Ἰξιόφαγος. Schwenck. Ἰξοφέγος. Aldrov. Jonst.
- Les Grecs vulgaires, Σκυνοπιπλος; & quelques-uns, Μυθιοπιπλος. Bel.
- Les Turcs, GARATAUK. Gesn. Aldrov.
- Les Catalans, TORT. Barr.
- Les Italiens, TORDO; TORDELA. Olina. TURDELA. Bel. Gesn. GARDENNA. Aldrov.
- Les Lombards, DRESSA. Olina. DRESSO. Gesn. Aldrov.
- Les Boulonnois, COLUMBINA. Aldrov.
- Les Véronnois, GASOTTO. Bel.
- Les Vénitiens, DREXANO. Bel. Gesn. Aldrov.
- Les Savoyards, GRIVE SISALLE. Gesn. Aldrov.
- Les Allemands, DROSSEL; KRAMBS-VOGEL. Rzac. SCHNARRE. Schwenck. Rzac. Frisch. ZIERING. Gesn. Aldrov.
- Les Carinthiens, ZERRER. Gesn. Aldrov.

Les Bavaois, SCHNERRER. *Gesn. Aldrov.*

Les Silésiens, SCHNERRE. *Schwenck.*

Les Suisses, MISTLER. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* MISTEL-DROSTEL. *Frisch.*
MISTEL-FINCK. *Gesn. Aldrov.* MISTEL-FINCH. *Gesn.* MISTEL-ZIEMER.
Schwenck.

Les Illyriens, PRSKAWECZ. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, JEMIOŁUCHA ; DROZD NAYWIEKSZY. *Rzac.*

Les Anglois, MISSLE-BIRD. *Alb.* MISSEL-BIRD ; SHRITE. *Willugh. Raj.*
SHREITCH. *Charlet.* SIBBALD. MISSETOE-THRUSH. *Charlet.*

C'est la plus grosse espece de nos Grives. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long ; sa queue quatre pouces ; son pied seize lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Elle a seize pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos, les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures

Hæc est *Turdorum nostratum* species maxima. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat, & ad extremos ungues decem pollices cum lineis binis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est ; cauda quatuor pollices ; pes sexdecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum supremum, scapulares pennæ, alarumque tectrices superiores minores sunt griseo-fuscæ. Pars dorsi infima, uropygium & tect-

trices caudæ superiores concolores, attamen ad rufum nonnihil vergentes: majores insuper caudæ tectrices superiores marginibus donantur albidis. Guttur albet cum aliqua flavicantis mixtura, & exiguis quibusdam maculis fuscis variegatur. Genæ, pars colli inferior, pectus, venter, latera & tectrices caudæ inferiores ex albo flavicant, & majusculis maculis nigricantibus variegantur. Crura vestiunt pennæ albo-flavicantes & immaculatæ. Alarum tectrices inferiores albet & aliquid flavicantis admixtum habent: superiores majores sunt griseo-fuscæ, marginibus albidis. Remiges superne griseo-fusco saturatiore tinguntur, marginibus pariter albidis, margine tamen strictissimâ; infernè verò sunt cineræ. Remix secunda reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim rectrices subtus cineræ; superne verò binæ intermediæ sunt griseo-fuscæ: laterales in latere exteriori concolores, in interiori colore saturatiore tinctæ; omnes insuper marginibus utrinque donantur albidis: tres utrinque extimæ albo terminan-

du dessus de la queue sont de la même couleur, mais qui tire un peu sur le roux: les plus grandes des couvertures du dessus de la queue sont bordées de blanchâtre. La gorge est d'un blanc mêlé d'une très-légère teinte de jaunâtre, & varié de quelques petites taches brunes. Les joues, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-jaunâtre, varié d'assez grandes taches noirâtres. Les jambes sont d'un blanc-jaunâtre & sans taches. Les couvertures du dessous de l'aile sont d'un blanc mêlé d'une très-légère teinte de jaunâtre: les grandes du dessus sont d'un gris-brun, & bordées de blanchâtre. Les plumes des ailes sont en-dessus d'un gris-brun plus foncé, & bordées de même de blanchâtre, mais cette bordure est fort étroite; & en-dessous elles sont cendrées. La seconde des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes, toutes cendrées en-dessous; & en-dessus les deux du milieu sont d'un gris-brun: les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, leur côté intérieur est d'une couleur plus foncée;

& toutes sont bordées des deux côtés de blanchâtre : de plus les trois plus extérieures de chaque côté sont terminées de blanc ; cette couleur occupe d'autant plus d'espace , que la plume est plus extérieure. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Le dedans de la bouche est jaune. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont quelques petits poils bruns , tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec est gris-brun à son origine & noirâtre vers son bout. Les pieds sont jaunâtres ; & les ongles noirs. Elle se nourrit de *Bayes* & d'*Insectes*. Dans le printemps elle se perche au sommet des plus grands arbres , & chante très - bien. Elle ne vole point par troupe , & se contente de sa femelle pour compagnie. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

tur ; quæ albedo eò magis versùs pennæ exortum protenditur , quò rectrix fit exterior. Oculorum irides avelaneæ. Os intus flavescit. Supra nares & circa oris angulos quidam extant exigui pili fusci , antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum in exortu griseo-fuscum , in apice nigricans. Pedes flavicantes ; ungues verò nigri. *Baccis & Insectis* victitat. Altissimarum arborum summitatibus insidens , verno tempore egregiè sibilat. Non gregatim , sed cum pari sua seu foemina tantùm volat. *Ex museo Realmuriano.*

A. LA GRIVE BLANCHE.

Turdus candidus.

Turdus albus. Gesn. Avi. pag. 754.

Klein. Avi. pag. 67. N^o. 9.

Frisch. maris & fœminæ icones accuratæ Tab. 33.

Les Allemands l'appellent WEISSE-DROSTEL. Frisch.

Elle ne diffère de la précédente que par sa couleur , qui est beaucoup plus claire ou presque blanche. Sa poitrine est de même variée de taches , mais d'une couleur moins foncée.

A præcedente differt colore dilutiore multò aut ferè candido. Pectus habet similiter variegatum maculis , sed multò dilutionibus.

** 2. LA PETITE GRIVE.

Turdus superne griseo-fuscus, infernè albo-rufescens, maculis nigricantibus varius; remigibus interiùs versùs exortum rufescentibus; rectricibus superne griseo-fuscis, nonnihil ad rufum vergentibus, infernè cinereis TURDUS MINOR.

Turdus colore cinereo, maculato, rostro flavescente. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXII. sp. 2.

Turdus minor alter, quem Itali Turdum simpliciter, Nostri Trostel vocitant. Gesn. Avi. pag. 762.

Turdus viscivorus minor. Gesn. icon. Avi. pag. 30.

Turdus viscivorus minor, seu simpliciter dictus. Raj. Syn. Avi. pag. 64. N°. A. 2.

Turdus simpliciter dictus. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 599. hujus icon non satis accurata pag. 600.

Jonst. Avi. pag. 73.

Turdus simpliciter dictus, seu viscivorus minor. Willugh. Ornith. pag. 138. hujus icon satis accurata Tab. XXXVII.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.

Turdus musicus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 361.

Frisch. maris & fœminæ icones accuratæ Tab. 27.

Turdus musicus Schwenckfeldii; Turdus simpliciter dictus Aldrovandi; Turdus minor alter Gesneri; Collyrio Turneri. Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 424.

Turdus minimus nostras. Klein. Avi. pag. 66. N°. 4.

Tordo Mezzano. Olina. pag. 25.

Petite Grive. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 326.

Mauvis ou Grive ordinaire. Alb. Tom. I. pag. 29; avec une figure mal coloriée Pl. 34.

Les Grecs l'appellent Κύχλα; Κίγλα. Gesn. Κίχλη. Raj.

Les Italiens, TURDO; TUORDO. Gesn. TORDO. Gesn. Aldrov. TORDO MEZZANO. Olina.

Les Allemands, DROSSEL. Gesn. Schwenck. Rzac. DROESSEL; DURSTEL; TROSSEL; TRUSEL; SANG-DRUSCHEL; WYSZ-TROSTEL. Gesn. Aldrov. WEISSE-DROSSEL; ZIER-DROSSEL. Schwenck. WEISS-DROSTEL; SING-DROSTEL. Frisch.

Les Suisses, TROSTEL. Gesn. Aldrov.

Les Illyriens, DROZD. Gesn. Aldrov.

Les Polonois, DROZD. Gesn. Aldrov. Rzac.

Les Anglois, THROSTLE. Willugh. Raj. THRUSH. Willugh. SONGE THRUSH; MAVIS. Willugh. Raj. Alb.

Elle est beaucoup moins grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue trois pouces une ligne; son pied quatorze lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a treize pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun. Les couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur, mais les moyennes ont chacune une tache rouffâtre à leur bout. Les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine & les côtés sont d'un blanc-rouffâtre, varié de taches noirâtres. Le ventre est blanc, varié pareillement de quelques petites taches noirâtres. Les jambes sont d'un gris tirant sur le roux. Les

Præcedenti multum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues octo tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est; cauda tres pollices cum linea una; pes quatuordecim cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus laterales longitudine nonnihil antecellit. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ caudam superne cooperientes & scapulares sunt griseo-fuscæ. Alarum tectrices superiores concolores; attamen ex mediis quælibet maculâ rufescente in apice donatur. Genæ, guttur, pars colli inferior, pectus & latera ex albo rufescunt, maculisque nigricantibus variegantur. Venter albus, minutis quibusdam maculis nigricantibus similiter varius.

Crura grisea, ad rufum inclinantia. Caudæ tectrices inferiores sordide albæ, griseo-fusco & pauco rufescente variegatæ. Alas subtus cooperientes pennæ rufescentes. Remiges superne in latere exteriori griseo-fuscæ, in interiori ab exortu pennæ ad tertiam circiter longitudinis partem usque rufescentes, in reliqua longitudine fuscæ : subtus verò sunt cinereæ. Cauda duodecim constat rectricibus superne griseo-fuscis nonnihil ad rufum vergentibus, infernè cinereis. Laterales intermedias longitudine paululum excedunt ; unde fit cauda nonnihil bifida. Oculorum irides avellaneæ. Os intus flavescit. Supra nares & circa oris angulos quidam extant exigui pili fusci, antrosum versi, setarum instar rigidi. Rostrum fuscum, excepto mandibulæ inferioris exortu candicante. Pedes, unguisque griseo-fusci. *Insectis* potius quàm *Baccis* victitat. Vere egregiè cantat, & in sepibus potius quàm in excelsis arboribus nidificat. Ut præcedens, solitarius est, nec gregatim volat. *Ex museo Realmuriano.*

couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale, varié de gris-brun & d'un peu de rouffâtre. Celles du dessous de l'aile sont rouffâtres. Les plumes des ailes sont en-dessus d'un gris-brun du côté extérieur ; leur côté intérieur est brun, excepté depuis l'origine de la plume jusque vers le tiers de sa longueur, où il est rouffâtre : & en-dessous elles sont cendrées. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun tirant un peu sur le roux en-dessus, & cendrées en-dessous. Les latérales sont un peu plus longues que celles du milieu ; ce qui rend la queue un peu fourchue. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Le dedans de la bouche est jaune. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont quelques petits poils bruns, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est brun, excepté l'origine du demi-bec inférieur, qui est blanchâtre. Les pieds & les ongles sont gris-bruns. Elle se nourrit d'*Insectes* plutôt que de *Bayes*. Elle chante très-bien au printems, & fait son nid plus volontiers sur les buissons que sur les grands arbres. Comme la précédente, elle ne vole point par troupe. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

A. LA PETITE GRIVE A TESTE BLANCHE.

Turdus minor leucocephalus.

Turdus albo capite. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXII. sp. 3.

Turdus leucocephalos. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 601, in qua icon non satis accurata.

Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 39.

Elle ressemble tout - à - fait à la précédente , si ce n'est qu'elle a le sommet de la tête d'un beau blanc. Præcedenti omninò similis est, nisi quod vertex capitis penitus sit candidus.

B. LA PETITE GRIVE HUPEE.

Turdus minor cristatus.

Turdus musicus cristatus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 362.

Les Allemands l'appellent KOBEL DROSSEL. Schwenck.

Elle ressemble à la *petite Grive* par sa grandeur & sa couleur; elle en diffère seulement en ce qu'elle a une hupe blanchâtre sur le sommet de la tête, & que la partie supérieure de son col est entourée d'un cercle blanc. Cum *Turdo minori* colore & magnitudine convenit; ab illo tantùm discrepat cristâ, quam in vertice gerit, albidâ, & circulo albo, pronâ parte collum mediotenus cingente.

** 3. LE MAUVIS.

Voyez Pl. XX. fig. 1.

Turdus superne griseo-fuscus, internè albidus, maculis griseo-fuscis variis; tæniâ supra oculos albo-flavicante; lateribus & rectricibus alarum inferioribus rufis; rectricibus superne griseo-fuscis, internè cinereis TURDUS ILIACUS.

Turdus alis subtus ferrugineis, lineâ supra oculos albicante. Faun. Suec. Linn. N°. 189.

Turdus

Turdus cinereus, rostro nigro, alis subtus rubris. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXII. sp. 5.*

Turdus cinereus, rostro nigro, alis subtus rubris *Barreri. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 73. sp. 8.*

Turdus minor. Schwenck. Avi. Sil. pag. 361.

Turdus minor, quem *Illadem*, aut *Tyladem* cognominant. *Gesn. Avi. pag. 760. hujus icon non satis accurata pag. 761.*

Gesn. icon. Avi. pag. 28, in qua eadem icon.

Turdus minor Gesnero; Illas, Tylas Gazæ; Iliacus Turdus Hermolao! Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 296.

Turdus Illas. Jonst. Avi. pag. 73.

Turdus Illas, sive Tylas. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 597. hujus icon minus accurata pag. 598.

Turdus Illas, seu Tylas Aldrovandi; Winsela Gesneri; Turdela sylvestris; Turdela montana; Turdus minor Schwenckfeldii. Rzac. Aust. Hist. nat. Pol. pag. 424.

Turdus Iliacus. Bell. Obs. pag. 17.

Klein. Avi. pag. 66. N^o. 3.

Turdus Iliacus, sive Illas, aut Tylas. Willugh. Ornith. pag. 139.

Raj. Syn. Avi. pag. 64. N^o. A. 4.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17. hujus icon pessima Tab. 13. Fig. 1.

Turdus minimus. Frisch. maris & fœminæ icones accuratæ Tab. 28.

Turdus viscivorus. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 73. sp. 7.

Illas, Nonnullis Tylas. Charlet. Exer. pag. 90. N^o. 3.

Charlet. Onomast. pag. 83. N^o. 3.

Tordo Saffello. Olin. pag. 25.

Mauvis. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 327, dans laquelle il y a une figure très-peu exacte.

Mauvis; Grivette; Trasse; Touret. Bel. Portr. d'Ois. pag. 28 b, dans laquelle est la même figure.

Grive de vigne. Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 158.

Grive rouge-aîle. Alb. Tom. I. pag. 30; avec une figure mal colorée Pl. 35.

Les Grecs l'appellent Ἰλιάς; Τυλάς; Aldrov. Schwenck. Ἰλιάδα; Ἰλιάδα.

Aldrov. Ἰλιάς. Schwenck. Κίχλα ἰλιάς; Κίχλα ἰλιάδα. Bel.

Les Catalans, TORT ALA ROITG. Barr.

Les Italiens, MALVIZZO. Bel. Gesn. Aldrov. TORDO SASSELLO. Olin.

Les Italiens aux environs du Lac majeur, CION; CIPPER. Bel. Gesn. Aldrov.

Les Savoyards, GRIVETTE. Gesn.

Les Allemands, WYN-TROSTEL. Gesn. Aldrov. Willugh. WEIN-DROSSEL.

Schwenck. Rzac. WEIN-DROSTEL; ROTH-DROSTEL. Frisch. ROT-DROS-

SEL; HEIDE-DROSSEL; HEIDE-ZIEMER; PFIEFF-DROSSEL. Schwenck.

PFIEFF-DROSSEL. Rzac. ROT-TROSTEL; BOEMERLE; BOEMERLIN;

BEHEMLE; BEEMER-ZIEMER. Gesn. Aldrov.

- Le Peuple Allemand aux environs de Cologne*, BITTER. *Gesn. Aldrov.*
Les Saxons, WEIN-DRUSCHEL; WEINGARF-VOGEL. *Gesn. Aldrov.*
Les Silésiens, HEIDE-DROSSEL. *Schwenck. Klein Ziemer. Schwenck. Rzac.*
Les Suisses, BERG-TROSTEL. *Gesn. Aldrov. BERG-DROSSEL. Schwenck.*
Les Suisses du Canton de Zurich, WINSEL. *Gesn. Aldrov. Schwenck. WINTZEL. Gesn. Aldrov. WINTZEL. Gesn. WINZEL. Rzac.*
Les Baslois, GIRERLE. *Gesn. Schwenck. GIXERLE. Aldrov.*
Les Illyriens, GIKAWECZ. *Gesn.*
Les Polonois, DROZD MNIEYSSY. *Rzac.*
Les Smolandois, KLER. *Linn.*
Les Ostrogoths, KLAEDRA. *Linn.*
Les Anglois, WIND-THRUSH. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. RED-WING. Willugh. Raj. Sibbald. Alb. SWINE-PIPE. Willugh. Raj.*
Les Manceaux, TOURET. *Bel. Aldrov.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces onze lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue trois pouces; son pied treize lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, douze lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a douze pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulai-

Crassitie à précédente nonnihil superatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & undecim lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est; cauda tres pollices; pes tredecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duodecim lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus laterales longitudine nonnihil antecellit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & octo linearum; alæ verò complicatæ duas tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caput, partem colli

Superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ griseo-fusæ. Quæ caudam superne cooperiunt, sicut & scapulares, concolores. In utroque capitis latere tania extat longitudinalis, albo-flavicans, à naribus orta, per oculos ducta & versùs occipitium usque protensa. Circa oris angulos quidam sunt exigui pili nigri, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Guttur & collum inferius ex albo flavicant, & nigricantibus variegantur maculis, cujuslibet pennæ medium occupantibus. Pectus, venter & tectrices caudæ inferiores sunt albidæ, maculis griseo-fuscis, in medio uniuscujusque pennæ similiter sitis, variegatæ; excepto tamen medio ventre albido & immaculato. Crura grisea. Latera & tectrices alarum inferiores rufæ. Pennæ alas superne tegentes dorso concolores, mediis paucorufescenteterminatis, & majorum corpori viciniorum marginibus exterioribus tantum quoque rufescentibus. Alarum remiges sunt superne in latere exteriori griseo-fusæ, in latere interiori penitus fusæ, versùs margines tamen cinereo-rufescen-

res & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale, d'un blanc-jaunâtre, qui part des narines & s'étend jusque vers l'occiput, en passant par les yeux. Vers les coins de la bouche sont quelques petits poils noirs, tournés en-devant & roides comme des soyes. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc-jaunâtre, varié de taches noirâtres, qui occupent le milieu de chaque plume. La poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanchâtre varié de taches de gris-brun, situées pareillement au milieu de chaque plume; il faut cependant en excepter le milieu du ventre, qui est blanchâtre & sans taches. Les jambes sont grises. Les côtés & les couvertures du dessous des ailes sont rouffes. Celles du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos; mais les moyennes sont terminées d'un peu de rouffâtre, & les grandes les plus proches du corps sont bordées de cette couleur du côté extérieur seulement. Les plumes des ailes sont en-dessus d'un gris-brun du côté extérieur; leur côté intérieur est brun, excepté vers

les bords, où il est d'un cendré-rouffâtre; & le bord extérieur des quatre premières est blanchâtre: toutes ces plumes sont cendrées en-dessous. La première est extrêmement courte; la troisième & la quatrième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun en-dessus & cendrées en-dessous. Les latérales sont un peu plus longues que celles du milieu; ce qui rend la queue un peu fourchue. L'iris des yeux est d'une couleur de nuit-fette foncée. Le dedans de la bouche est jaune. Le bec est noirâtre, excepté la bête du demi-bec inférieur, qui est blanchâtre. Les pieds sont d'un gris clair; & les ongles bruns. Les *Mauvis* arrivent par troupes en automne. Ils mangent beaucoup de raisins & font par là beaucoup de tort aux vignes. Ils vivent aussi d'*Insectes*. Du cabinet de M. de Reaumur.

tes; quatuor insuper priorum oræ exteriores sunt albidæ: omnes autem remiges sunt subtus cineræ. Prima remix brevissima; tertia & quarta omnium longissima. Caudam componunt duodecim rectrices superne griseo-fusæ, infernè cineræ. Laterales intermedias paululum longitudine excedunt; unde fit cauda nonnihil bifida. Oculorum irides saturatè avellaneæ. Os intus flavescit. Rostrum nigricat, exceptâ basi mandibulæ inferioris albidâ. Pedes sunt dilutè grisei; ungues verò fusci. Autumno gregatim ad nos advolant *Turdi Iliaci*. Uvis libenter pascuntur, & vineis multum damni inferunt. *Insectis* quoque vicitant. *Ex museo Reaumuriano.*

** 4. LE MAUVIS DE LA CAROLINE.

Turdus superne fusco-rufescens, infernè rufescens, maculis fusco-rufescentibus varius; ventre sordidè albo; remigibus interiùs versùs exortum albo rufescentibus; rectricibus superne fusco-rufescentibus, infernè cinereis *TURDUS ILIACUS CAROLINENSIS.*

Turdus minimus. Klein. Avi. pag. 69. N^o. 23.

Tamatia. Pison. Hist. Nat. pag. 96, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.

Tamatia Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 208, in qua hujus icon minimè accurata.

Jonst. Avi. pag. 142. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 59.

Tamatia Brasiliensibus Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 140. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIX.

Raj. Syn. Avi. pag. 65. N°. 6.

Petite Grive. Catesb. Tom. I. pag. 31; avec une figure exacte Pl. 31.

Les Anglois l'appellent LITTLE THRUSH. Catesb.

Les Brasiliens, TAMATIA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Alaudam crassitie non superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & octo lineas aequat, & ad extremos ungues sex pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda duos pollices cum novem lineis; pes quatuordecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum novem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ duas ferè tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, quæ alas superne cooperiunt, & tectrices caudæ superiores ex fusco rufescunt. Guttur, col-

Il n'est pas plus gros qu'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces huit lignes; & jusqu'à celui des ongles de six pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue deux pouces neuf lignes; son pied quatorze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a neuf pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun-roux. La gorge, la partie inférieure du col & la

poitrine sont d'un rouffâtre marqué de taches d'un brun-roux. Les côtés & les jambes sont d'un gris tirant sur le roux. Le ventre est d'un blanc sale. Les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aile sont d'un blanc-rouffâtre. Les plumes des ailes sont cendrées en-dessous ; mais en-dessus elles sont d'un brun-roux du côté extérieur, & leur côté intérieur est d'un brun plus foncé vers le bout de la plume & d'un blanc-rouffâtre à son origine. La queue est composée de douze plumes d'un brun-roux en-dessus & cendrées en-dessous. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont quelques petits poils bruns, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont gris-bruns. Il se nourrit de *Bayes*. On le trouve à la *Caroline* & en *Canada*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Gautier*.

lum inferius & pectus vestiunt pennæ rufescentes, maculis fusco-rufescentibus variæ. Latera & crura ex griseo ad rufum vergunt. Venter sordidè albet. Caudæ rectrices inferiores & pennæ alas subtus tegentes ex albo rufescunt. Remiges sunt infernè cineræ, superne verò in latere exteriori fusco-rufescentes, in latere interiore versùs pennæ apicem fusco saturatiore tinctæ & versùs ipsius exortum albo-rufescentes. Cauda duodecim constat rectricibus superne fusco-rufescentibus, infernè cinereis. Supra nares & circa oris angulos quidam extant exigui pili fusci, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque griseo-fusci. *Baccis* victitat. Habitat in *Carolina* & *Canada*, unde in *musæum Reaumurianum* missus à *D. Gautier*.

** 5. LA LITORNE OU TOURDELLE.

Turdus superne fusco-rufescens, infernè rufescens, maculis nigricantibus varius ; capite, collo superiore & uropygio cinereis ; ventre albo ; rectricibus lateralibus superne fuscis, oris exterioribus griseo-fuscis, infernè cinereis . . .
TURDUS PILARIS SIVE TURDELA.

Turdus rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus ; capite cano. *Faun. Suec. Linn. N^o. 188.*

Turdus cinereus, rostro ad basim piloso. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXII. sp. 4.

Turdus simpliciter. Klein. Avi. pag. 65. N°. 2.

Turdus simpliciter dictus, mediæ magnitudinis. Gesn. icon. Avi. pag. 29, in qua icon satis accurata.

Turdus quem Pilarem Gaza nominat. Gesn. Avi. pag. 752. eadem icon pag. 753.

Turdus Pilaris. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 595. hujus icon minimè accurata pag. 596.

Bell. Obs. pag. 17.

Willugh. Ornith. pag. 138. hujus icon ab Aldrov. mutuata Tab. XXXVII.

Raj. Syn. Avi. pag. 64. N°. A. 3.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 73. sp. 6.

Turdus Pilaris Gazæ; *Turdus mediæ magnitudinis Gesnero*; *Turdela Isidoro*; *Quiscula Gelenio*. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 296.

Turdus Pilaris Aldrovandi, *Gazæ*, *Gesneri*; *Turdus medius Schwenckfeldii*. Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 423.

Turdus medius. Schwenck. Avi. Sil. pag. 359.

Turdus medius pedibus nigris. Frisch. maris & fæminæ icones accuratæ Tab. 26.

Trichas. Jonst. Avi. pag. 73. hujus icon satis accurata Tab. 37, sub titulo, *Turdus*; & insuper altera icon à Gesnero mutuata Tab. 39, sub titulo, *Turdus simpliciter*.

Trichas; *Turdus Pilaris*; Aliis *Collurio*. Charlet. Exer. pag. 90. N°. 2. Charlet. Onomazt. pag. 83. N°. 2.

Litorne. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 328; avec une mauvaise figure pag. 329.

Litorne; *Oiseau de Nerte*. Bel. Portr. d'Ois. pag. 83 a, dans laquelle est la même figure.

Tourdelle. Alb. Tom. I. pag. 31; avec une figure mal coloriée Pl. 36.

Les Grecs l'appellent *Τριχάς*. Gesn. Aldrov. Schwenck. *Κίχλα*; *Κίχλα τριχάς*. Bel.

Les Espagnols, *TORDO*; *ZORZOL*. Gesn.

Les Italiens, *TORDO*. Bel. Gesn. *MALVIZO*. Gesn.

Les Italiens, parmi le peuple, *SCHIRON*. Gesn. Aldrov.

Les Lombards, *VISCADA*. Gesn. Aldrov. *VISCARDO*; *DRES*. Bel.

Les Allemands *KRAMET-VOGEL*. Gesn. Aldrov. Schwenck. *KRAMMETS-VOGEL*. Rzac. *KRAMESZ-VOGEL*; *KRANWIT-VOGEL*. Gesn. Aldrov.

Les Silésiens, *ZIEMER*. Frisch. *GROS-ZIEMER*; *BLAW-ZIEMER*. Schwenck.

Les Suisses, *RECKOLTER-VOGEL*; *WACHHOLTER-VOGEL*; *WECHOLTER-ZIEMER*. Gesn. Aldrov. *WACHOLDER-DROSTEL*. Frisch.

Les Illyriens, *KWICZIELA*. Gesn.

Les Polonois, *DROZD SRZEDNI*; *ZWICZOL*. Rzac.

Les Suédois, *KRAMS-FOGEL*. Linn.

Les Anglois, *FIELDFARE*. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb. *FELDEFARE*; Raj. Charlet.

Elle est presque aussi grosse que la *grosse Grive*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes de long ; sa queue trois pouces neuf lignes ; son pied quinze lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , douze lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a quinze pouces six lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête , la partie supérieure du col , la partie inférieure du dos , le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont cendrées. Quelques-unes ont le sommet de la tête varié de taches noirâtres. La partie supérieure du dos , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un brun - roussâtre. La gorge est blanche. La partie inférieure du col , la poitrine & les côtés sont roussâtres & variés de taches noirâtres , situées au milieu de chaque plume. Le ventre , les jambes & les

Ad *Turdi majoris* crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices æquat , & ad extremos ungues octo pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem longum est ; cauda tres pollices cum novem lineis ; pes quindecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duodecim cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus laterales nonnihil longitudine superat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quindecim pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ mediani caudæ longitudinem attingunt. Caput , pars colli superior , dorsum infimum , uropygium & tectrices caudæ superiores sunt cinereæ. In quibusdam hujus speciei individuis summum caput maculis nigricantibus variegatur. Dorsi suprema pars , scapulares pennæ , alarumque tectrices superiores sunt fusco - rufescentes. Guttur candicat. Pars colli inferior , pectus & latera rufescunt , & maculis nigricantibus , uniuscujusque pennæ medium

diu occupantibus, variegantur. Venter, crura & tectrices caudæ inferiores albescentes. Pennæ caudam subtus cooperientes concolores, maculis cinereo-fuscis variæ. Alarum remiges inferne cinereæ, superne fuscae, oris exterioribus majorum cinereo-albis, minorum fuscorufescentibus. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediae sunt superne griseo-fuscae, subtus cinereæ: laterales omnes inferne quoque cinereo tinctæ, superne verò fuscae, oris exterioribus griseo-fuscis. Circa oris angulos quidam extant pili nigri, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum flavicat, apice tamen nigricat. Pedes, unguesque fusci.

Fœmina à mare discrepat rostro obscuriore multò & minùs flavicante. Turdi Pilares automno tempore gregatim ad nos advolant, & Baccis delectantur. Ex museo Realmuriano.

couvertures du dessous de l'aile sont blanches. Celles du dessous de la queue sont de la même couleur, & variées de taches d'un cendré-brun. Les plumes des ailes sont cendrées en-dessous & brunes en-dessus: le bord extérieur des grandes est d'un gris-blanc, & celui des moyennes est d'un brun-roussâtre. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un gris-brun en-dessus & cendrées en-dessous: toutes les latérales sont en-dessous de cette dernière couleur, & en-dessus elles sont brunes & ont leur bord extérieur d'un gris-brun. Vers les coins de la bouche sont quelques poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est jaunâtre, excepté son bout, qui est noirâtre. Les pieds & les ongles sont bruns.

La femelle diffère du mâle par la couleur de son bec, qui est beaucoup plus obscure & moins jaunâtre. Les *Litornes* arrivent par troupes en automne, & se nourrissent de *Bayes*. Du cabinet de M. de Reaumur.

** A. LA LITORNE A TESTE BLANCHE.

Turdus Pilaris leucocephalus.
Tome II.

Ec

Elle ne diffère de la précédente qu'en ce qu'elle a la tête blanche, ainsi que la partie supérieure du col.

A præcedente non discrepat, nisi capite & collo superiore candidis.

B. LA LITORNE TACHETÉE.

Turdus Pilaris nævius.

Turdus Pilaris maculis lunatis variegatus. Klein. Avi. pag. 67. No. 10. Tourdelle Pie ou Grièche. Alb. Tom. II. pag. 24; avec une figure mal coloriée Pl. 36.

Les Anglois l'appellent PIED-FIELDFARE. Alb.

Elle est de la grandeur de la *Litorne*. La tête est blanche & variée de taches noires. Le col est pareillement blanc, & varié d'assez grandes taches de couleur de plomb. A la partie inférieure du col, au-dessous de la gorge, est une grande tache roussâtre, variée d'autres petites taches noires. Le dos, est d'un brun foncé. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont cendrées. La poitrine est d'un roussâtre varié de taches transversales, noires. Le ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches, & variées de taches noires, en forme de croissant; il faut cependant en excepter le milieu du ventre, qui est blanc & sans taches. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un brun foncé, bordées de blanc : quel-

Magnitudine *Turdum Pilarem* æmulatur. Caput habet candidum, maculis nigris varium; collum similiter album, majusculis maculis plumbeis variegatum; partem colli inferiorem magnâ maculâ rufescente, minutis aliis maculis nigris variegatâ, infra guttur, notatam. Dorsum saturatè fuscescit. Uropygium & caudam superne cooperiunt pennæ cinereæ. Pectus est rufescens, maculis transversis, nigris variegatum. Venter, crura & tectrices caudæ inferiores candidæ, maculis lunulatis, nigris variæ, excepto tamen medio ventre albo & immaculato. Alarum tectrices superiores saturatè fuscescunt, & marginibus donantur albis : majorum corpori viciniorum aliquot

penitùs albert. Remiges sunt quoque saturatè fuscæ, oris exterioribus candidis. Duodecim rectricibus nigris cauda conflatur. Rostrum flavicat. Pedes sunt obscurè fuscii; ungues verò nigri.

ques-unes des grandes les plus proches du corps sont tout-à-fait blanches. Les plumes des aîles sont aussi d'un brun foncé, & ont leur bord extérieur blanc. La queue est composée de douze plumes noires. Le bec est jaunâtre. Les pieds sont d'un brun sombre; & les ongles noirs.

** 6. LA ROUSSEROLLE OU ROUCHEROLLE.

Voyez Pl. XXII. Fig. 1.

Turdus superne fusco-rufescens, infernè sordidè albus; remigibus superne fuscis, oris exterioribus fusco-rufescentibus, infernè griseis; rectricibus fusco-rufescentibus. . . .

TURDUS ARUNDINACEUS.

Turdus musicus palustris, Dumetorum, Arundinum. Klein. Avi. pag. 71. N°. 36. hujus icon non satis accurata pag. 178.

Junco. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 487. maris & fœminæ icones pessimæ pag. 488.

Gesn. Avi. pag. 573.

Jonst. Avi. pag. 112. fœminæ icon ab Aldrovando mutuata Tab. 53, sub titulo, Cinchli.

Junco Aldrovandi; Cinclus Turnerii. Willugh. Ornith. pag. 99.

Raj. Syn. Avi. pag. 47. N°. 2.

Junco prima Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 223. maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. LVIII, sub titulo, Junco Avis.

Raj. Syn. Avi. pag. 113. N°. A. 7.

Passer aquaticus. Euf. Nieremb. pag. 220.

Willugh. Ornith. pag. 299.

Acotōtloquichitl, seu Passer aquaticus. Jonst. Avi. pag. 127.

Caracura. Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 575.

Jonst. Avi. pag. 150.

Halcedo vocalis, seu minor. Bellonii.

Rousserolle, seu Roucherolle Gallis dicta; quam Bellonius Alcyonem vocalem vocat. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 521. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 522.

Rousserolle, seu Roucherolle Gallorum. *Jonst. Avi. pag. 108. hujus icon à Bellonio mutuata Tab. 52, sub titulo, Alcedo vocalis.*

Rousserolle, seu Roucherolle Gallorum; Bellonio Alcyon vocalis. *Charlet. Exer. pag. 111. N^o. 2.*

Charlet. Onomazi. pag. 105. N^o. 2.

Rousserolle ou Halcyon vocal. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 221; avec une mauvaise figure pag. 222.*

Rousserolle; Roucherolle; Halcion vocal; nommé par aucuns Rossignol de riviere. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 51 a, dans laquelle est la même figure.*

On l'appelle en quelques endroits de France ROSSIGNOL DE RIVIERE. *Bel. Aldrov. & en d'autres, TIRE ARRACHE.*

Les Grecs l'appellent ΑΛΚΥΩΝ ΦΩΝΗΣ. *Bel.*

Les Boulonnois, PASSERE D'ACQUA. *Aldrov.*

Les Anglois, GREATER REED-SPARROW. *Willugh. Raj.*

Les Mexiquains, ACOTOTLOQUICHITL. *Nieremb. Jonst.*

Elle n'est guères plus grosse qu'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue deux pouces quatre lignes; son pied douze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes; les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Elle a dix pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout le dessus du corps, scayoir les

Crassitie *Alaudam* non multum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices æquat, & ad extremos ungues sex pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem lineas longum; cauda duos pollices cum quatuor lineis; pes duodecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmuletur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum & octo linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. In

universo corpore superiore, partibus scilicet capitis & colli superioribus, dorso, uropygio, tectricibus alarum superioribus & pennis caudam superne cooperientibus, ex fusco rufescit. Corpus inferius, guttur scilicet, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, caudæ tectrices inferiores & pennæ alas subtus tegentes, sordidè albet. Remiges sunt superne fuscæ, oris exterioribus fusco-rufescentibus, infernè verò griseæ. Caudam componunt duodecim rectrices dorso concolores. Mandibula superior fusca, inferior albida. Pedes, unguisque grisei. Habitat in locis paludosis & inter arundines, quas scandit, *Picorum* more arborum ramos scandentium. Perpetuò cantat. *Ex museo Realmuriano.*

parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun-roussâtre. Le dessous du corps, sçavoir la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle, est d'un blanc sale. Les plumes de l'aîle sont brunes en-dessus, & ont leur bord extérieur d'un brun-roussâtre; & en-dessous elles sont grises. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que le dos. La mandibule supérieure est brune, & l'inférieure blanchâtre. Les pieds & les ongles sont gris. On la trouve dans les endroits marécageux & parmi les roseaux, le long desquels elle grimpe comme les *Pics* le long des arbres. Elle chante continuellement. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 7. LA GRIVE DE LA CHINE.

Voyez Pl. XXIII. Fig. 1.

Turdus superne fusco-rufescens, infernè dilutè rufus; capite & collo fusco longitudinaliter striatis; lineolâ supra oculos candidâ; rectricibus fuscis, fusco saturatiore transversim striatis *TURDUS SINENSIS.*

On l'appelle à la Chine HOAMY.

Elle est un peu moins grosse que le *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue trois pouces six lignes; son pied un pouce cinq lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce; les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Elle a onze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne passent guères le tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun tirant sur le roux. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de l'aile & celles du dessous de la queue sont d'un roux clair. La tête & le col sont rayés longitudinalement de brun; c'est-à-dire, que chaque plume est brune dans son milieu & selon sa longueur. Il y a une petite ligne blanche

Turdo Iliaco paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & novem lineas æquat; & ad extremos ungues octo tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem longum est; cauda tres pollices & sex lineas; pes unum pollicem cum quinque lineis; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duodecim lineas: laterales paulo sunt breviores; & posticus cum anticorum extimo longitudine convenit. Alis expansis, extremitates majorum remigum undecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ultra tertiam longitudinis caudæ partem non multum extenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, tectrices alarum superiores & pennæ caudam superne tegentes ex fusco rufescunt. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, alarum tectrices inferiores & pennæ caudam subtus cooperientes sunt dilute rufæ. Lineolæ longitudinales, fuscae caput & collum variegant; unaquæque scilicet pennam in me-

dio longitudinaliter fusca est. In utroque capitis latere lineola extat supra oculos candida. Remiges majores & minores in latere exteriori dorso concolores, in interiori fusca. Caudam componunt duodecim rectrices fusca, quæ attentè intuiti fusco saturatiore transversim striata videntur; striæ autem istæ magis apparent in parte pennæ inferiori quàm in superiore. Rostrum, pedes, unguisque flavicant. Hæc est fœminæ descriptio: marem non novi. Habitat in *Sinensi* regione, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Poivre*.

de chaque côté par-dessus les yeux. Les grandes & les moyennes plumes des ailes ont leurs barbes extérieures de la même couleur que le dos, & leurs barbes intérieures brunes. La queue est composée de douze plumes brunes, qui, lorsqu'on les regarde attentivement, paroissent rayées transversalement d'un brun plus foncé. Cette rayure est plus apparente à la partie inférieure de la plume qu'à la supérieure. Le bec, les pieds & les ongles sont jaunâtres. Celle que je viens de décrire est une femelle: je ne connois pas le mâle. On la trouve à la *Chine*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

8. LA GRIVE DE LA CAROLINE.

Turdus superne rufus, infernè sordidè albus, maculis fuscis varius; lineolâ duplici in alis sordidè albâ; remigibus interioriùs obscurè fuscis; rectricibus rufis . . . TURDUS CAROLINENSIS.

Turdus rufus. Klein. Avi. pag. 69. N°. 19.

Grive rousse. *Catesb. Tom. I. pag. 28; avec une figure exacte Pl. 28.*

Les Anglois l'appellent FOX COLOURED THRUSH. *Catesb.*

Les Anglois de la Virginie, FRENCH MOCK-BIRD. *Catesb.*

Crassitie *Turdellam* circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim circiter pollices explet, & ad extremos unguis novem pollices

Elle est à peu près de la grosseur de la *Tourdelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf

pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long ; sa queue quatre pouces une ligne ; son pied quinze lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes : les latéraux sont beaucoup plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, les petites du dessus des aîles & les plumes scapulaires sont rousses. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale, varié de taches brunes. Les grandes & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont rousses & terminées de blanc sale ; ce qui forme sur chaque aîle deux petites lignes transversales, de cette couleur. Les plumes des aîles sont rousses du côté extérieur, & d'un brun obscur du côté intérieur. Celles de la queue sont tout-à-fait rousses.

cum totidem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est ; cauda quatuor pollices cum linea una ; pes quindecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas : laterales multò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ rufæ. Alarum rectrices superiores minores, scapulares pennæ, quæque caudam superne cooperiunt, concolores. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores fordidè albent, maculisque variegantur fuscis. Alarum rectrices superiores majores & mediæ sunt rufæ, apicibus fordidè albis ; quibus lineola duplex, transversa, concolor in utraque ala efficitur. Remiges in latere exteriori rufæ, in latere interiori obscurè fusæ. Rectrices penitus rufæ. Oculorum irides luteæ. Rostrum nigricans. Pedes, unguesque fusci. Habitat

bitat in *Carolina & Virginia*,

L'iris des yeux est jaune. Le bec est noirâtre. Les pieds & les ongles sont bruns. On la trouve à *la Caroline & à la Virginie*.

** 9. LA GRIVE DE CANADA.

Turdus superne fuscus, ad olivaceum vergens, infernè rufus, apicibus pennarum albidis; gutture albo, maculis longitudinalibus, fuscis vario; rectricibus nigricantibus, oris exterioribus fuscis, ad olivaceum inclinantibus; rectrice extremâ apice interiùs albâ TURDUS CANADENSIS.

Turdus musicus Carolinensis. Klein. Av. pag. 68. N°. 17.

Grive brune de passage. *Catesb. Tom. I. pag. 29; avec une figure assez exacte Pl. 29.*

Les Anglois l'appellent *FIELDFARE OF CAROLINA. Catesb.*

Turdum majorem nostram crassitie circiter æquat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim lineas longum est; cauda tres pollices & decem lineas; pes quindecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duodecim cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales longitudine æmuletur. Alis expansis, extremitates majorum remigum qua-

Tome II.

Elle est à peu près de la même grosseur que *notre grosse Grive*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes de long; sa queue trois pouces dix lignes; son pied quinze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, douze lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que ces derniers. Elle a quatorze pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lors-

F f

qu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure & les côtés de la tête sont couverts de plumes noirâtres, bordées d'un brun tirant sur l'olive. De chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, est une petite tache blanche. Le tour des yeux est de la même couleur. Le derrière de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun tirant sur l'olivâtre. La gorge est blanche & variée de taches longitudinales, brunes. La partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont couverts de plumes rousses, terminées de blanchâtre. Les couvertures du dessous de l'aile sont tout-à-fait rousses. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont variées de blanc & de brun tirant sur l'olivâtre. Les plumes des ailes sont brunes : le bord extérieur des quatre premières est blanchâtre, & celui des autres est d'un brun tirant sur l'olivâtre. La queue est composée de douze plumes noirâtres, dont le bord extérieur est d'un brun tirant sur

tuordecim pollicum & octo linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Partem superiorem & latera capitis vestiunt pennæ nigricantes, marginibus donatæ fuscis, ad olivaceum inclinantibus. In utroque capitis latere, rostrum inter & oculum, exigua adest macula candida. Oculorum ambitus albus. Capitis posterior pars, collum superius, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, quæ alas superne cooperiunt, tectricesque caudæ superiores ex fusco ad olivaceum vergunt. Guttur album maculæ longitudinales, fuscae variegant. Pars colli inferior, pectus, venter supremus & latera pennis vestiuntur rufis, apicibus albidis. Quæ alas subtus obtegunt, sunt penitus rufæ. Venter imus, crura & caudæ tectrices inferiores ex albo & fusco ad olivaceum vergente variegantur. Alarum remiges fuscae, oris exterioribus quatuor priorum albidis, reliquarum ex fusco ad olivaceum inclinantibus. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, oris præditæ exterioribus fuscis, ad

olivaceum inclinantibus : re-
 trix utrinque extrema apice
 interius albet. Rostrum fus-
 cum, attamen basi flavicans.
 Pedes, unguisque fusci. Ha-
 bitat in *Virginia, Carolina,*
Marilandia & Canada, un-
 de in *museum Realmurianum*
 missus est à *D. Comite de la*
Galiffonniere, & *D. Gau-*
tier.

l'olivâtre : la plus extérieure
 de chaque côté est terminée
 de blanc, mais du côté in-
 térieur seulement. Le bec est
 brun, excepté sa base, qui est
 jaunâtre. Les pieds & les on-
 gles sont bruns. On la trouve à
la Virginie, à la Caroline, à
Mariland & en Canada, d'où
 elle a été envoyée à *M. de*
Reaumur par *M. le Comte de la*
Galiffonniere & par *M. Gau-*
tier.

* * 10. LE MERLE.

Turdus in toto corpore niger; rostro flavo. (*Mas*).

Turdus fuscus; pectore fusco-rufescente; gutture griseo;
 fusco & rufescente vario. (*Fœmina*) . . . MERULA.

Turdus ater, rostro palpebrisque fulvis. *Faun. Suec. Linn. N°. 184.*

Turdus ater, rostro & pupillis flavis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXII.*
sp. 6.

Turdus niger. Klein. Avi. pag. 66. N°. 5.

Turdus, aut *Merula. Frisch. maris & fœminæ icones accuratæ Tab. 29.*

Merula. Gesn. Avi. pag. 602. hujus icon satis accurata pag. 603.

Gesn. icon. Avi. pag. 32, in qua eadem icon.

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 602. icones non satis accuratæ, maris pag.
604, & fœminæ pag. 605.

Jonst. Avi. pag. 73. hujus icon satis accurata Tab. 40; & insuper maris
& fœminæ icones ab Aldrovando mutuata Tab. 39.

Charlet. Exer. pag. 90. N°. II.

Charlet. Onomazt. pag. 83. N°. II.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 287.

Merula nigra. Schwenck. Avi. Sil. pag. 300.

Bell. Obs. pag. 17.

Merula vulgaris. Willugh. Ornith. pag. 140. hujus icon ab Aldrovando
mutuata Tab. XXXVI; & insuper altera icon à Jonstano mutuata
Tab. XXXVII.

Raj. Syn. Avi. pag. 65. N°. A. 1.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 73. sp. 2.

Merula vulgaris, seu *Merula nigra* Schwenckfeldii; *Nigretus* Gesneri.

Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 394.

Merla. Olina. pag. 29, in qua icon satis accurata.

Merle. Alb. Tom. I. pag. 32; avec une figure mal coloriée Pl. 37.

Merle noir. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 320, dans laquelle il y a une mauvaise figure.

Merle; Merle noir. Bel. Portr. d'Ois. pag. 80 b, dans laquelle est la même figure.

Les Grecs l'appellent Κόττιφος. Bel. Schwenck. Jonst. Κόσσυφος. Bell. Aldrov. Schwenck. Κόσσυφος. Jonst. Raj. Charlet. Κόττυφος. Aldrov. Κότζυφος. Gesn. Κοψικος. Gesn. Aldrov. Schwenck. Κίψυχος. Jonst. Κοττύφος μελας; Κοσσύφος μελας. Bell.

Les Grecs modernes, Κοττιφος. Bel. Aldrov.

Les Turcs, FELVEK. Gesn. ou EELVEK. Aldrov.

Les Espagnols, MIERLA. Gesn. Aldrov.

Les Portugais, MELROA. Gesn. Aldrov.

Les Italiens, MERLO. Bel. Gesn. Aldrov. MERLO NEGRO. Bel. MERULO. Bel. Gesn. MERLA. Olina.

Les Allemands, AMSEL. Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. SCHWARTZ-AMSEL. Schwenck. SCHWARTZE-AMSEL. Frisch. SCHWARTZER-AMSEL. Rzac.

Les Bas Allemands aux environs de Cologne, MERL. Gesn. Aldrov. MEERLE. Schwenck.

Les Flamands, MERLAER; MEEREL. Gesn. Aldrov.

Les Hollandois, LYSTER. Gesn. Aldrov.

Les Illyriens, KOS. Gesn. Aldrov.

Les Polonois, KOS. Rzac.

Les Suédois, TRAST; KOHL-TRAST. Linn.

Les Anglois, BLACK-BIRD. Gesn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb. BLACK-OSSEL. Gesn. Aldrov. BLACK-OUSLE. Charlet.

Il est à peu près de la grosseur de la grosse Grive. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue quatre pouces une ligne; son pied quinze lignes; &

Turdum majorem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim lineas longum est; cauda quatuor pollices cum linea una; pes quindecim li-

neus; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Per universum corpus pennis vestitur nigris. Alæ octodecim conflatur remigibus concoloribus, quarum quarta omnium est longissima. Caudam componunt duodecim rectrices similiter nigrae, omnes longitudine æquales, exceptâ utrinque extimâ decem intermediis nonnihil breviores. Rostrum flavum. Oris habet angulos, sicut & palatum, quoque flavos. Pedes, unguisque sunt nigri.

Fœmina à mare colore discrepat. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, venter imus, latera, crura, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, & caudæ rectrices superiores & inferiores sunt fusca. Guttur ex griseo, fusco & rufescente variegatur. Pars colli inferior, pectus & venter su-

celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a quatorze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes noires. L'aîle est composée de dix-huit plumes de la même couleur, dont la quatrième est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes pareillement noires, toutes de la même longueur, excepté la plus extérieure de chaque côté, qui est un peu plus courte que les dix du milieu. Le bec est jaune. Les coins de la bouche & le palais sont de la même couleur. Les pieds & les ongles sont noirs.

La femelle diffère du mâle par sa couleur. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, le bas-ventre, les côtés, les jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont brunes. La gorge est variée de gris, de brun & de roussâtre. La partie inférieure du

col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un brun mêlé d'une légère teinte de roussâtre. Les couvertures du dessous de l'aîle sont variées de gris & de brun. Les plumes des aîles & celles de la queue sont brunes. Le bec est noirâtre. Les coins de la bouche & le palais sont jaunes. Les pieds & les ongles sont bruns. Elle pond quatre ou cinq œufs à chaque couvée. Son mâle chante fort bien. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

premus fuscescunt, cum aliqua rufescentis mixtura. Alarum teñtrices inferiores sunt griseo & fusco variæ. Remiges & rectrices fuscæ. Rostrum nigricans. Oris anguli, sicut & palatum, lutei. Pedes, unguisque fusci. Quatuor aut quinque ova unâ vice ponit. Mas egregiè sibilat. *Ex museo Realmuriano.*

A. LE MERLE A TESTE BLANCHE.

Merula leucocephalos.

Merula leucocephalos. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 606, in qua hujus icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 73.

Merula leucocephalus. Charlet. Exer. pag. 90. N°. 1.

Charlet. Onomazt. pag. 84. N°. 1.

Les Anglois l'appellent WHITE-HEADED OUSLE. Charlet.

Il est de la grandeur du précédent. Sa tête est blanche, & marquée de chaque côté de trois taches oblongues, noires, placées derrière les yeux. Tout le reste de son corps, ainsi que sa queue, est d'un très-beau noir. Ses aîles, sont noires, & marquées de taches blanches; quelques-unes des plumes sont même entièrement blanches. L'iris des yeux est jaune. Le bec & les pieds sont de la même couleur.

Magnitudine præcedentem æmulatur. Caput habet, præter tres maculas oblongas, nigras, quæ retro oculos conspiciuntur, prorsus candidum. Totum corpus aterrimo colore tinctum, sicut & cauda. Alæ quoque atræ sunt, sed albo maculantur; aliquot etiam ex pennis remigibus prorsus candidæ sunt. Oculorum irides luteæ. Rostrum, pedesque concolores.

** B. LE MERLE VARIÉ.

Merula varia.

Merula varia. Schwenck. Avi. Sil. pag. 301.

Merula alba & nigra. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 607. icones non satis accuratæ, maris pag. 607, & fœminæ pag. 608.

Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 39.

Merula albo & nigro colore varia. Willugh. Ornith. pag. 140.

Turdus niger. Klein. Avi. pag. 68. N°. 16.

Merle-Pie. Alb. Tom. II. pag. 25 ; avec une figure mal coloriée Pl. 37.

Les Allemands l'appellent WEISGESCHECKTE-AMSEL. Schwenck.

Les Anglois, PIED BLACK-BIRD. Alb.

A *Merula vulgari* differt colore in toto corpore ex albo & nigro variegato : nigredo verò in fœmina longè minùs quàm in mare intenditur. Quædam sunt in universo corpore nigræ, præter alarum remiges majores & rectrices, quæ nivei sunt candoris. Aliæ caput habent, collum & pectus alba, quam albedinem maculæ transversæ, nigræ in summo capite & collo superiore, & maculæ longitudinales, nigræ in collo inferiore & pectore variegant; in reliquo corpore nigræ sunt, exceptis quatuor in utraque ala maculis candidis, tectrices variegantibus. *Ex museo Realmuriano.*

Il diffère du *Merle ordinaire* par sa couleur, qui est variée par tout le corps de blanc & de noir : cette dernière couleur est beaucoup moins foncée dans la *femelle* que dans le *mâle*. Il y en a qui sont noirs par tout le corps, excepté les grandes plumes des aîles & celles de la queue, qui sont d'un blanc de neige. D'autres ont la tête, le col & la poitrine d'un blanc varié de taches noires, transversales sur le sommet de la tête & la partie supérieure du col, & longitudinales sur la partie inférieure du col & la poitrine; le reste du corps est noir, excepté quatre taches blanches, placées sur les couvertures de chacune des aîles. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** C. LE MERLE BLANC.

Merula candida.

Merula candida. Aldrov. *Avi. Tom. II. pag. 609, in qua hujus icon minimè accurata.*

Schwenck. Avi. Sil. pag. 301.

Charlet. Exer. pag. 90. N^o. 2.

Merula candida tota. Jonst. *Avi. pag. 74.*

Merula alba. Bell. *Obs. pag. 17.*

Merula colore albo. Willugh. *Ornith. pag. 140.*

Merle blanc. Bel. *Hist. nat. des Ois. pag. 317.*

Les Grecs l'appellent κόττιρος ἐκλευκος. Bel. *Schwenck.*

Les Allemands, WEISSE-AMSEL. *Schwenck.*

Il diffère des précédens en ce qu'il est entièrement couvert de plumes blanches. Son bec & ses pieds sont de la même couleur. Quelques-uns cependant ont le bec roux ; & les pieds jaunes. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

A præcedentibus discrepat colore in toto corpore albo. Rostrum quoque & pedes alben. Quibusdam rostrum rutilum est ; pedes verò lutescunt. *Ex museo Realmuriano.*

** II. LE MERLE DE MONTAGNE.

Voyez Pl. XXI. Fig. 1.

Turdus fusco-nigricans, marginibus pennarum griseis ; tæniâ supra pectus transversâ, ad rufum vergente ; rectricibus nigricantibus *MERULA MONTANA.*

Turdus nigricans, rostro flavescente, torque fusco. *Faun. Suec. Linn. N^o. 186.*

Turdus subcastaneus montanus. Barr. *Ornith. Class. III. Gen. XXXII. sp. 8.*

Merula montana. Linn. *Systh. Nat. ed. 6. Gen. 73. sp. 4.*

Merula montana Germanorum. Aldrov. *Avi. Tom. II. pag. 620.*

Jonst. Avi. pag. 75.

Charlet. Exer. pag. 90. N^o. 3.

Charlet. Onomast. pag. 84. N^o. 3.

Merula

Merula montana Aldrovandi, *saxatilis*, seu *montana* Gesneri. *Willugh.*

Ornith. pag. 144.

Merula saxatilis. *Raj. Syn. Avi. pag. 65. N°. A. 3.*

Merula Alpina. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 301.*

Merula Alpina Schwenckfeldii; *Merula montana* Germanorum Aldrovandi. *Rzac. Auç. Hist. nat. Pol. pag. 394.*

Merula tertii generis. *Gesn. Avi. pag. 604.*

Merulæ congener. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 625. hujus icon minùs accurata pag. 624.*

Jonst. Avi. pag. 76. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 39.

Merulæ congener Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 144. N°. 2.*

Raj. Syn. Avi. pag. 67. N°. 12.

Les Grecs l'appellent Φαλός Κέρλυφος. *Schwenck.*

Les Allemands, BIRCK-AMSEL. *Gesn. BIRCH-AMSEL. Aldrov. BIRG-AMSEL. Schwenck. BERG-AMSEL. Rzac. BERG-AMZELL. Willugh. STEIN-AMSEL; HAG-AMSEL. Schwenck. Rzac.*

Les Suisses, BIRG-AMSZLEN; HAG-AMSZLEN. *Gesn. Aldrov.*

Les Anglois, ROCK-OUZEL. *Willugh. Raj.*

Crassitie *Merulam vulgarem* æmulatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices æquat, & ad extremos unguis octo pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem longum est; cauda tres pollices & novem lineas; pes quatuordecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum intimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longi-

Tome II.

Il est de la grosseur du *Merle ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue trois pouces neuf lignes; son pied quatorze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a quatorze pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge,

Gg

le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue, les petites du dessus des aîles, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un brun-noirâtre varié de gris; de sorte que chaque plume est brune & tous ses bords sont gris : cette dernière couleur est plus claire dans le dessous du corps que dans le dessus. Il y a plus de gris à la gorge que par-tout ailleurs. A la partie inférieure du col, vers la poitrine, est une bande transversale, qui tire un peu vers le roux, & qui forme comme une espece de collier; c'est ce qui a fait croire que cette espece pouvoit être la même que le *Merle à collier*. Les plumes qui recouvrent la queue en-dessous sont brunes, & ont leur milieu & leurs bords blancs. Les plumes de l'aîle, ainsi que ses plus grandes couvertures, sont d'un brun-noirâtre, & ont leur bord extérieur blanchâtre. Celles de la queue sont tout-à-fait noirâtres. Le bec est noirâtre. Les pieds & les ongles sont bruns.

On le trouve sur les montagnes. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

tudinem attingunt. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ fusco-nigricantes, marginibus griseis præditæ : scapulares pennæ, quæ caudam superne cooperiunt, alarumque tectrices superiores minores concolores : griseus autem color in corpore inferiore quàm in superiore dilutior est, & majus in gutture spatium occupât. In collo inferiore, versùs pectus, tænia extat transversa, nonnihil ad rufum vergens, & torquem quodammodo efficiens; unde species ista eadem ac *Merula torquata* quibusdam visa fuit. Caudæ tectrices inferiores fuscescunt, ipsarum medio & marginibus albis. Alarum tectrices superiores majores, sicut & remiges, ex fusco nigricant, oris exterioribus albidis. Rectrices sunt penitus nigricantes. Rostrum nigricans. Pedes, unguesque fusci. Habitat in montibus. *Ex museo Realmuriano.*

Turdus fusco-nigricans, marginibus pennarum in corpore superiore griseis, in inferiore albidis; tæniâ supra pectus transversâ, albâ; rectricibus nigricantibus, oris extimæ griseis . . . MERULA TORQUATA.

Turdus nigricans, rostro flavescente, torque albo. *Faun. Suec. Linn.* N°. 185.

Turdus torquatus. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXII. sp. 10.*
Klein. Avi. pag. 66. N°. 6.

Merula torquata. *Gesn. Avi. pag. 607*, in qua hujus icon non satis accurata.

Gesn. icon. Avi. pag. 33, in qua eadem icon.

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 620. icones minùs accuratæ, maris pag. 621, & fæminæ pag. 622.

Bell. Obs. pag. 17.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 302.

Jonst. Avi. pag. 75. maris & fæminæ icones ab Aldrovando mutuatae Tab. 39; & insuper altera icon à Gesnero mutuata eâdem Tab. sub titulo, Merula.

Willugh. Ornith. pag. 143. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXVII.

Raj. Syn. Avi. pag. 65. N°. A. 2.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.

Frisch. maris & fæminæ icones accuratæ Tab. 30.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 73. sp. 3.

Merula torquata, seu *Merula montana*. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 394.*

Merula fusca Eberi. Klein.

Merle à collier. Alb. Tom. I. pag. 33; avec une figure mal coloriée Pl. 39.

Merle au collier. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 318, dans laquelle il y a une mauvaise figure.

Bel. Portr. d'Ois. pag. 79 b, dans laquelle est la même figure.

Les Grecs l'appellent Βαϊός. Bel. Βαϊός Κόττινος. Schwenck.

Les Italiens, MERULO ALPESTRO. Bel. Gesn.

Les Allemands, RING-AMSEL. Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. RINGEL-AMSEL. Frisch. ROSZ-AMSEL. Gesn. Aldrov. Schwenck. WALD-AMSEL; STEIN-AMSEL; BIRG-AMSEL; KURER-AMSEL. Gesn. Aldrov. SCHNEE-AMSEL. Schwenck. Rzac. MEER-AMSEL. Schwenck.

Les Frisons, KRAMETS-MERLE. Gesn.

Les Anglois, RING-AMZEL; RING-OUZEL. Willugh. Raj. RING-OUZELL. Alb.

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue quatre pouces quatre lignes; son pied quinze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant: l'intérieur est le plus court de tous. Il a seize pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes d'un brun-noirâtre, bordées de gris. Les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont de la même couleur. Celles qui couvrent la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes, ainsi que les couvertures du dessous de la queue, sont pareillement d'un brun-noirâtre, & bordées de blanchâtre. Au-dessus de la poi-

Præcedentem crassitie non-nihil antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat, & ad extremos ungues novem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim lineas longum est; cauda quatuor pollices cum totidem lineis; pes quindecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur: intimus autem omnium brevissimus. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ fusco-nigricantes, marginibus donatæ griseis. Tectrices caudæ superiores & scapulares pennæ concolores. Quæ guttur, collum inferius, pectus, ventrem, latera & crura obtegunt, sicut & tectrices caudæ inferiores, ex fusco pariter nigricant, marginibus albidis. Supra pectus lata extat tænia transf-

versa, alba, quæ torquem quodammodo efficit. Alarum tectrices superiores sunt fusca, marginibus cinereo-albis : inferiores dilutiùs fusca, ad cinereum vergentes, marginibus quoque cinereo-albis. Alam componunt octodecim remiges superne fusca, infernè cinerea, oris exterioribus cinereo-albis. Cauda duodecim constat re-
 tricibus nigricantibus, quarum utrinque extrema stric-
 tissimâ margine donatur gri-
 seâ : omnes sunt longitudine
 æquales, exceptâ utrinque
 extimâ decem intermediis
 nonnihil brevior. Oculo-
 rum irides obscurè avella-
 neæ. Rostrum fusco-nigri-
 cans, basi tamen mandibu-
 læ inferioris albidâ. Oris an-
 guli, sicut & palatum, lu-
 tei. Pedes, unguisque fusci.

coins de la bouche & le palais sont jaunes. Les pieds & les ongles sont bruns.

Fœmina à mare differt tor-
 que albo multò minùs appa-
 rente.

In *Alpibus* frequens. Ha-
 bitat quoque in montibus
Angliæ septentrionalibus,
 sicut & in montibus *Der-*
bienfibus, & *Eboracensibus*.

trine il y a une large bande
 transversale, blanche, qui for-
 me une espece de collier. Les
 couvertures du dessus des ailes
 sont brunes, & bordées de gris-
 blanc : celles du dessous sont
 d'un brun plus clair, tirant sur
 le cendré, & bordées aussi de
 gris-blanc. L'aile est composée
 de dix-huit plumes brunes en-
 dessus, cendrées en-dessous,
 & dont le bord extérieur est
 gris-blanc. La queue est com-
 posée de douze plumes noirâ-
 tres, dont la plus extérieure de
 chaque côté est bordée fort
 étroitement de gris : elles sont
 toutes d'égale longueur, ex-
 cepté la plus extérieure de cha-
 que côté, qui est un peu plus
 courte que les dix du milieu.
 L'iris des yeux est d'une cou-
 leur de noisette obscure. Le
 bec est d'un brun-noirâtre, ex-
 cepté la bête du demi-bec in-
 férieur, qui est blanchâtre. Les

La femelle diffère du mâle
 en ce que son collier blanc est
 très-peu apparent.

Il est très-commun sur les
Alpes. On le trouve aussi sur les
 montagnes de la partie septen-
 trionale de l'*Angleterre*, com-
 me sur celles des Provinces de
Derby & d'*Yorck*.

** 13. LE MERLE DE ROCHE.

Turdus è nigricante , fusco & rufescente varius ; capite & collo saturatè cinereis , rufescente maculatis ; rectricibus lateralibus rufis , exteriùs versùs apicem nigricante mixtis ; rectrice extimâ exteriùs nigricante MERULA SAXATILIS.

Turdus rectricibus rufis , duabus intermediis cinereis , fasciâ nigricante , proximâ apice cinereâ. *Faun. Suec. Linn. N°. 187.*

Turdus , five Merula saxatilis. *Klein. Avi. pag. 70. N°. 32.*

Merula saxatilis. *Charlet. Exer. pag. 90. N°. 4.*

Charlet. Onomazt. pag. 84. N°. 4.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 73. sp. 5.

Merula saxatilis Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 145. hujus icon ab Olina mutuata Tab. XXXVI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 68. N°. 3.

Rubecula , vel potiùs Merula saxatilis. *Gesn. icon. Avi. pag. 34 , in qua icon non satis accurata.*

Rubecula saxatilis. *Gesn. Avi. pag. 732 , in qua eadem icon.*

Codirosso maggiore. *Olina. pag. 47 , in qua icon non satis accurata.*

Grande Rouge-queue. *Alb. Tom. III. pag. 23 ; avec une figure mal coloriée Pl. 55.*

Les Grecs l'appellent ΠΕΤΡΟΧΟΣΣΟΥΡΟΣ. *Gesn.*

Les Italiens , COROSSOLO. *Gesn. CODIROSSO MAGGIORE. Olina.*

Les Italiens aux environs de Belinzona , CROSSERON. *Gesn.*

Les Florentins , TORDO MARINO. *Willugh. Raj.*

Les Allemands , STEIN-ROETELE ; STEIN-TROESTEL. *Gesn.*

Les Autrichiens , STEIN-REITLING. *Willugh.*

Les Suédois , LAPPSKATA ; OLYCKS-FOGEL. *Linn.*

Les Anglois , GREATER RED START. *Alb.*

Il est un peu moins gros que le Merle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces neuf lignes , & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long ; sa

Merulæ nonnihil crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & novem lineas æquat , & ad extremos ungues septem pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuordecim



Martinet Del. et Sculp.

1. Mauvis.

2. Merle hupé du Cap de Bonne Espérance.



Fig. 1.

Fig. 2.

Martinet del. et Sculp.

1. Merle de Montagne.

2. Petit Merle hupé de la Chine.



Designé et Gravé par Martinet

1. Rousserolle ou Roucherolle .

2. Merle du Sénégal .

3. Merle olive du Cap de Bonne Espérance .





Fig. 1.

Fig. 2.

Martinet Del. et Sculp.

1. Grive de la Chine.

2. Merle du Cap de Bonne Espérance.



Mortinet del. et sculp.

1. Merle de Canada . 2. Merle doré de Madagascar . 3. Merle de l'Isle de Bourbon.



Donné et Gravé par Martinet

1. Merle de Madagascar. 2. Merle cendré de Madagascar. 3. Merle cendré des Indes.



Martinet del. et Sculp.

1. Merle des Philippines.

2. Merle chauve des Philippines.



Designé et Gravé par Martinet

1. Merle de S.^t Domingue.

2. Merle olive de S.^t Domingue.

3. Merle brun du Cap de bonne Espérance.



Fig. 1.

Fig. 2.

Martinet del. et Sulp.

1. Solitaire des Philippines.

2. Mainate.





Desmés et Gravé par Martinet.

1 Palmiste . 2. Palmiste à Tête noire : 3. Pié-grièche rayée de Cayenne .



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Merle à collier du Cap de bonne Espérance.

2. Merle verd d'Angola.



Martinet del. et Sculp.

1. Merle verd à longue queue du Sénégal.

2. Merle Olive des Indes.

3. Merle des Indes.



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Merle verd des Moluques.

2. Merle verd à tête noire des Moluques.



Martinet del. et Sculp.

1. L'oriot de la Cochinchine.

2. Solitaire de Manille.

lineas longum est ; cauda duos pollices & novem lineas ; pes quatuordecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis expansis , extremitates majorum remigum duodecim pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad duas ferè tertias longitudinis caudæ partes protenduntur. Caput , guttur & collum sunt saturatè cinerea aut cinereo-nigricantia , minutis maculis rufescentibus variegata. Dorsum , uropygium , scapulares pennæ , alarum rectrices superiores minores , pectus , venter , latera & crura nigricante , fusco & rufescente variegantur , apicibus penarum rufescentibus. Caudæ rectrices superiores & inferiores & pennæ alas subtus cooperientes sunt rufæ & immaculatæ. Alarum rectrices superiores majores nigricantes , marginibus rufescentibus. Remiges pariter nigricant , orisque donantur exterioribus rufescentibus. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediae ni-

queue deux pouces neuf lignes ; son pied quatorze lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , treize lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a douze pouces six lignes de vol ; & ses ailes lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête , la gorge & le col sont d'un cendré très-foncé ou noirâtre , varié de petites taches roussâtres. Le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les petites couvertures du dessus des ailes , la poitrine , le ventre , les côtés & les jambes sont variées de noirâtre , de brun & de roussâtre , cette dernière couleur terminant chaque plume. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont rousses & sans taches. Les grandes du dessus des ailes sont noirâtres , & bordées de roussâtre. Les plumes des ailes sont pareillement noirâtres , & ont leur bord extérieur roussâtre. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noirâtres ; leurs bords tirent un peu sur le roux : les latérales sont rousses , avec un

peu de noirâtre mêlé sur le côté extérieur vers le bout : & la plus extérieure de chaque côté est noirâtre du côté extérieur & rousse du côté intérieur. Les coins de la bouche & le palais sont jaunes. Le bec & les ongles sont noirâtres ; & les pieds sont d'une couleur de plomb. On le trouve sur les montagnes, où il fait son nid. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

gricantes, marginibus non-nihil ad rufum inclinantibus : laterales rufæ, cum pauco nigricante in latere exteriori versùs apicem admixto : utrinque autem extrema in latere exteriori nigricans, in interiori rufa. Oris anguli, sicut & palatum, lutei sunt. Rostrum, unguæque nigricantes ; pedes verò plumbeo colore tincti. Habitat in montibus, in quibus nidificat. *Ex museo Reaumuriano.*

** 14. LE PETIT MERLE DE ROCHE.

Turdus superne è nigricante, cinereo - cœrulescente, rufescente & albo varius, infernè rufus, fusco & albicante maculatus ; capite & collo cinereo-cœrulescentibus, è fusco & rufescente maculatis ; rectricibus lateralibus rufis, oris exterioribus versùs pennæ apicem fuscis *MERULA SAXATILIS MINOR.*

Turdus ruber, cyaneo capite. *Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 32.*

Klein. Avi. pag. 67. N^o. 8.

Les Allemands l'appellent BLAU-KOPFIGE ROTHE AMSEL. Frisch.

Il n'est pas plus gros qu'un *Etourneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long ; sa queue deux

Crassitie Sturnum non antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem longum

gum est; cauda duos pollices cum quatuor lineis; pes undecim cum semi lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue duodecim lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus laterales longitudine paululùm excedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, guttur & collum sunt cinereo-cœrulescentia, minutis maculis fuscis & rufescentibus variegata, apicibus scilicet pennarum fuscis & rufescentibus. Dorsum supremum & uropygium nigricante, cinereo-cœrulescente & rufescente variegantur. Dorsum infimum albo & cinereo varium. Pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ rufæ, minutis maculis fuscis & albicantibus variæ, apicibus scilicet pennarum fuscis & albicantibus. Pennæ concolores caudam subtus obtegunt. Tectrices caudæ superiores & alarum inferiores sunt rufæ & immaculatæ. Pennæ alas superne cooperientes nigricantes, apicibus rufescentibus. Remiges

pouces quatre lignes; son pied onze lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, douze lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Il a treize pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge & le col sont d'un cendré-bleu, varié de petites taches brunes & roussâtres, ces deux couleurs terminant chaque plume. La partie supérieure du dos & le croupion sont variés de noirâtre, de cendré-bleu & de roussâtre. La partie inférieure du dos est variée de blanc & de cendré. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont rousses, & variées de petites taches brunes & blanchâtres, ces deux couleurs terminant chaque plume. Les couvertures du dessus de la queue & celles du dessous des aîles sont rousses & sans taches. Celles du dessus de l'aîle sont noirâtres, & terminées de roussâtre. Les plumes des aîles sont brunes, leur bord extérieur est gris-brun; & les moyennes sont terminées de roussâtre. La queue est composée de douze

plumes : les deux du milieu sont brunes : les latérales sont rouffes, & leur bord extérieur est brun vers le bout de la plume seulement. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve sur les montagnes. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

fuscæ, oris exterioribus griseo-fuscis; minores insuper remiges rufescente terminatæ. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ fuscæ : laterales rufæ, oris exterioribus versùs pennæ apicem tantùm fuscis. Rostrum, pedes, unguesque nigricant. Habitat in montibus. *Ex museo Realmuriano.*

15. LE MERLE A COLLIER D'AMÉRIQUE.

Turdus superne fusco, rufescente & nigricante varius, infernè luteus; taniâ longitudinali sordidè albâ in vertice; taniâ ponè oculos longitudinali nigrâ; maculâ in pectore nigrâ, ferri equini æmulâ; rectricibus fuscis, oris exterioribus maculis rufescentibus notatis . . . MERULA AMERICANA TORQUATA.

Alauda magna. Klein. Avi. pag. 72. N^o. 6.

Grande Alouette. Catesb. Tom. 1. pag. 33; avec une figure exacte Pl. 33.

Les Anglois l'appellent LARGE LARK. Catesb.

Il est un peu plus gros que notre *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui des ongles est d'environ onze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; son pied un pouce six lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est

Craffitie Merulam nostratē nonnihil superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad unguēs extremos undecim circiter pollices æquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum; pes unum pollicem cum sex lineis; & trium digitorum anticorum mediū cum ungue quindecim lineas : laterales paulò sunt breviores; & posticus anti-

corum extimum longitudine æmulatur. Alæ complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem usque protenduntur. Partes capitis & colli superiores fuscescunt. In summo capite tania extat longitudinalis, sordidè alba, à basi mandibulæ superioris orta, & versùs occipitium usque protensa. Latera capitis & colli sunt dilutè grisea. In utroque capitis latere, narem inter & oculum, macula adest lutea; & ponè oculum tania longitudinalis, nigra, unum circiter pollicem longa. Dorsum, uropygium, scapulares pennæ, alarum tectrices superiores & pennæ caudam superne tegentes fusco, rufescente & nigricante variegantur, ad instar *nostratum Perdicum*. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter & latera pennis vestiuntur luteis. Pectus tamen majusculâ maculâ nigrâ, ferri equini æmulâ, insignitur. Crura & tectrices caudæ inferiores griseæ. Remiges majores fuscæ : minores concolores, maculis rufescentibus variæ. Cauda duodecim constat re-
 tricibus fuscis, in margine exteriori maculis rufescentibus notatis. Rostrum ni-

de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont brunes. Sur le sommet de la tête est une bande longitudinale, d'un blanc sale, qui commence à la base du demi-bec supérieur & s'étend jusque vers l'occiput. Les côtés de la tête & du col sont d'un gris clair. De chaque côté de la tête, entre la narine & l'œil, est une tache jaune; & derrière l'œil est une bande longitudinale, noire, longue d'environ un pouce. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont variées de brun, de rouffâtre & de noirâtre, à peu près comme le sont *nos Perdrix*. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les côtés sont jaunes. Il y a sur la poitrine une grande tache noire, en forme de fer à cheval. Les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont grises. Les grandes plumes des aîles sont brunes : les moyennes sont de la même couleur, & variées de taches rouffâtres. La queue est composée de douze plumes brunes;

& dont les bords extérieurs sont marqués de taches roussâtres. Le bec est noirâtre. Les pieds & les ongles sont bruns. Cet Oiseau a dans la queue un mouvement très-vif de bas en haut. Il se perche au sommet des petits arbres ou des buissons, à peu près comme *notre Traquet*. Il chante harmonieusement au printemps. Il ne se nourrit presque que de semences d'herbes. On le trouve à la *Virginie*, à la *Caroline* & dans presque tout le continent septentrional de l'*Amérique*.

gricat. Pedes, unguisque fuscescunt. A deorsum usque sursum caudam citius motuat hæc Avis. Summitatibus minorum arborum aut sepium insidet, *Rubetræ nostratis* instar. Vere egregiè cantat. Non alio ferè cibo utitur, nisi seminibus plantarum. Habitat in *Virginia*, *Carolina* & tota ferè *Americæ* septentrionali continente.

16. LE MERLE D'AMBOINE.

Turdus superne fusco-rubescens, internè dilutè flavus; remigibus fusco-rubescens, minoribus primâ medietate dilutè flavis; rectricibus superne fusco-rubescens, internè aureis . . . MERULA AMBOINENSIS.

Avicula Amboinensis canora. Seb. Vol. I. pag. 99. hujus icon accurata Tab. LXII. Fig. 4.

Il n'est guères plus gros que l'*Alouette hupée*. Il a la tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue d'un brun-rougeâtre. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune clair. Les grandes plumes des aîles sont d'un brun-rougeâtre :

Alaudam cristatam crassitie non multum superat. Caput, collum, dorsum & uropygium pennis vestiuntur fusco-rubescens. Scapulares pennæ, alarum tectrices superiores & pennæ caudam superne cooperientes concolores. Pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores sunt dilutè flavæ. Remiges majores ex fus-

co rubescunt : minores ab exortu ad mediam usque longitudinem flavo diluto tinguntur, à medietate ad apicem sunt fusco-rubescences. Caudam componunt duodecim rectrices superne fusco-rubescences, infernè aureo colore tinctæ : binæ intermediæ lateralibus sunt longiores ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Avis ista libidinosa caudam supra dorsum erigit. Egregiè cantat. Habitat in *Amboinensi Insula*.

les moyennes sont d'un jaune clair depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur longueur, & de là jusqu'à leur bout elles sont d'un brun-rougeâtre. La queue est composée de douze plumes d'un brun-rougeâtre en-dessus & d'une couleur d'or en-dessous : les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Lorsque cet Oiseau est en amour, il relève sa queue jusque sur son dos. Il chante très-bien. On le trouve à *Amboine*.

** 17. LE MERLE DE CANADA.

Voyez Pl. XXIV. Fig. 1.

Turdus nigricans, apicibus pennarum rufescentibus ; remigibus, rectricibusque penitus nigricantibus MERULA CANADENSIS.

Ad *Turdi Iliaci* crassitiem accedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices æquat, & ad extremos ungues sex pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est ; cauda tres pollices ; pes tredecim lineas ; & trium digitorum anticorum

Il est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de dix lignes ; sa queue de trois pouces ; son pied de treize lignes ; & celui du milieu des

trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, d'onze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Il a douze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à environ la moitié de la longueur de la queue. La tête, les parties supérieures du col & du dos & les couvertures du dessus des aîles sont noirâtres & variées de roux, chaque plume étant terminée de cette couleur. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des aîles, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont aussi noirâtres & variées de roussâtre, chaque plume étant de même terminée de cette couleur. Les plumes des aîles sont tout-à-fait noirâtres. Leurs couvertures, regardées dans un certain jour, paroissent d'un verd foncé & brillant. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles des aîles. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve en *Canada*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Gautier*.

medius cum ungue undecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales longitudine nonnihil antecellit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caput, partes colli & dorsi superiores & superiores alarum teñtrices sunt nigricantes, rufo variegatæ, apicibus scilicet pennarum rufis. Pars dorsi infima, uropygium, teñtrices caudæ superiores & inferiores, pennæ alas subtus tegentes, guttur, collum inferius, pectus, venter, latera & crura pariter nigricant & rufescente variegantur, apicibus scilicet pennarum rufescentibus. Remiges penitus nigricantes. Ipsarum teñtrices, secundum quamdam ad lucem obversionem, saturatè viridi splendore nitent. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Canada*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Gautier*.

** 18. LE MERLE DORÉ DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XXIV. Fig. 2.

Turdus splendidè niger, marginibus pennarum citrinis; gutture, remigibus, rectricibusque penitus nigris.... MERULA MADAGASCARIENSIS AUREA.

Les Madagascariens l'appellent SAUI-JALA.

Crassitie Alaudam circiter æmulatur. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudam extremam quinque pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum totidem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; cauda sexdecim lineas; pes undecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum novem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ duas ferè tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Capitis latera, sicut & guttur, nigro tinguntur holoserici villosi instar splendenti. Superior capitis pars, collum, dorsum, uropygium,

Il est à peu près de la grosseur d'une Alouette. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue seize lignes; son pied onze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a neuf pouces six lignes de vol; & ses ailes lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La gorge & les côtés de la tête sont d'un noir de velours. La partie supérieure de la tête, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du des-

dessus & du dessous de la queue sont du même noir, mais chaque plume est bordée d'une belle couleur de citron. Les plus petites couvertures du dessus de l'aile, seulement au pli qui répond à celui du poignet, sont jaunes & terminées d'un petit bord noir : toutes les autres couvertures du dessus de l'aile sont de la même couleur que les plumes du dos, & bordées de même d'une belle couleur de citron : celles du dessous sont noires & sans bordure. Les plumes des ailes & celles de la queue sont aussi tout-à-fait noires. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été envoyé à M. l'Abbé Aubry, qui le conserve dans son cabinet.

pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ superiores & inferiores eodem nigro imbuuntur, marginibus tamen pennarum citrinis. Alarum rectrices superiores minores, versus articulum tantum carpo humano, respondentem, luteæ sunt, margine nigrâ terminatæ : reliquæ omnes alarum rectrices superiores pennis dorsum vestientibus concolores, ipsarum pariter marginibus citrinis : rectrices alarum inferiores in totum nigræ. Remiges & rectrices similiter penitus nigræ. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Madagascaria*, unde in museum D. Aubry missa est.

** 19. LE MERLE DES INDES.

Voyez Pl. XXXI. Fig. 3.

Turdus superne niger, infernè albus; uropygio cinereo; taniâ per oculos nigrâ; remigibus nigricantibus, interiùs in exortu albis, oris exterioribus minorum albis; rectricibus nigris, tribus utrinque extimis apice albis . . . MERULA INDICA.

Les Indiens l'appellent TERAT-BOULAN.

Il n'est guères plus gros qu'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces six lignes, & jusqu'à celui des on-

Crassitie Alaudam non multum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & totidem lineas æquat,
&

& ad extremos ungues quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo cum femineas longum; cauda duos pollices cum septem lineis; pes novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Partes capitis & colli superiores & dorsum supremum vestiunt pennæ nigrae. Quæ dorsum infimum & uropygium cooperiunt, sunt cineræ. Tectrices caudæ superiores concolores. Genæ, guttur, collum in parte inferiore & ad latera, pectus, venter, latera, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus tegentes albescent. In utroque capitis latere exigua extant tania nigra, ab exortu rostri orta & per oculos ducta. Crura sunt grisea. Alarum tectrices superiores minores castaneo-nigricantes: majores concolores, marginibus

gles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes & demie de long; sa queue deux pouces sept lignes; son pied neuf lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos sont noires. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont cendrées. Les joues, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle sont blanches. Il y a de chaque côté de la tête une petite bande noire, qui commence à l'origine du bec & passe par les yeux. Les jambes sont grises. Les petites couvertures du dessus de l'aîle sont d'un marron noirâtre: les grandes sont de la même couleur & bordées de blanc. Les plumes de l'aîle sont noirâtres, excepté leur côté

intérieur, qui est blanc depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur : les moyennes ont de plus leur bord extérieur blanc. Les plumes de la queue sont noires & ont un peu de blanc à leur origine : le bout des trois plus extérieures de chaque côté est blanc ; & la quatrième n'a à son bout qu'un petit bord de cette couleur. Les six plumes du milieu sont un peu plus longues que les autres, qui sont d'autant plus courtes, qu'elles sont plus extérieures. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve aux *Indes Orientales*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

candidis. Remiges nigricantes, excepto latere interiore, ab exortu pennæ ad mediam circiter longitudinem usque albo : minores quoque in oris exterioribus albescent. Rectrices nigræ sunt, cum pauco in exortu albo : tres insuper utrinque extimæ apice albescent ; quarta verò in apice margine tantum albâ prædita est. Rectrices sex intermediæ reliquis paulò sunt longiores ; extimæ autem eò breviores sunt, quò exteriores fiunt. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque nigricantes. Habitat in *India Orientali*, unde in *musæum D. Aubry* missa.

** 20. LE MERLE COULEUR DE ROSE.

Turdus cristatus, roseus ; capite, cristâ & collo nigro-violaceis ; rectricibus ex nigro ad violaceum & viride vergentibus, lateralibus interius nigricantibus MERULA ROSEA.

Turdus roseus, capite ex nigro cœruleo, & cirro retro compto ; alis & cauda nigris, rostro ultra dimidium lutescente. *Klein. Avi. pag. 71. N° 37.*

Merula rosea, seu *Sturnus marinus*. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 626. icones non satis accuratæ, maris pag. 626, & feminae pag. 627.*

Merula rosea Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 143.

Raj. Syn. Avi. pag. 67. N° 9.

Merula rosea. Jonst. Avi. pag. 75. maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. 40.

Charlet. Exer. pag. 90. N° 5.

Charlet. Onomazt. pag. 84. N° 15.

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre V.* 252

Avis incognita. Brückm. Centur. secunda, Epist. LXI. pag. 670. hujus icon non satis accurata Tab. XXVIII.

Merle de couleur de rose ou d'incarnat. *Edwards. Tom. I. pag. XX; avec une figure très-exacte Pl. 20.*

Les Espagnols l'appellent TORDOS. Klein.

Les Italiens, STORNO MARINO. Aldrov. Jonst.

Sturnum crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim lineas longum est; cauda tres pollices; pes quatuordecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus laterales longitudine æmulatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput, guttur & collum vestiunt pennæ nigro-violaceæ. Quæ collum inferius & partem capitis superiorem obtegunt, longiores sunt & strictiores; Avis autem pennas caput superius cooperientes, cristæ in modum, erigit. Dorsum, uropygium, pectus, venter & la-

Il est à peu près de la grosseur de l'*Etourneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue trois pouces; son pied quatorze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que ces derniers. Il a treize pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge & le col sont d'un noir tirant sur le violet. Les plumes de la partie inférieure du col & celles du dessus de la tête sont longues & étroites; & l'Oiseau peut relever ces dernières en forme de hupe. Le dos, le croupion, les petites couvertures du dessus de la queue, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre

& les côtés sont d'une couleur de rose. Entre le dos & les côtés est une large bande longitudinale, d'un noir tirant sur le violet. Les jambes sont de la même couleur. Les grandes couvertures du dessus de la queue sont d'un noir tirant sur le violet & le verd : les couvertures du dessous sont noirâtres & terminées par une petite tache blanche. Celles du dessous des aîles sont d'un brun foncé & bordées de blanc : les petites du dessus sont d'un noir tirant sur le violet ; & les grandes sont d'un noir tirant sur le violet & le verd. Les grandes plumes des aîles sont brunes, excepté leur bord extérieur & leur bout, qui sont d'un noir tirant sur le violet : les moyennes sont d'un noir changeant en verd du côté extérieur, & brunes du côté intérieur ; il faut cependant en excepter les trois plus proches du corps, qui sont des deux côtés d'un noir changeant en verd. La queue est composée de douze plumes d'égale longueur : les deux du milieu sont d'un noir tirant sur le violet & le verd : toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur. Le demi-bec supérieur est couleur de chair, excepté sa

tera pennis vestiuntur roseis. Superiores caudæ rectrices minores & scapulares pennæ concolores. Dorsum inter & latera lata est tænia longitudinalis, nigro-violacea. Crura idem tingit color. Rectrices caudæ superiores majores ex nigro ad violaceum & viride vergunt : rectrices caudæ inferiores nigricant, & minutissimâ maculâ albâ terminantur. Pennæ alas subtus cooperientes sunt saturatè fuscæ, marginibus candidis : alarum rectrices superiores minores nigro-violacæ ; majores verò ex nigro ad violaceum & viride inclinantes. Remiges majores fuscæ, oris tamen exterioribus & apicibus nigro-violaceis : minores in latere exteriori nigræ, sed viridi colore variantes, in latere interiori fuscæ, exceptis tamen tribus corpori finitimis, in utroque latere nigris, viridi colore variantibus. Caudam componunt duodecim rectrices longitudine æquales : binæ intermediae ex nigro ad violaceum & viride vergunt : laterales in latere exteriori concolores, interiùs verò nigricantes. Mandibula superior colore tingitur carneo, exceptâ basi

nigrâ, sed ad latera tantum; inferior autem mandibula ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque nigra, à medietate verò ad apicem carneo colore tinâta. Pedes sunt sordidè aurantii; ungues verò nigricantes.

bâse, qui est noire par les côtés seulement; le demi-bec inférieur est noir depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur, & de-là jusqu'à son bout il est couleur de chair. Les pieds sont d'un orangé terni; & les ongles noirâtres.

Fœmina à mare discrepat coloribus non ità splendentibus. Ex museo Realmuriano.

La femelle diffère du mâle par ses couleurs, qui ne sont pas si brillantes. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

21. LE MERLE HUPÉ DE LA CHINE.

Turdus cristatus, nigricans, ad cœruleum obscurum vergens; remigibus majoribus primâ medietate albis; rectricibus lateralibus apice albis MERULA SINENSIS CRISTATA.

Sturnus crinibus cinereis, & delibutis calamistro in vallum ad frontem compositis. Klein. Avi. pag. 64. N°. 3.

Merle ou Etourneau de la Chine. Edwards. Tom. I. pag. XIX; avec une figure très-exacte Pl. 19.

Les Matelots Anglois l'appellent MARTIN. Edwards.

Crassitie Merulam nostratam paululum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices cum quinque lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est; cauda duos pollices cum sex lineis; pes quatuordecim lineas; & trium digitorum an-

Il est un peu plus gros que notre *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; son pied quatorze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint

avec l'ongle, onze lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses aîles lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps, sçavoir la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessus & du dessous des aîles, est d'un noirâtre tirant un peu sur le bleu sombre. Sur le front, immédiatement au-dessus de l'origine du demi-bec supérieur, est un petit paquet de plumes plus longues que les autres, & que l'Oiseau redresse, quand il veut, en forme de hupe. Les grandes plumes des aîles sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & de-là jusqu'à leur bout elles sont d'un noirâtre tirant un peu sur le bleu sombre : les moyennes sont de cette dernière couleur. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aîle : toutes les latérales sont terminées de blanc. L'iris des yeux est d'un bel orangé. Le bec est jaune,

ticorum medius cum ungue undecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alæ complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. In universo corpore, capite scilicet, gutture, collo, dorso, uropygio, pectore, ventre, lateribus, cruribusque, ex nigricante nonnihil ad cœruleum obscurum vergit. Scapulares pennæ, quæ caudam superne & infernè cooperiunt, alarumque rectrices superiores & inferiores eodem colore tinguntur. In fronte, supra mandibulæ superioris exortum, fasciculus extat plumularum cæteris longiorum, quas ad libitum, cristæ in modum, erigit Avis. Remiges majores ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque albescent, à medietate ad apicem ex nigricante nonnihil ad cœruleum obscurum vergunt : minores per totam longitudinem nigricantes, paululum ad cœruleum obscurum inclinantes. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores, lateralium tamen apicibus albis. Oculorum irides eleganter aurantiæ. Rostrum

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre V.* 255

flavum, exceptâ basi mandibulæ inferioris aurantiâ. Pedes obscurè flavi. Habitat in *Sinenfi* regione. excepté la bâte du demi-bec inférieur, qui est orangée. Les pieds sont d'un jaune sombre. On le trouve à la *Chine*.

** 22. LE PETIT MERLE HUPÉ DE LA CHINE;

Voyez Pl. XXI. Fig. 2.

Turdus cristatus, superne fuscus, infernè sordidè albus; maculâ infra oculos splendidè rubrâ; rectricibus caudæ inferioribus roseis; rectricibus fusco-nigricantibus, quatuor utrinque extimis apice albis *MERULA SINENSIS CRISTATA MINOR.*

Alaudam crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo lineas longum est; cauda tres pollices cum sex lineis; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum, extimum longitudine adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Partem capitis superiorem ves-

Il est à peu près de la grosseur d'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de huit lignes; sa queue de trois pouces six lignes; son pied de dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a dix pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est

noirâtre , excepté quelques plumes brunes , qui sont plus longues que les autres , & qui forment une petite hupe. La partie supérieure du col , le dos , le croupion , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont brunes. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches. Il y a de chaque côté une petite ligne noire , qui commence aux coins de la bouche , & s'étend tout le long de la mâchoire inférieure. Au-dessous de chaque œil est une petite tache d'un rouge très-vif. Entre la poitrine & la partie inférieure du col il y a un peu de brun-noirâtre. La poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de l'aîle sont d'un blanc sale : celles du dessous de la queue sont couleur de rose. Les plumes des aîles sont brunes. La queue est composée de douze plumes , toutes d'inégale longueur : les deux du milieu sont les plus longues ; & les latérales vont toutes en décroissant jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte. Les quatre du milieu sont d'un brun-noirâtre ; toutes les autres sont de la même couleur , & terminées de blanc. Le bec est noirâtre. Les pieds & les ongles sont bruns.

tiunt pennæ nigricantes , quibusdam tamen exceptis plumulis fuscis , cæteris longioribus , & parvam cristam efficientibus. Pars colli superior , dorsum , uropygium , alarum tectrices superiores & pennæ caudam superne cooperientes sunt fusca. Guttur & collum inferius alba. In utroque latere lineola extat nigra , ab oris angulis orta , & secundum maxillæ inferioris longitudinem protensa. Infra utrumque oculum exigua adest macula splendide rubra. Pectus inter & collum inferius paululum fusco-nigricantis admixtum est. Pectus , ventris , latera , crura & tectrices alarum inferiores sunt sordide albæ : pennæ caudam subtus tegentes roseæ. Remiges fusca. Cauda duodecim constat rectricibus longitudine inæqualibus : binæ enim intermediae longiores sunt ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Quatuor intermediae sunt fusco-nigricantes ; reliquæ omnes concolores , attamen apice albæ. Rostrum nigricans. Pedes , unguesque fusci. Habitat in *Sinensi* regione , unde in *musæum*

musæum Realmurianum missa
à D. Poivre.

On le trouve à la Chine, d'où
il a été envoyé à M. de Beau-
mur par M. Poivre.

** 23. LE MERLE HUPÉ DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Voyez Pl. XX. fig. 2.

Turdus cristatus, superne fuscus, marginibus pennarum griseis;
capite & cristâ nigro-violaceis; rectricibus caudæ inferiori-
bus rubris; rectricibus in exortu fuscis, dein nigricante-
violaceis, albo terminatis MERULA CRISTATA
CAPITIS BONÆ SPEI.

Crassitie *Alaudam cristatam* non multum antecellit.
Ipsius longitudo ab apice
rostri ad caudam extremam
octo pollices & tres lineas
æquat, & ad extremos un-
gues sex pollices & octo li-
neas. Rostrum ab ipsius apice
ad oris angulos usque un-
decim cum semi lineas lon-
gum est; cauda tres polli-
ces cum septem lineis; pes
undecim cum semi lineas;
& trium digitorum antico-
rum medius cum ungue no-
vem lineas: laterales paulò
sunt breviores; & posticus
laterales nonnihil longitu-
dine excedit. Ab extremo ad
extremum alarum extensa-
rum distantia est undecim
pollicum & sex linearum;
alæ verò complicatæ me-
diam caudæ longitudinem
non attingunt. Caput & gut-
tur vestiunt pennæ nigro-

Il n'est guères plus gros que
l'*Alouette hupée*. Sa longueur
depuis le bout du bec jusqu'à
celui de la queue est de huit
pouces trois lignes, & jusqu'à
celui des ongles de six pouces
huit lignes. Son bec depuis son
bout jusqu'aux coins de la bou-
che a onze lignes & demie de
long; sa queue trois pouces
sept lignes; son pied onze li-
gnes & demie; & celui du mi-
lieu des trois doigts antérieurs;
joint avec l'ongle, neuf lignes:
les latéraux sont un peu plus
courts; & celui de derrière est
un peu plus long que ces der-
niers. Il a onze pouces six li-
gnes de vol; & ses aîles, lors-
qu'elles sont pliées, ne s'éten-
dent pas tout-à-fait jusqu'à la
moitié de la longueur de la
queue. La tête & la gorge sont
couvertes de plumes d'un noir;
qui a un certain lustre de violet.
Celles du dessus de la tête sont

longues & étroites; & l'Oiseau les redresse en forme de huppe. La partie supérieure du col, le dos & le croupion sont bruns, chaque plume étant bordée de gris. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un brun mêlé d'un lustre de violet. Le haut du ventre & des côtés est couvert de plumes brunes, qui ont chacune une large bordure de gris-blanc. Les petites couvertures du dessous de l'aile sont de la même couleur: & les grandes sont cendrées. Le bas des côtés est gris. Le bas-ventre & les couvertures du dessus de la queue sont d'un blanc sale; celles du dessous sont rouges. Les couvertures du dessus des ailes sont brunes & bordées de gris-blanc par le bout seulement. Les plumes des ailes sont d'un brun d'autant plus foncé, que la plume est plus proche du corps; & chacune a le bord extérieur gris. La première est plus courte de plus de moitié que la quatrième & la cinquième, qui sont les plus longues de toutes. Celles de la queue sont brunes à leur origine; ensuite elles deviennent d'un noirâtre tirant sur le violet, & sont terminées de blanc. Vers les coins de la bouche sont

violaceæ. Quæ partem capitatis superiorem obtegunt, longiores sunt & strictiores; illas autem, cristæ in modum, erigit Avis. Collum superius, dorsum & uropygium fusca sunt, marginibus pennarum griseis. Scapulares pennæ concolores. Pars colli inferior & pectus fusco tinguntur colore, in quo aliquid violacei admiscetur. Ventrem supremum, sicut & laterum supremam partem, vestiunt pennæ fuscæ, latis marginibus cinereo-albis præditæ. Alarum tectrices inferiores minores concolores: majores autem cinereæ. Laterum infima pars grisea. Venter imus & tectrices caudæ superiores sordide albæ: caudæ tectrices inferiores rubræ. Pennæ alas superne cooperientes fuscæ marginibus in apice tantum cinereo-albis. Remiges fusco imbuuntur eò saturatione, quò remix sit corpori vicinior; & unaquæque orâ exteriori donatur griseâ. Remix prima dimidio & amplius brevior est quàm quarta & quinta, quæ sunt omnium longissimæ. Rectrices sunt in exortu fuscæ; dein nigricante-violaceæ, albo terminatæ. Circa oris angulos

quidam sunt pili nigri, antrosum versi, setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguisque nigricantes. Habitat in Capite Bonæ Spei, unde in museum D. Aubry missa est.

quelques poils noirs, tournés en-devant, & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve au Cap de Bonne Espérance, d'où il a été envoyé à M. l'Abbé Aubry, qui le conserve dans son cabinet.

** 24. LE MERLE BRUN DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Voyez Pl. XXVII. Fig. 3.

Turdus saturatè fuscus; ventre fusco-flavicante; tectricibus caudæ inferioribus luteis . . . MERULA FUSCA CAPITIS BONÆ SPEI.

Alaudam crassitie non superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum est; cauda duos pollices cum decem lineis; pes undecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad unius circiter pol-

Il n'est pas plus gros qu'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue deux pouces dix lignes; son pied onze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à environ un pouce au-delà de l'origine de la queue. La tête,

la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun foncé. La poitrine & les côtés sont d'un brun un peu plus clair. Le ventre & les jambes sont d'un brun-jaunâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau jaune. Les plumes des ailes sont d'un brun foncé. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

licis distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum & uropygium pennis vestiuntur saturatè fuscis. Pennæ scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, & rectrices caudæ superiores concolores. Pectus & latera fusco imbuuntur nonnihil dilutiore. Venter & crura ex fusco flavicant. Rectrices caudæ inferiores sunt luteæ. Remiges saturatè fuscae. Caudam componunt duodecim rectrices concolores. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Capite Bonæ Spei*, unde missa est ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

25. LE MERLE DE BENGALE.

Turdus superne dilutè fuscus, infernè griseus; remigibus dilutè fuscis, oris exterioribus albis; rectricibus obscurè fuscis *MERULA BENGALENSIS.*

Turdus Bengalensis. Klein. Avi. pag. 70. N°. 30.

Baniahbou de Bengale. Alb. Tom. III. pag. 8; avec une figure mal coloriée Pl. 19.

Les Habitans de Bengale l'appellent BENIAHBOW. Alb.

Il est un peu plus grand qu'une *Grive*. Il a la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des

Magnitudine *Turdum* paululum antecellit. Caput, guttur, collum, dorsum & uropygium vestiunt pennæ dilutè fuscae. Scapulares, ala-

rum rectrices superiores & pennas caudam superne cooperientes idem tingit color. Pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores sunt griseæ. Remiges dilutè fuscæ, oris exterioribus albis. Cauda duodecim constat rectricibus obscure fuscis. Oculorum pupilla nigra; ipsorum irides luteæ. Rostrum & pedes luteo quoque tinguntur. Habitat in *Bengalensi* regno.

aîles & celles du dessus de la queue d'un brun clair. Sa poitrine, son ventre, ses côtés, ses jambes & les couvertures du dessous de sa queue sont grises. Les plumes de ses aîles sont d'un brun clair, & ont leur bord extérieur blanc. La queue est composée de douze plumes d'un brun sombre. La prunelle des yeux est noire; & leur iris est jaune. Le bec & les pieds sont de cette dernière couleur. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

** 26. LE MERLE DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XXII. Fig. 2.

Turdus griseo-fuscus; ventre fordidè albo; remigibus, rectricibusque fuscis *MERULA SENEGALENSIS.*

Turdo Iliaco crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum totidem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda tres pollices cum sex lineis; pes undecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine

Il n'est pas si gros que le *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces; & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue trois pouces six lignes; son pied onze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux

de devant. Il a onze pouces huit lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un gris-brun. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale. Les plumes des ailes sont brunes. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum & octo linearum ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput, guttur, collum, pectus, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, alarum rectrices superiores & inferiores, quæque caudam superne cooperiunt, sunt griseo-fuscæ. Venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores sordide albæ. Remiges fuscæ. Caudam componunt duodecim rectrices eodem colore tinctæ. Rostrum, pedes, unguesque fusci. Habitat in *Senegalensi* regione, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Adanson*.

27. LE MOQUEUR.

Turdus superne griseo-fuscus, infernè albus ; tæniâ supra oculos candicante, per oculos fuscâ ; rectricibus octo intermediis obscurè fuscis, proximè sequenti exterius obscurè fuscâ, interiùs albâ, utrinque extimâ penitus albâ MIMUS.

Turdus dorso fusco, pectore & rectricibus exterioribus albidis, alis fasciâ transversali albâ notatis. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 469.*
Sylvia infernè ex albo cinerea, superne ex terreo colore cinerascens, genis albis ; alis fusco & albo variis, rostro pedibusque nigricantibus. *Klein. Avi. pag. 80. N°. 27.*

Polyglotta. Charlet. Exer. pag. 117. N°. XVII.

Charlet. Onomazt. pag. 114. N°. XVII.

Avis Polyglotta. Euf. Nieremb. pag. 234.

Jonst. Avi. pag. 123.

Willugh. Ornith. pag. 305.

Cencontlatolli, seu Quadringentæ linguæ. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 20. cap. XXX.*

Cencontlatolli, id est, Quadringentæ linguæ; *Avis Polyglotta. Raj. Syn. Avi. pag. 159.*

Petit Mocqueur. *Edwards. Tom. II. pag. LXXVIII; avec une figure exacte Pl. 78.*

Les Anglois l'appellent MOCK-BIRD ou NIGHTINGALE. Browne. AMERICAN MOCK-BIRD. Charlet.

Les Mexiquains, CENCONTLATOLLI. Nieremb. Fern. Jonst.

Præcedentem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices cum novem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem cum semi lineas longum est; cauda tres pollices cum decem lineis; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus anticorum extremum longitudine æmuletur. Alæ complicatæ ad quartam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium & superiores caudæ tectrices sunt griseo-fuscæ. In utroque capitis latere tænia extat longitudinalis, concolor, à basi mandibulæ superioris orta & per oculos ducta; supra quam altera est tænia candi-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue trois pouces dix lignes; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ au quart de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale, de la même couleur, qui part de la base du demi-bec supérieur &

passe par les yeux ; au-dessus de celle-là il y en a une blanche, qui passe au-dessus de l'œil. Les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont blanches. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est de la même couleur. Les petites couvertures du dessus des ailes sont brunes, & variées de quelques taches longitudinales, blanches : les grandes les plus proches du corps sont brunes & terminées de blanc ; les plus éloignées du corps sont de la même couleur, mais le blanc s'étend beaucoup plus loin vers l'origine de la plume, & chacune est marquée vers le bout d'une tache noire. Les grandes plumes des ailes sont d'un brun obscur : les premières des moyennes sont blanches & terminées de brun ; & les autres, qui sont les plus proches du corps, sont brunes & terminées de blanc. La queue est composée de douze plumes : les huit du milieu sont d'un brun obscur : celle qui les suit de chaque côté est de la même couleur du côté extérieur & blanche du côté intérieur : & la plus extérieure de

cans, supra oculos protensa. Genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus obtegentes albescent. Alarum margines, versus articulum carpo humano respondentem, concolores. Ipsarum rectrices superiores minores fuscae, maculis quibusdam longitudinalibus, albis variæ : majores corpori viciniores similiter fuscae, sed albo terminatae ; à corpore remotiores concolores, attamen albedine multò magis versus pennæ exortum protensa, quâlibet insuper rectrice maculâ nigrâ versus apicem notatâ. Remiges majores obscurè fuscescunt : minorum primariae albescent, apicibus fuscis ; reliquæ verò, quæ quidem corpori finitimæ, fuscae sunt & albo terminantur. Duodecim rectricibus cauda constat : octo intermediae sunt obscurè fuscae : utrinque sequens in latere exteriori concolor, in interiori alba : utrinque tandem extrema penitus alba. Rectrices binæ intermediae lateralibus paulò sunt longiores ; laterales autem gradatim paululum longitudine minuuntur. Supra oris angulos pili rigent

gent longi, antrorsum versi, chaque côté est entièrement
setarum instar rigidi. Ros- blanche. Les deux plumes du
trum ex fusco nigricat. Pe- milieu de la queue sont un peu
des, unguisque sunt nigri. plus longues que les latérales,
Egrediè sibilat, omniumque qui vont toutes en diminuant
Animalium vocem æmula- un peu par degrés. Au-dessus
tur. Habitat in *Jamaica*, & des coins de la bouche sont de
Nova Hispania. longs poils tournés en-devant
& roides comme des foyes. Le

bec est d'un brun-noirâtre. Les pieds & les ongles sont noirs.
Il chante très-bien, & contrefait la voix de tous les Ani-
maux. On le trouve à la *Jamaïque* & à la *Nouvelle Espagne*.

28. LE MOQUEUR VARIÉ.

Turdus superne griseo-fuscus, nigro & candenti varius, in-
fernè albus, cinereo & nigro maculatus . . . MIMUS
VARIUS.

Tzonpan. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 21. cap. XXX.

Tzaupan. Euf. Nieremb. pag. 234.

Willugh. Ornith. pag. 305.

Raj. Syn. Avi. pag. 160.

Les Mexiquains l'appellent TZONPAN. Fern.

Formâ & magnitudine
præcedenti similis est. Cantu
illum quoque æmulatur; at-
tamen ab illo colore discre-
pat. In universo corpore su-
periore ex griseo fuscescit,
nigroque & candenti varie-
gatur; in inferiore autem al-
bus est, cinereo & nigro
maculatus. Habitat in *Nova*
Hispania.

Il est de la même forme &
de la même grandeur que le
précédent. Il lui ressemble en-
core par son chant; mais il en
diffère par sa couleur. Tout le
dessus de son corps est d'un
gris-brun, varié de noir & de
blanchâtre; & le dessous est
blanc & tacheté de noir & de
cendré. On le trouve à la *Nou-*
velle Espagne.

29. LE GRAND MOQUEUR.

Turdus superne obscurè fuscus, infernè dilutè griseus; remigibus fuscis, majoribus exterius primâ medietate albis; reatricibus obscurè fuscis MIMUS MAJOR.

Turdus minor cinereo-albus non maculatus. Sloane. Voy. of Jamaica. pag. 305. N°. XXXIV. hujus icon pessima Tab. 256. Fig. 3.

Raj. Syn. Avi. pag. 185. N°. 31.

Turdus minor cinereo-albus, immaculatus. Klein. Avi. pag. 69. N°. 21.

Turdus minor cœruleo-albus, immaculatus, alter. Klein. Avi. pag. 70. N°. 29.

Turdus Americanus minor canorus, ex cinereo albus, non maculatus.

Raj. Syn. Avi. pag. 64. N°. 5.

Mimus, seu Picus Garrulus Indicus. Charlet. Exer. pag. 76. N°. 3.

Charlet. Onomast. pag. 68. N°. 3.

Moqueur. Catesb. Tom. I. pag. 27; avec une figure assez exacte Pl. 27.

Les Anglois l'appellent MOCK-BIRD. Sloane. Raj. Catesb. INDIAN MOCK-BIRD. Charlet. SINGING-BIRD; AMERICAN SONG-THRUSH; NIGHTINGALE. Sloane. Raj.

Les Habitans de la Virginie, GREY MOCKING BIRD. Raj.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*; mais il est plus allongé. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue quatre pouces; son pied un pouce neuf lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur

Crassitie Merulam circiter æquat, sed corpore donatur magis elongato. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices cum decem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est; cauda quatuor pollices; pes unum pollicem & novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum

extimum longitudine adæquat. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, tectrices caudæ superiores & scapulares pennæ sunt obscurè fuscæ. Tectrices alarum superiores concolores, minimarum tamen, istarum scilicet quæ articulum carpo humano respondentem cooperiunt, marginibus albis. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & caudæ tectrices inferiores sunt dilutè griseæ. Remiges majores fuscæ, excepto latere interiore, ab exortu remigis ad mediam circiter longitudinem usque albo : minores penitus fuscæ. Cauda duodecim constat rectricibus obscurè fuscis. Oculorum irides sordidè luteæ. Rostrum nigrum. Pedes grisei. Sicut præcedentes, egregiè sibilat, omnesque Aves cantu æmulatur. *Cerastis*, *Oxyacanthæ* & *cornûs Baccis* vicitat : *Insectis* quoque pro cibo utitur. Habitat in *Virginia*, *Carolina* & *Jamaica*.

Epine & de *Cornouiller* : il mange aussi des *Insectes*. On le trouve à la *Virginie*, à la *Caroline* & à la *Jamaïque*.

de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un brun obscur. Les couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur, mais les plus petites, sçavoir celles qui sont placées vers le pli qui répond à celui du poignet, sont bordées de blanc. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris clair. Les grandes plumes des aîles sont brunes, excepté leur côté extérieur, qui est blanc depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur : les moyennes sont entièrement brunes. La queue est composée de douze plumes d'un brun obscur. L'iris des yeux est d'un jaune sale. Le bec est noir. Les pieds sont gris. Comme les précédents, il chante très-bien, & imite parfaitement le chant de tous les Oiseaux. Il se nourrit de *Cerises*, de *Bayes* d'*Aube-*

** 30. LE SOLITAIRE.

Turdus fuscus, maculis minutis albidis varius, cœruleo in genis, collo, pectore & alis admixto; remigibus fuscis; rectricibus nigricantibus. (*Mas*).

Turdus fuscus, maculis sordidè flavicantibus varius; remigibus, rectricibusque fuscis. (*Fœmina*) *MERULA SOLITARIA*.

Turdus solitarius. *Acta. Upsal. an. 1750. pag. 21.*

Turdus, *Passer solitarius dictus*. *Klein. Avi. pag. 67. N^o. 11.*

Passer solitarius. *Gesn. Avi. pag. 608, in qua hujus icon non satis accurata.*
Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 614. icones non satis accurata, maris pag. 615, & fœminæ pag. 616.

Jonst. Avi. pag. 74. hujus icon ab Olina mutuata Tab. 34: & insuper maris & fœminæ icones ab Aldrovando mutuata Tab. 39.

Charlet. Exer. pag. 87. N^o. 15.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 291.

Passer solitarius à Recentioribus. *Gesn. icon. Avi. pag. 131, in qua hujus icon non satis accurata.*

Passer solitarius dictus. *Willugh. Ornith. pag. 140. hujus icon ab Olina mutuata Tab. XXXVI: & insuper alia icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXVII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 66. N^o. 4.

Passer solitarius, seu *Merula tertia Aristotelis Gesnero & Aldrovando.*

Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 407.

Passer solitarius Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 619, in qua hujus icon à Bellonio mutuata.*

Passera solitaria. *Olina. pag. 14, in qua hujus icon satis accurata.*

Parus niger, rostro oblongo. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXIV. sp. 2.*

Paisse solitaire. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 322; avec une mauvaise figure pag. 323.*

Bel. Portr. d'Ois. pag. 81 b, dans laquelle est la même figure.

Les Grecs modernes l'appellent Μέρουλα. Acta. Upsal.

Les Turcs, KAJABULBUL. *Acta. Upsal.*

Les Catalans, SOLIVAR. *Barr.*

Les Romains, MERULO STERCOROSO. *Gesn. Aldrov. Jonst.*

Les Italiens, PASSERA SOLITARIA. *Bel. Olina.*

Les Trentins, MERULO SOLITARIO. *Gesn. Aldrov. Jonst.*

Les Habitans de Plaisance, MERULO SAXATILI. *Aldrov. Jonst.*

Les Genoïs, MERLO CHIAPPA. *Aldrov.*

Les Allemands, PASSER SOLITARI. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, WROBEL OSOBNY. Rzac.

Les Suédois, STEN-NECTERGAL. Åtta Upsal.

Les Anglois, SOLITARY SPARROW. Willugh.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long ; sa queue trois pouces ; son pied treize lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a douze pouces six lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessus des ailes sont brunes & variées de petites taches blanchâtres. Les côtés de la tête, la gorge, le col, la poitrine & les couvertures du dessus des ailes sont en outre mêlées d'une légère teinte de bleu. Le croupion, & les couvertures du

Merulæ paululum crassitie cedit. Iplius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis octo tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quindecim lineas longum est ; cauda tres pollices ; pes tredecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum duodecim pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, scapulares pennæ, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas superne cooperientes sunt fuscæ, minutis maculis albidis variegatæ. In capitis lateribus sive genis, gutture, collo, pectore & rectricibus alarum superioribus aliquid insuper cœrulei admiscetur. Uropygium

dessus de la queue sont brunes & sans taches. Les plumes des aîles sont entièrement brunes. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Le bec est d'un brun foncé; & la mandibule supérieure est un peu crochue par le bout. Les pieds & les ongles sont bruns.

La *femelle* diffère du *mâle* par sa couleur. Tout son corps est brun, & varié de petites taches d'un jaunâtre sale, plus fréquentes à la poitrine qu'ailleurs, mais sans aucun mélange de bleu. Les plumes de ses aîles & celles de sa queue sont tout-à-fait brunes.

Il fait son nid dans les rochers; & va toujours seul à seul. Il est commun en *Italie*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

& rectrices caudæ superiores fuscae sunt & immaculatæ. Alarum remiges penitus fuscae. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes. Rostrum saturatè fuscum; mandibula autem superior apice est nonnihil adunca. Pedes, unguesque fuscantur.

Fœmina à *mare* colore differt. In universo corpore fusca est, maculis minutis, sordidè flavicantibus varia, quæ maculae in pectore crebriores sunt quàm in reliquis corporis partibus, nullo tamen cœruleo admixto. Remiges & rectrices sunt penitus fuscae.

In rupibus nidificat; & solitaria est, nec gregatim volat. In *Italia* frequens. *Ex museo Realmuriano.*

** 31. LE SOLITAIRE DE MANILLE.

Voyez Pl. XXXIII. Fig. 2.

Turdus superne fuscus, cœrulescente admixto, infernè rufus; fusco & sordidè albido maculatus; uropygio cœrulescente; pectore fusco, sordidè flavicante & cœrulescente vario; remigibus, rectricibusque fusco-nigricantibus. . . . MERULA SOLITARIA MANILLENSIS.

Il approche de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pou-

Ad præcedentis crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pol-

lices & decem lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices cum quatuor lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum; cauda tres pollices; pes tredecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Superiores capitis & colli partes, dorsum & scapulares pennæ fuscescunt, cœrulescente admixto. Uropygium & tectrices caudæ superiores cœrulescunt. Guttur, collum inferius & pectus sunt fusca, sordidè flavicante & cœrulescente variegata. Venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores rufæ, fusco & sordidè albido maculatæ. Tectrices alarum superiores ex fusco nigricant, plerisque pennis colore dilutiore terminatis. Remiges & rectrices sunt similiter fusco-ni-

ces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue trois pouces; son pied treize lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a douze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, & les plumes scapulaires sont d'un brun mêlé d'un peu de bleuâtre. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont de cette dernière couleur. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un brun varié de jaunâtre sale & d'un peu de bleuâtre. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux tacheté de brun & de blanchâtre sale. Celles du dessus des aîles sont d'un brun-noirâtre, la plupart des plumes étant terminées d'une couleur plus claire. Les plumes des aîles & celles de la queue

sont pareillement d'un brun-noirâtre. Le bec est d'un brun plus clair vers son origine, & plus foncé vers le bout. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve aux environs de *Manille*, d'ou il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

gricantes. Rostrum fuscum, in exortu dilutiùs, apice saturatiùs. Pedes, unguisque nigri. Habitat circa *Manilam*, unde in museum *D. Aubry* missa est.

** 32. LE SOLITAIRE DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XXVIII. Fig. 1.

Turdus superne fuscus, apicibus pennarum taniâ transversâ nigricante donatis, albido terminatis, infernè fordidè alborufescens, fusco transversim striatus; remigibus, rectricibusque fuscis, oris exterioribus griseis . . . MERULA SOLITARIA PHILIPPENSIS.

Il est un peu moins gros que le *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces cinq lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; son pied douze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a douze pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles

Turdo Iliaco nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & quinque lineas explet, & ad extremos ungues septem tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim lineas longum est; cauda duos pollices cum octo lineis; pes duodecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum duodecim pollicum

pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ olivaceo-flavicantes. Quæ occipitium, collum superius & dorsum cooperiunt, fuscæ sunt, & taniâ strictiore, transversâ, nigricante in apice donantur, albidoque terminantur. Uropygium & teatrices caudæ superiores cinereæ, quilibet pennâ similiter taniâ strictiore, transversâ, nigricante in apice præditâ, albidoque terminatâ. Genæ, guttur, collum in parte inferiore & ad latera, sicut & pectus, pennis vestiuntur in medio sordidè albo-rufescentibus, supra margines fuscis, sordidè albo-rufescente terminatis. Quæ ventrem, latera & crura obtegunt, similiter ex sordidè albo rufescunt, & saturatè fusco sunt transversim striatæ. Teatrices caudæ inferiores dilutè rufæ, taniis transversis, saturatè fuscis variæ. Pennæ alas subtus cooperientes fuscæ, marginibus albo-rufescentibus. Teatrices alarum superiores minores ex fusco ad cinereum vergentes, stric-

font pilées, s'étendent environ aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un olive-jaunâtre. L'occiput, la partie supérieure du col & le dos sont couverts de plumes brunes, qui ont chacune vers le bout une étroite bande transversale, noirâtre, & sont terminées de blanchâtre. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont cendrées, & chaque plume a pareillement vers le bout une étroite bande transversale, noirâtre, & est terminée de blanchâtre. Les joues, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col, ainsi que la poitrine, sont couverts de plumes d'un blanc sale & roussâtre dans leur milieu, brunes sur leurs bords, & terminées du même blanc sale & roussâtre. Celles qui couvrent le ventre, les côtés & les jambes sont encore de ce même blanc, & rayées transversalement de brun foncé. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux clair, & rayées de même transversalement de brun foncé. Celles du dessous de l'aile sont brunes & bordées de blanc-roussâtre : les petites du dessus, qui sont d'un brun tirant sur le cendré, ont chacune vers le bout une étroite bande trans-

versale , noirâtre , & sont terminées de blanchâtre : les grandes sont brunes , bordées extérieurement de gris , & terminées de blanchâtre. Les plumes des ailes sont brunes & bordées de gris extérieurement & à leur bout. La queue est composée de douze plumes d'un brun très-foncé , & dont le bord extérieur est gris. Le tour des yeux est blanchâtre. Le bec est brun , excepté la base du demi-bec inférieur , qui est d'un blanc sale. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve aux *Isles Philippines* , d'où on l'a apporté à *M. le Chevalier Turgot* , qui le conserve dans son cabinet.

tiorē taniā transversā , nigricante in apice præditæ , albidoque terminatæ : majores fuscae , oris exterioribus griseis , apicibus albidis. Remiges pariter fuscae , oris exterioribus & apice griseis. Caudam componunt duodecim rectrices fusco saturatissimo tinctæ , oris exterioribus griseis præditæ. Oculorum ambitus candicans. Rostrum fuscum , exceptâ basi mandibulæ inferioris sordidè albâ. Pedes , unguisque fusci. Habitat in *Philippensibus Insulis* , unde in *musæum D. Turgot* allata est.

** 33. LE MERLE DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XXV. Fig. 1.

Turdus superne fuscus ; pectore fusco-rufescente ; ventre albo ; remigibus interioribus nigris , majoribus exterioribus albis , minoribus exterioribus violaceis ; maculâ in alis rufo-aureâ ; rectricibus lateralibus interioribus nigris , exterioribus viridi-aureis , extimâ exterioribus albâ . . . MERULA MADAGASCARIENSIS.

Les Habitans de Madagascar l'appellent TANAOMBÉ.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces quatre lignes , & jusqu'à celui des ongles de six pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins

Præcedentem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & quatuor lineas explet , & ad extremos ungues sex pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris

angulos undecim lineas longum est; cauda duos pollices cum octo lineis; pes novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmuletur. Alis expansis, extremitates majorum remigum duodecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediani caudæ longitudinem attingunt. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium & scapulares pennæ fuscescunt. Pectus & latera ex fusco rufescunt. Venter, teñtrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus cooperientes albent. Crura fordidè albo tinguntur. Pennæ caudam superne tegentes sunt fuscae, cum aliqua viridis mixtura. Alarum teñtrices superiores concolores, exceptis tamen majoribus, à corpore remotioribus, violaceis. Remix prior nigra est, & aliquid habet albi versùs exortum in latere exteriori tantùm: quinque sequentes, à secunda scilicet ad sextam usque inclusivè, sunt in latere interiore nigrae, in latere exteriori maximâ parte

de la bouche à onze lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; son pied neuf lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a douze pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont brunes. La poitrine & les côtés sont d'un brun-roussâtre. Le ventre, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont blanches. Les jambes sont d'un blanc sale. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun mêlé avec un peu de verd. Celles du dessus des ailes sont de la même couleur; il faut cependant en excepter les grandes les plus éloignées du corps, qui sont violettes. La première des plumes de l'aile est noire, ayant un peu de blanc vers son origine du côté extérieur seulement: les cinq suivantes, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la sixième inclusivement, sont noires du côté

intérieur ; la plus grande partie de leur côté extérieur est blanche , & le reste est violet ; cette dernière couleur change en verd vers le bout de chaque plume : toutes les moyennes sont noires du côté intérieur , & violettes du côté extérieur , ce violet changeant pareillement en verd vers le bout de chaque plume : cinq de ces plumes , savoir depuis la dixième jusqu'à la quatorzième inclusivement , ont sur leur bord extérieur , vers le tiers de leur longueur , une bande longitudinale , d'un roux doré , bordée intérieurement de verd , ces cinq bandes formant sur l'aile une tache de cette couleur. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un verd doré : les latérales sont de la même couleur du côté extérieur , & noires du côté intérieur ; cependant le côté extérieur de la plus extérieure de chaque côté & le bord extérieur des deux suivantes sont blancs : le dessous de ces douze plumes est noir , excepté celui des deux plus extérieures de chaque côté , qui est cendré. La queue est un peu fourchue. Au-dessus des coins de la bouche sont quelques petits poils noirs , tournés en-devant & roides comme des foyes.

albæ , in reliquis violaceæ ; qui color violaceus versus cujuslibet pennæ apicem viridi colore variat : remiges minores sunt interiùs nigræ , exteriùs violaceæ , colore violaceo versus uniuscujusque remigis apicem viridi colore similiter variante : minorum remigum quinque , à decima scilicet ad decimam-quartam usque inclusivè , in margine exteriori , versus tertiam longitudinis partem , taniâ donantur longitudinali , rufo-aureâ , cujus margo interior viridescit ; quinque autem taniâ istæ maculam in utraque ala rufo-auream efficiunt. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ sunt viridi-aureæ : laterales in latere exteriori concolores , in interiori nigræ , exceptis tamen utrinque extremæ latere exteriori , & duarum proximè sequentium marginibus exterioribus albis : duodecim rectricum pars inferior nigricat , exceptis binis utrinque extremis subtus cinereis. Cauda nonnihil bifurca. Supra oris angulos quidam extant exigui pili nigri , antrorsum versi , setarum instar rigidi. Rostrum , pedes , unguesque nigri. Habitat in *Madagaf-*

caria, unde in *museum Real-murianum* à *D. Poivre* allata est.

Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

34. LE MERLE DE LA JAMAÏQUE.

Turdus fuscus, superne obscuriùs, infernè dilutiùs; ventre albido; maculâ sub gutture albâ; remigibus, rectricibusque obscurè fuscis *MERULA JAMAICENSIS*.

Turdus fuscus. *Klein. Avi. pag. 69. N°. 27.*

Merula fusca. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 305. N°. XXXIII. hujus icon pessima Tab. 256. Fig. 2.*

Raj. Syn. Avi. pag. 185. N°. 30.

Les Anglois l'appellent THRUSH. Sloane. Raj.

Merulæ nostrati crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem septem pollices æquat, & ad extremos ungues sex pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda tres pollices; pes unum pollicem cum sex lineis; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue duodecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales longitudine circiter æmulatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem usque protrahuntur. Caput, pars colli

Il n'est pas si gros que notre *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue trois pouces; son pied un pouce six lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, douze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est à peu près de la même longueur que ces derniers. Il a dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulai-

res, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun obscur. Au-dessous de la gorge est une tache blanche. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un brun clair. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanchâtres. Les plumes des aîles sont brunes. Celles de la queue sont de la même couleur. Le bec est d'une couleur orangée, marquée d'une ligne noire vers le bout. Les pieds sont pareillement orangés; & les ongles bruns. On le trouve à la Jamaïque, où il habite les montagnes couvertes de bois.

superior, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, rectrices alarum superiores & pennæ caudam superne cooperientes obscurè fuscescunt. Macula extat sub gutture alba. Collum inferius & pectus sunt dilutè fusca. Venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores albidæ. Remiges fusca. Rectrices concolores. Rostrum aurantio colore tingitur, & versùs apicem lineâ nigrâ notatur. Pedes pariter aurantii; ungues verò fusci. Habitat in *Jamaica*, in qua sylvas montosas frequentat.

** 35. LE MERLE DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XXVI. Fig. 1.

Turdus fuscus, castaneo admixto; capite & collo nigris, ventre albo; spatio subtriangulari ponè oculos nudo; remigibus majoribus primâ medietate albis, alterâ nigricantibus; rectricibus saturatè fuscis, lateralibus apice albis . . .
MERULA PHILIPPENSIS.

Il est un peu plus gros que le *Merle ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue trois pouces quatre

Merulam vulgarem crassitie nonnihil superat. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudam extremam novem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda tres pol-

lices & quatuor lineas; pes octodecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ duas circiter tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ nigræ, longiores & strictiores. Spatium adest ponè oculos, figuræ subtriangularis, plumis destitutum. Pennæ guttur, collum & pectoris partem supremam obtegentes nigricant quidem, sed non ita saturatè, & ad griseum vergunt. Pectoris pars infima, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, & teñtrices caudæ superiores sunt fuscæ cum aliqua castanei mixtura. Cru-ra tingit idem color. Venter, latera & teñtrices caudæ inferiores albent. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, concolores. Remiges majores ab exortu ad me-

lignes; son pied un pouce six lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a quatorze pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusque vers les deux tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes noires, longues & étroites. Derriere les yeux est un espace d'une figure à peu près triangulaire, dégarni de plumes. Celles qui couvrent la gorge, le col & la partie supérieure de la poitrine sont d'un noir moins foncé & tirant sur le gris. Le bas de la poitrine, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles & celles du dessus de la queue, ainsi que les jambes, sont d'un brun mêlé d'une légère teinte de marron. Le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est de la même couleur. Les grandes plumes des aîles sont blanches depuis leur origine jusque vers

la moitié de leur longueur ; le reste est noirâtre : les moyennes sont brunes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un brun très-foncé dans toute leur longueur : toutes les latérales sont de la même couleur , mais terminées de blanc. Le bec & les pieds sont jaunes. Il se nourrit de *Sauterelles* , & autres *Insectes*. On le trouve aux *Isles Philippines* , d'où il a été envoyé à M. l'Abbé Aubry , qui le conserve dans son cabinet.

diam circiter longitudinem usque albæ , in reliqua longitudine nigricantes : minores verò fuscæ. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ per totam longitudinem saturatissimo fusco imbuuntur : laterales omnes concolores , apicibus tamen albis. Rostrum & pedes flavi. *Locustis* , aliisque *Insectis* victitat. Habitat in *Philippensibus Insulis* , unde in museum D. Aubry missa est.

** 36. LE MERLE CHAUVÉ DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XXVI. Fig. 2.

Turdus superne cinereo - argenteus , infernè fusco - griseus ; pectore fusco-nigricante ; genis nudis ; remigibus , rectricibusque fusco-nigricantibus MERULA CALVA PHILIPPENSIS.

On l'appelle aux *Isles Philippines* COULIN.

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces , & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long ; sa queue trois pouces six lignes ; son pied treize lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs ,

Præcedenti nonnihil craf-
fitie cedit. Ipsius longitudo
ab apice rostri ad caudam ex-
tremam decem pollices ex-
plet , & ad extremos un-
gues novem pollices cum
tribus lineis. Rostrum ab ip-
sius apice ad oris angulos
usque tredecim lineas lon-
gum ; cauda tres pollices
cum sex lineis ; pes tredecim
lineas ; & trium digitorum
anticorum

anticorum medius cum ungue duodecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem anticorum extimum longitudine adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum & trium linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem usque protenduntur. In summo capite strictissima extenditur tania longitudinalis, brevioribus plumulis fuscis conflata, ab exortu mandibulæ superioris orta & versùs occipitium protensa : reliquum caput & genæ nudæ sunt & incarnato colore imbutæ ; dum autem irascitur Avis, partes istæ vividissimo tinguntur coccineo. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & tectrices caudæ superiores sunt splendidissimè cinereo-argentæ. Guttur, partem colli inferiorem & pectus vestiunt pennæ fusco-nigricantes. Quæ ventrem, latera & crura obtegunt, sicut & inferiores caudæ tectrices, sunt fusco-griseæ. Alarum tectrices & remiges fusco-nigricantes. Caudam componunt duodecim rec-

joint avec l'ongle, un pouce : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a quatorze pouces trois lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. Sur le sommet de la tête est une étroite bande longitudinale, formée par des plumes brunes & courtes, & qui s'étend depuis l'origine du demi-bec supérieur jusque vers l'occiput : le reste de la tête & les joues sont nues & d'une couleur de chair ; mais lorsque l'Oiseau est en colere, ces parties deviennent d'un rouge très-vif. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-argenté très-brillant. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un brun-noirâtre. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun-gris. Les plumes des aîles & leurs couvertures sont d'un brun-noirâtre. La queue est composée de douze plumes de la même couleur, mais un peu plus foncée. Le bec, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve aux *Iles Philip-*

pines, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*. trices eodem colore tinctæ, attamen nonnihil saturatio- re. Rostrum, pedes, ungue- que fusci. Habitat in *Philip- pensibus Insulis*, unde in *museum Realmurianum* allata à *D. Poivre*.

** 37. LE MERLE BLEU.

Turdus cinereo-cœruleus, apicibus pennarum tæniâ trans- versâ fuscâ donatis, albido terminatis; remigibus fuscis, oris exterioribus cinereo-cœruleis; rectricibus nigricanti- bus, marginibus exterioribus cinereo-cœruleis
MERULA CÆRULĒA.

Cyanus Aristotelis. Gesn. icon. Avi. pag. 132, in qua icon minùs accurata.

Cyanus, vel Cœruleus. Gesn. Avi. pag. 806, in qua eadem icon.

Cyanus Bellonii. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 618. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 858.

Willugh. Ornith. pag. 142.

Cyanos, seu Cœrulea Avis Bellonii. Raj. Syn. Avi. pag. 66. N°. 5.

Cyanos Aristotelis & Cœruleus Plinii. Bell. Obs. pag. 17.

An Cyanos Indica? Raj. Syn. Avi. pag. 66. N°. 6.

Cœruleus. Gesn. Avi. pag. 277.

An Cœruleus Indicus? Willugh. Ornith. pag. 142.

Cœruleo. Charlet. Exer. pag. 94. N°. II.

Charlet. Onomast. pag. 88. N°. II.

Passer solitarius congener. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 617.

Passeri solitario congener. Jonst. Avi. pag. 75.

Passeri solitario congener Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 141.

Rubicilla major saxatilis. Schwenck. Avi. Sil. pag. 347.

Sylvia gulâ cœruleâ, pectore rubro. Klein. Avi. pag. 77. N°. 3. 1.

Merle bleu. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 316, dans laquelle il y a une mauvaise figure.

Bel. Portr. d'Ois. pag. 79 a, dans laquelle est la même figure.

Oiseau bleu. Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 161.

Moineau solitaire. Edwards. Tom. I. pag. XVIII; avec une assez bonne figure Pl. 18.

Les Grecs l'appellent Κῦαρος. Bel. Gesn. Schwenck.

Les Grecs modernes, Περδικασσινος. Bell. Aldrov.

Les Italiens, MERLO BIAVO. Bel. Aldrov. Willugh.

Les Allemands, BLAW-VOGEL. Gesn. Aldrov. Schwenck. BLAU-VOGEL;

STEIN-ROTELE. Jonst. Willugh. STEIN-ROETELE. Aldrov. Schwenck.

STEIN-DROSSEL; BLAW-STEIN-AMSEL; KLEIN BLAW-ZIMMER. Schwenck.

Merula vulgaris paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices æquat, & ad extremos ungues septem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est; cauda duos pollices cum undecim lineis; pes tridecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmuletur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Universum corpus vestiunt pennæ cinereo-cœruleæ; quæque autem penna in apice taniâ donatur transversâ, fuscâ, & albido terminatur. Tectrices alarum inferiores & minores superiores concolores: majores superiores fuscæ, marginibus exterioribus cinereo-cœruleis, apicibus albis. Remiges quoque

Il est un peu moins gros que le *Merle ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue deux pouces onze lignes; son pied treize lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a douze pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un cendré-bleu, chacune ayant vers le bout une étroite bande transversale, brune, & étant terminée de blanchâtre. Les couvertures du dessous des aîles & les petites du dessus sont de la même couleur: les grandes sont brunes, bordées extérieurement de cendré-bleu & terminées de blanc. Les plumes des aîles sont pa-

reillement brunes, & ont leur bord extérieur d'un cendré-bleu. La queue est composée de douze plumes noirâtres, bordées extérieurement de cendré-bleu. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette obscure : les paupières sont jaunes. Le dedans de la bouche est orangé. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. Il fait son nid sur le sommet des montagnes. On le trouve en *Italie*, dans l'*Isle de Candie*, & en plusieurs autres endroits. *Du cabinet de M. de Réaumur*, à qui il a été envoyé de *Veronne* par *M. Segurier*.

fuscæ, oris exterioribus cinereo - cœruleis. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, margine exteriori cinereo - cœruleâ donatæ. Oculorum irides obscurè avellaneæ : palpebræ luteæ. Os intus aurantium. Rostrum, pedes, unguesque nigricantes. In summitatibus montium nidificat. Habitat in *Italia*, *Creta Insula* & plurimis aliis in locis. A *Verona* in museum *Realmurianum* missa est à *D. Segurier*.

** 38. LE MERLE DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. XXVII. Fig. 1.

Turdus superne cinereo-fuscus, internè albus; remigibus majoribus primâ medietate albis; rectricibus tribus extimis albis, tertiæ orâ exteriori nigricante MERULA DOMINICENSIS.

Il est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes & demie de long; sa queue quatre pouces deux lignes; son pied quatorze lignes; & celui du milieu des

Turdum Iliacum crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & totidem lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices cum lineis binis; pes quatuordecim li-

neus ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus omnium brevissimus. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & octo linearum ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non omnino attingunt. Partes capitis & colli superiores , dorsum , uropygium , pennæ caudam superne tegentes & rectrices alarum superiores minores sunt cinereo-fuscæ. Universum corpus inferius , guttur scilicet , pars colli inferior , pectus , venter , latera , crura , rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes , albet. Alarum rectrices superiores majores (exceptis tamen majoribus , à corpore remotioribus , albis , quâlibet versùs apicem exiguâ maculâ longitudinalli , nigricante præditâ) nigricant , marginibus versùs apicem albis. Remiges majores ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque albæ ; in reliqua longitudine nigricantes , oris exterioribus cinereis : color autem nigricans eò magis versùs pennæ exortum protenditur ,

trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , onze lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est le plus court de tous. Il a douze pouces huit lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent pas tout - à - fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col , le dos , le croupion , les couvertures du dessus de la queue & les petites du dessus de l'aîle sont d'un cendré-brun. Tout le dessous du corps , sçavoir la gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue , & celles du dessous de l'aîle , est blanc. Les grandes couvertures du dessus des aîles (excepté les plus grandes les plus éloignées du corps , qui sont blanches , chacune ayant vers le bout une petite tache longitudinale , noirâtre) sont noirâtres & bordées de blanc vers le bout. Les grandes plumes de l'aîle sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur ; le reste est noirâtre , & le bord extérieur est cendré : le noirâtre s'étend dans chaque plume d'autant plus loin , qu'elle est plus éloignée du corps : les moyennes

sont noirâtres dans toute leur longueur, & ont leur bord extérieur cendré. La queue est composée de douze plumes : les six du milieu sont noirâtres, & leur bord extérieur est cendré : les trois plus extérieures de chaque côté sont blanches, excepté le bord extérieur de la troisième, qui est noirâtre. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

quò remix sit à corpore remotior : minores per totam longitudinem nigricantes , marginibus quoque exterioribus cinereis. Caudam componunt duodecim rectrices : sex intermediæ nigricantes , oris exterioribus cinereis ; tres autem utrinque extremæ albæ , tertiæ rectricis margine exteriori exceptâ , nigricante. Rostrum , pedes , unguisque nigricant. Habitat in *Dominicensi Insula* , unde in *museum Reaumurianum* missa à *D. Chervain*.

** 39. LE MERLE CENDRÉ DES INDES.

Voyez Pl. XXV. Fig. 3.

Turdus cinereus , superne saturatiùs , infernè dilutiùs ; remigibus nigris , oris exterioribus cinereo-albis , interioribus albis ; rectricibus quatuor utrinque extremis penitùs nigris . . .
MERULA INDICA CINEREA.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long ; sa queue trois pouces ; son pied dix lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , huit lignes :

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & novem lineas æquat , & ad extremos ungues sex pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est ; cauda tres pollices ; pes decem lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo li-

neas : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem anticorum intimum longitudine æmulatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & octo linearum ; alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Partes capitis & colli superiores , dorsum , uropygium , pennæ caudam superne tegentes & rectrices alarum superiores minores sunt saturatè cinereæ. Guttur , pars colli inferior , pectus , venter , latera , crura , inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus cooperientes cinereo dilutius tinguntur. Rectrices alarum superiores majores nigrae , oris exterioribus cinereo-albis. Remiges concolores , oris exterioribus pariter cinereo-albis , sed latioribus multò in minoribus remigibus quam in majoribus ; pinulae insuper ipsarum interiores ab exortu remigis ad duas circiter tertias longitudinis partes usque albo terminantur. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediae , sicut & dorsum , saturatè cinereæ : laterales binæ sequentes , utrinque una , in latere exteriori &

les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a douze pouces huit lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col , le dos , le croupion , les couvertures du dessus de la queue & les petites du dessus des ailes sont d'un cendré foncé. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un cendré plus clair. Les grandes couvertures du dessus des ailes sont noires , & ont leur bord extérieur gris-blanc. Les plumes des ailes sont de la même couleur & bordées de même , mais la bordure est beaucoup plus large sur les moyennes plumes que sur les grandes ; & depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur leurs barbes intérieures sont terminées de blanc. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un cendré foncé , comme celui du dos : les deux latérales qui les suivent , sçavoir une de chaque côté , sont de cette mê-

me couleur du côté extérieur & à leur bout, le reste est noir : & les quatre plus extérieures de chaque côté sont tout-à-fait noires. Au-dessus des coins de la bouche sont quelques petits poils noirâtres, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve aux *Indes Orientales*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur*.

apice concolores, in reliquis nigra : & quatuor utrinque extimæ penitus nigra. Supra oris angulos quidam extant exigui pili nigricantes, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguisque nigri. Habitat in *India Orientali*, unde in *museum Realmurianum* missa.

** 40. LE MERLE CENDRÉ D'AMÉRIQUE.

Turdus cinereus, superne saturatiùs, infernè dilutiùs ; gutture albo, nigris maculis vario ; rectricibus nigricantibus ; quatuor utrinque extimis apice albis ; pedibus rubris
MERULA AMERICANA CINEREA.

Turdus viscivorus plumbeus. Klein. Avi. pag. 69. N°. 22.

Grive aux jambes rouges. *Catesb. Tom. I. pag. 30 ; avec une figure exacte Pl. 30.*

Autre espece de Merle que les Naturels du pays appellent Tilli. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 126. (ed. 1725).*

Les Anglois l'appellent RED LEG'D THRUSH. *Catesb.*

Il est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long ; sa queue quatre pouces une ligne ; son pied un pouce six lignes ; & celui du milieu des

Craffitie Turdum Iliacum circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices explet, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos duodecim cum semi lineas longum est ; cauda quatuor pollices cum linea una ; pes octodecim lineas ; & trium digitorum

digitorum anticorum medius cum ungue duodecim cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus cum lateralibus longitudine convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum & octo linearum ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput , pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares & tectrices caudæ superiores sunt saturatè cineræ. In utroque capitis latere macula extat nigra , rostrum inter & oculum collocata. Guttur albet , maculisque variegatur longitudinalibus , nigris , uniuscujusque pennæ medium occupantibus : (in illa à *Catesbeio* descripta , guttur erat penitus nigrum). Pars colli inferior , pectus , venter supremus , latera , crura , alarumque tectrices inferiores colore tinguntur cinereo , qui color sensim atque sensim dilutior fit , versùs imum ventrem procedendo ; imus autem venter & tectrices caudæ inferiores albescent. Alarum tectrices superiores minores idem ac dorsum cinereus tingit color : majores nigricant

trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , douze lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que ces derniers. Il a treize pouces huit lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré foncé. De chaque côté de la tête est une tache noire , placée entre le bec & l'œil. La gorge est blanche , & variée de taches longitudinales , noires , qui occupent le milieu de chaque plume : (celui qu'a décrit *Catesby* , avoit la gorge tout-à-fait noire). La partie inférieure du col , la poitrine , le haut du ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous des ailes sont cendrées : cette couleur s'éclaircit peu à peu en approchant du bas-ventre , qui est blanc , ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Les petites couvertures du dessus de l'aile sont du même cendré que le dos : les grandes sont noirâtres & bordées de cendré extérieurement & par le bout. Les plumes des

aîles sont cendrées en-dessous , en-dessus elles sont noirâtres & ont leur bord extérieur cendré. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont noirâtres dans toute leur longueur : & les quatre plus extérieures de chaque côté sont de la même couleur , mais terminées de blanc : cette couleur occupe d'autant plus d'espace , que la plume est plus extérieure. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales , qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte. Le tour des yeux , ainsi que leur iris , est rouge. Le palais est d'un orangé vif. Le bec & les pieds sont rouges : (celui qui a été décrit par *Catesby* , avoit le bec noir).

La femelle diffère du mâle , en ce qu'elle est un peu plus petite.

On les trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Ils sont très-communs aux *Isles* d'*Andros* & d'*Ilathera*. Ils ont été envoyés de *S. Domingue* à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

& margine exteriori , sicut & apice , donantur cinereâ. Remiges sunt internè cinereæ , superne nigricantes , oris exterioribus cinereis. Duodecim rectricibus cauda constat : quatuor intermediæ per totam longitudinem nigricantes : quatuor utrinque extremæ concolores , apicibus tamen albis ; quæ albedo eò majus spatium occupat , quò rectrix fit exterior. Binæ rectrices intermediæ laterales sunt longiores ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Oculorum ambitus ruber : ipsorum irides quoque rubræ. Palatum splendidè aurantium. Rostrum , pedesque rubent : (illius , cujus descriptionem dedit *Catesbeius* , rostrum erat nigrum) :

Fœmina à mare discrepat magnitudine , quâ ei paulò cedit.

Habitant in variis *Americæ* regionibus. In insulis *Andros* & *Ilathera* frequentissimæ. Ab *Insula S. Dominici* in *museum Realmurianum* missæ sunt à *D. Chervain*.

** 41. LE MERLE CENDRÉ DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XXV. Fig. 2.

Turdus superne cinereus, nonnihil ad olivaceum inclinans; infernè dilutè cinereus; vertice nigricante, ad viride vergente, remigibus exterius cinereo-fuscis, interiùs fuscis; rectricibus cinereo-fuscis . . . MERULA MADAGASCARIENSIS CINEREA.

Les Habitans de Madagascar l'appellent OUROVANG.

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & quinque lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum novem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem longum est; cauda tres pollices & quinque lineas; pes octo cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus cum anticorum intimo longitudine convenit. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis intervallo distant; alæ verò complicatæ mediani caudæ longitudinem non attingunt. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ longiores, strictiores & nigricantes, quæ tamen

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces cinq lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue trois pouces cinq lignes; son pied huit lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a douze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes longues & étroites, d'un noirâtre, qui, regardé avec atten-

tion, paroît tirer sur le verd. La gorge, le col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, les petites du dessus des aîles, les plumes scapulaires & la poitrine sont d'un cendré tirant un peu sur l'olive. Le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un cendré clair : cette couleur au bas-ventre tire un peu sur le jaunâtre. Les grandes couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun. Les plumes des aîles sont d'un cendré-brun du côté extérieur & brunes du côté intérieur. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-brun. Au-dessus des coins de la bouche sont quelques petits poils tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est jaune & a vers son bout une raye longitudinale, brune, placée sur le demi-bec supérieur. Les pieds & les ongles sont gris-bruns. On le trouve à *Madagascar*, doù il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

attentè intuenti ad viride inclinare videntur. Guttur, collum, dorsum, uropygium, scapulares pennæ, quæ caudam superne obtegunt, alarum tectrices superiores minores, nec non & pectus ex cinereo ad olivaceum nonnihil inclinant. Venter, latera, crura, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus tegentes sunt dilutè cinereæ : qui color in imo ventre paululùm ad flavicantem vergit. Tectrices alarum superiores majores sunt griseo-fuscæ. Remiges in latere exteriori cinereo-fuscæ, in interiori penitus fuscæ. Cauda duodecim constat rectricibus cinereo-fuscis. Supra oris angulos quidam extant exigui pili antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum flavum, tæniâ longitudinali, fuscâ, supra mandibulam superiorem sitâ, in apice notatum. Pedes, unguesque griseo-fusci. Habitat in *Madagascaria*, unde in *museum Reaumurianum* à *D. Poivre* allata.

** 42. LE MERLE DE L'ISLE DE BOURBON.

Voyez Pl. XXIV. Fig. 3.

Turdus superne cinereus ad olivaceum inclinans, infernè olivaceus ad flavum vergens; vertice nigro; medio ventre candicante; rectricibus fuscis, taniâ duplici transversâ, fuscâ, alterâ dilutiorè, alterâ saturatiore, in apice donatis MERULA BORBONICA.

Crassitie Alaudam cristatam circiter æmulatur. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues sex tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem cum semi lineas longum est; cauda tres pollices cum sex lineis; pes decem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum undecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ nigrae. Quæ reliquum caput, guttur, collum, dorsum,

Il est à peu près de la grosseur de l'*Alouette loupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue trois pouces six lignes; son pied dix lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a onze pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est noire. Le reste de la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les petites couvertures du dessus des aîles & la poi-

trine sont d'un cendré tirant sur l'olivâtre. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un olivâtre tirant sur le jaune. Le milieu du ventre est blanchâtre. Les grandes couvertures du dessus de l'aile sont brunes, mêlées confusément d'un peu de rouffâtre. Les plumes de l'aile sont brunes en-dessous, & en-dessus elles ont leur côté intérieur brun, & l'extérieur rouffâtre, excepté les trois du milieu, qui sont tout-à-fait brunes. Celles de la queue sont aussi brunes; & lorsqu'on les regarde attentivement, on apperçoit vers leur bout deux bandes transversales, l'une d'un brun plus clair, & l'autre d'un brun plus foncé. Le bec, les pieds & les ongles sont jaunâtres. On le trouve à l'*Isle de Bourbon*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. de Lanux*.

uropygium & pectus obtinent, ex cinereo ad olivaceum inclinant. Tectrices alarum superiores minores idem tingit color. Venter, latera, crura & inferiores caudæ tectrices ex olivaceo ad flavum vergunt. Medius venter candicat. Alarum tectrices superiores majores fusca sunt, cum paucis rufescente confusim admixto. Remiges infernè fusca, superne verò in latere interiore concolores, in exteriori rufescentes, exceptis tamen tribus intermediis penitus fuscis. Rectrices quoque fusca; sed attentè intuenti duplici taniâ transversâ, fusca, alterâ dilutiore, alterâ saturatiore, in apice notatæ videntur. Rostrum, pedes, unguesque flavicant. Habitat in *Insula Borbonica*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. de Lanux*.

** 43. LE MERLE OLIVE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE,

Voyez Pl. XXII. Fig. 3.

Turdus superne fusco-olivaceus, infernè fulvus; remigibus & rectricibus lateralibus interiùs fuscis MERULA OLIVACEA CAPITIS BONÆ SPEI.

Il est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. Sa longueur . . . *Turdum Iliacum* crassitie circiter æquat. Ipsius longi-

tudo à rostri apice ad caudæ extremitatem octo pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices cum novem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem lineas longum; cauda tres pollices; pes quatuordecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue duodecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus cum anticorum intimo longitudine perfectè convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & decem linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. In universo corpore superiore, partibus scilicet capitis & colli superioribus, dorso & uropygio, pennis vestitur fusco-olivaceis. Scapulares pennæ, quæ alas superne cooperiunt, & tectrices caudæ superiores concolores. Guttur, collum inferius & pectus sunt fusco-fulva; guttur insuper maculæ fuscae variegant. Venter, latera, crura, tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes eleganti fulvo tinguntur. Remiges in latere exteriori corpori supe-

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue trois pouces; son pied quatorze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a douze pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout le dessus du corps, sçavoir les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue, est d'un brun tirant sur l'olive. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un brun-fauve, & la gorge est de plus variée de taches brunes. Le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un beau fauve. Les plumes de l'aîle ont leurs barbes extérieures de la même couleur que le dessus du corps, &

leurs barbes intérieures brunes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu & le côté extérieur des latérales sont encore de la même couleur que le dessus du corps, & leur côté intérieur est brun. Le bec, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

riori concolores, in latere interiore fuscæ. Caudam componunt duodecim rectrices : binæ intermediae in utroque latere & laterales ad latus exterius tantum eodem colore imbuuntur ac corpus superius, laterales verò sunt interiùs fuscæ. Rostrum, pedes, unguisque fuscæ. Habitat in *Capite Bonæ Spei*, unde missa est ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

** 44. LE MERLE OLIVE DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. XXVII. Fig. 2.

Turdus superne olivaceus, infernè griseo-olivaceus; remigibus fuscis, oris interioribus albidis, exterioribus olivaceis; rectricibus lateralibus interiùs fuscis, oris albidis . . .
MERULA OLIVACEA DOMINICENSIS.

Il n'est guères plus gros qu'une *Fauvette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue deux pouces; son pied neuf lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la

Craffitie Currucam non multum antecellit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices æquat, & ad extremos ungues quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum est; cauda duos pollices; pes novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas : laterales paulò sunt breviores; & posticus cum anticorum extimo longitudine

longitudine convenit. Alis expansis, extremitates majorum remigum octo pollicum & decem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, alarum rectrices superiores minores, pennæ caudam superne cooperientes, sicut & scapulares, sunt olivaceæ. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores griseo tinguntur colore, cum pauco olivaceo confusè mixto. Alarum rectrices superiores majores, sicut & remiges, fuscescunt, & marginibus donantur exterioribus olivaceis, interioribus albidis. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediae olivaceæ: laterales in latere exteriori concolores, in latere interiori fuscæ, oris albidis. Rostrum, pedes, unguesque griseofusci. Habitat in *S. Domini Insula*, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. Chervain*.

même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a huit pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue, les petites du dessus des aîles & les plumes scapulaires sont olivâtres. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris mêlé confusément d'un peu d'olivâtre. Les grandes couvertures du dessus des aîles & les plumes des aîles sont brunes, & ont leur bord extérieur d'une couleur d'olive & leur bord intérieur blanchâtre. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu & les barbes extérieures de toutes les latérales sont d'une couleur d'olive, & leurs barbes intérieures sont brunes & terminées de blanchâtre. Le bec, les pieds & les ongles sont gris-bruns. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

** 45. LE MERLE OLIVE DES INDES.

Voyez Pl. XXXI. Fig. 2.

Turdus viridi-olivaceus, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; remigibus interiùs fuscis, oris flavicantibus . . . MERULA OLIVACEA INDICA.

Il est un peu moins gros que le *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de treize lignes; sa queue de trois pouces cinq lignes; son pied de neuf lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a douze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout le dessus du corps, sçavoir les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue, est d'un verd-d'olive foncé. La gorge, la partie in-

Turdo Iliaco nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices æquat, & ad extremos ungues sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda tres pollices cum quinque lineis; pes novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum intimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem usque prætenduntur. In universo corpore superiore, partibus scilicet capitis & colli superioribus, dorso, uropygio, pennis scapularibus, alas superne cooperientibus & superioribus caudæ tectricibus, saturato imbuitur vi-

ridi-olivaceo. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes eodem tinguntur colore, sed dilutior & ad flavum magis inclinante. Remiges in latere exteriori corpori superiori concolores, in latere interiore fuscæ, oris interioribus ab exortu remigis ad duas circiter tertias longitudinis partes usque flavicantibus. Caudam componunt duodecim rectrices, quas idem ac dorsum tingit color. Rostrum, pedes, unguisque nigricant. Habitat in *India Orientali*, unde in *Museum Reaumurianum* missa.

férieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un verd-d'olive plus clair, & tirant plus sur le jaune. Les plumes des ailes ont leurs barbes extérieures de la même couleur que le dessus du corps & leurs barbes intérieures brunes, lesquelles barbes sont terminées de jaunâtre depuis l'origine de la plume jusque vers les deux tiers de sa longueur. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que le dos. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve aux *Indes Orientales*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur*.

** 46. LE MERLE A COLLIER DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Voyez Pl. XXX. Fig. 1.

Turdus superne viridi-olivaceus, infernè luteus; collo inferiore nigro; taniâ per oculos nigrâ, ad collum inferius reflexâ; rectricibus lateralibus nigris, apice luteis. . . .
MERULA TORQUATA CAPITIS BONÆ SPEI.

Merulæ vulgari paululum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & quinque lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum totidem lineis.

Il n'est pas si gros que le *Merle ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces cinq lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis son

bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long ; sa queue trois pouces cinq lignes ; son pied quatorze lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , un pouce : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a onze pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un cendré tirant sur l'olive. La partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un beau verd - d'olive. La gorge , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont jaunes. Le bord de l'aîle , vers le pli qui répond à celui du poignet , est de la même couleur. Le jaune de la gorge est entouré de deux bandes noires , chacune desquelles commence à l'origine du demi - bec supérieur , passe par les yeux & va se réunir à l'autre sous la gorge. La partie inférieure du col est noire , ce qui , joint aux deux ban-

Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos duodecim cum semi lineas longum est ; cauda tres pollices & quinque lineas ; pes quatuordecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem : laterales paulò sunt breviores ; & posticus cum anticorum extimo longitudine convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Capitis superior pars ex cinereo ad olivaceum inclinat. Pars colli superior, dorsum , uropygium , scapulares pennæ , quæ alas superne cooperiunt , & tectrices caudæ superiores sunt viridi - olivaceæ. Guttur , pectus , venter , latera , crura , inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus tegentes luteæ. Alarum margines , versùs articulum carpo humano respondentem , concolores. Gutturis luteum colorem ambiunt binæ taniæ nigrae , utraque ab exortu mandibulæ superioris orta , per oculum ducta , & inde reflexa , cum altera sub gutture connexa. Collum infe-

rius nigrum, quæ nigredo, cum duabus præcedentibus tæniis juncta, torquem quodammodo efficit. In utroque capitis latere tænia quoque est longitudinalis, lutea, à naribus orta & supra oculum usque protensa. Alarum remiges sunt infernè griseofuscæ, superne verò in latere interiore fuscæ, in exteriori viridi-olivaceæ, exceptis tamen majorum apicibus in utroque latere fuscis. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediæ viridi-olivaceæ: laterales nigrae, apice luteæ. Binæ rectrices intermediæ laterales nonnihil longitudine excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque nigricantes. Habitat in *Capite Bonæ Spei*, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. Abbate de la Caille*.

des précédentes, forme une espèce de collier. De chaque côté de la tête est aussi une bande longitudinale, jaune, qui s'étend depuis la narine jusqu'au-dessus de l'œil. Les plumes des ailes sont en-dessous d'un gris-brun, & en-dessus elles sont brunes du côté intérieur & d'un beau verd-d'olive du côté extérieur, excepté le bout des grandes, qui est brun des deux côtés. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un verd-d'olive: les latérales sont noires & terminées de jaune. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. l'Abbé de la Caille*.

** 47. LE PALMISTE.

Voyez *Pl. XXIX. fig. 1.*

Turdus superne viridi-olivaceus, infernè cinereus; syncipite; genisque nigris; vertice cinereo; maculis tribus utrinque in capite albis; remigibus interiùs & subtus fuscis. . . .
MERULA PALMARUM.

Il n'est pas plus grès qu'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de longueur; sa queue deux pouces six lignes; son pied onze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a dix pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont cendrées. Le synciput & les joues sont noires & variées de trois taches blanches de chaque côté, sçavoir une de chaque côté du synciput, & deux auprès de chaque œil, dont l'une est au-dessus & l'autre au-dessous. La gorge est blanche; cette couleur s'étend en une petite bande au-dessous des joues. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures des ailes

Craffitie Alaudam non superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos unguis quinque pollices cum decem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem lineas longum est; cauda duos pollices & sex lineas; pes undecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales longitudine nonnihil excedit. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Superiorem capitis partem, collum, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ cinereæ. Inferiores caudæ tectrices eodem imbuuntur colore. Synciput & genæ sunt nigrae & tribus utrinque maculis albis notatæ, unâ scilicet in utroque syncipitis latere, & duabus prope utrumque oculum, quarum alia suprâ, altera infrâ collocatur. Guttur albet; quæ albedo exiguam taniam con-

colorem, infra genas protensam, efformat. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alarum tectrices, quæque caudam superne cooperiunt, sunt viridi-olivaceæ. Alarum remiges subtus fuscæ, superne verò in latere exteriori viridi-olivaceæ, in interiore fuscæ. Caudam componunt duodecim rectrices superne & infernè viridi-olivaceæ. Rostrum, pedes, unguesque cinerei. *Palmas* frequentat, & in eis nidificat. Habitat in *Cayana*, unde in *musæum Reaumurianum* missa à *D. Artur*.

& celles du dessus de la queue sont d'un beau verd-d'olive. Les plumes des aîles sont brunes en-dessous, & en-dessus elles sont d'un beau verd-d'olive du côté extérieur & brunes du côté intérieur. La queue est composée de douze plumes d'un verd-d'olive dessus & dessous. Le bec, les pieds & les ongles sont cendrés. Il se tient ordinairement sur les *Pal-miers*, & y fait son nid. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

** 48. LE PALMISTE A-TESTE NOIRE.

Voyez Pl. XXIX. Fig. 2.

Turdus superne viridi-olivaceus, infernè cinereo-albus; capite nigro, maculis tribus utrinque albis insignito; remigibus interiùs & subtus fuscis *MERULA PALMARUM*
ATRICAPILLA.

Crassitie præcedentem æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & totidem lineas explet, & ad extremos ungues quinque pollices cum decem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; cauda duos polli-

Il est de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; son pied

onze lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , huit lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a dix pouces quatre lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête est noire & marquée de chaque côté de trois taches blanches , sçavoir une de chaque côté du synciput , & deux auprès de chaque œil , dont l'une est au-dessus & l'autre au-dessous. La partie supérieure du col est cendrée. Le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un beau verd-d'olive. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches ; cette couleur s'étend en une petite bande au-dessous des joues. La poitrine est cendrée. Le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris-blanc. Les plumes des ailes sont brunes en-dessous , & en-dessus elles sont d'un beau verd-d'olive du côté extérieur & brunes du côté intérieur. La queue est composée de douze plumes d'un verd-d'olive en-dessus & en-dessous.

ces cum sex lineis ; pes undecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus laterales longitudine paululùm antecellit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum & quatuor linearum ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput nigrum est & maculis tribus utrinque albis insignitum , unâ scilicet in utroque syncipitis latere , & duabus prope utrumque oculum , aliâ suprâ , alterâ infrâ collocatâ. Collum superius cinereo colore tingitur. Dorsum , uropygium , pennæ scapulares , alarum tectrices , quæque caudam superne obtegunt , sunt viridi-olivaceæ. Guttur & collum inferius albescent , quâ albedine exigua efficitur tænia concolor , infra genas protensa. Pectus cooperiunt pennæ cinereæ. Quæ ventrem , latera & crura vestiunt , sunt cinereo - albæ. Tectrices caudæ inferiores concolores. Remiges subtus fuscæ , superne verò in latere exteriori viridi-olivaceæ , in interiori fuscæ. Cauda duodecim constat

stat rectricibus superne & infernè viridi - olivaceis. Rostrum, pedes, unguisque cinerei. Ut præcedens, *Palmas* frequentat, & in eis nidificat. Habitat in *Cayana*, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. Artur*.

Le bec, les pieds & les ongles sont cendrés. Comme le précédent, il se tient sur les *Pal-miers*, & y fait son nid. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

** 49. LE MAINATE.

Voyez *Pl. XXVIII. Fig. 2.*

Turdus splendide nigro - violaceus ; uropygio nigro - viridi ; capite membranis nudis, luteis ornato ; remigibus majoribus tæniâ transversâ, albâ in medio notatis ; rectricibus nigris, ad viride vergentibus ; rostro in exortu rubro, apice flavo . . . MAINATUS.

Pica, seu potius *Sturnus Indicus*. *Bont. Ind. Ori. pag. 67, in qua hujus icon minùs accurata.*

Sturnus Indicus Bontii. Willugh. Ornith. pag. 145. hujus icon à Bontio mutuata Tab. XXXVIII.

Raj. Syn. Avi. pag. 68. N°. 2.

Cornicula, seu *Monedula Indiæ Orientalis. Klein. Avi. pag. 60. N°. 12.*

Petit Minor, ou *Mino. Edwards. Tom. I. pag. XVII ; avec une figure exacte Pl. 17.*

Mineur des Indes Orientales. Alb. Tom. II. pag. 25 ; avec une figure mal coloriée Pl. 38.

Les Anglois l'appellent INDIAN STARE. Willugh. MINOR FROM EAST INDIA. Alb.

Merulam crassitie paululum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices cum totidem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem & quinque cum semi lineas longum est ; cauda tres pollices ; pes

Il est un peu plus gros qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes & demie de long ; sa queue trois pouces ; son pied seize lignes ; & celui

du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a un pied sept pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la gorge & les parties supérieures du col & du dos sont d'un noir-violet très-brillant. Les plumes du sommet de la tête sont extrêmement courtes & imitent le velours ; il faut cependant en excepter celles du milieu, qui sont plus longues & forment une étroite bande, qui s'étend depuis la base du demi-bec supérieur jusqu'à l'occiput : les plus courtes ont aussi un lustre de verd. La tête est entourée de deux membranes nues & jaunes, sçavoir une de chaque côté, qui commencent derrière & au-dessous des yeux, & s'étendent jusqu'à l'occiput, sans cependant se réunir ; ces membranes sont flottantes & divisées en plusieurs lobes : la figure fera mieux voir leur construction, que la description ne pourroit l'exprimer. La partie inférieure du dos, le croupion & les cou-

sexdecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octodecim lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum intimum longitudine æmulatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & septem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, guttur, collum superius & dorsum supremum sunt splendidissimè nigro-violacea. Pennæ summum caput vestientes sunt brevissimæ & holosericum villosum æmulantur ; ex istis tamen excipiendæ sunt quæ medium locum obtinent, quæque longiores sunt & tæniam efformant strictiorem, à basi mandibulæ superioris ad occipitium usque protensam : breviores insuper aliquo virore lucent. Caput ambiunt binæ membranæ nudæ, luteæ, scilicet utrinque una, ponè & infra oculos ortæ, ad occipitium usque productæ, non tamen inter se connexæ ; quæ membranæ fluctuantes sunt, inque lobos plurimos divisæ : iconem consule, ex ista magis quàm accuratissimâ descrip-

tionem ipsarum forma patebit. Dorsum pars infima, uropygium & rectrices caudæ superiores & inferiores sunt splendidissime nigro-virides. Collum inferius, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ nigro-violaceæ, sed minus quam in dorso splendentes. Alarum rectrices superiores & minores inferiores sunt nigrae, marginibus splendidè nigro-viridibus : majores autem inferiores nigricant. Remiges superne nigrae, ad viride vergentes, oris exterioribus ad violaceum inclinantibus, infernè penitus nigricantes ; quæ remiges, à secunda ad octavam inclusivè, versùs mediam longitudinem latè notantur tanià transversà, albà, remigum utrumque latus occupante, exceptis secundà ad latus tantum interiorius, & octavà ad latus tantum exteriorius albà tanià notatis. In spatio autem candido remigum scapi nigricant. Remix prima brevissima ; tertia omnium longissima. Caudam componunt duodecim rectrices nigrae, ad viride vergentes. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum in exortu rubrum, apice flavum. Pedes ex flavo ad aurantium

vertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un noir-verd très-brillant. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un noir-violet moins brillant que le dos. Les couvertures du dessus des ailes & les petites du dessous sont noires, & bordées de noir-verd fort brillant : les grandes du dessous sont noirâtres. Les plumes des ailes sont en-dessus d'un noir tirant sur le verd, & ont leur bord extérieur tirant sur le violet, & en-dessous elles sont noirâtres. Ces plumes, depuis la seconde jusqu'à la huitième inclusivement, ont vers le milieu de leur longueur une large bande transversale, blanche, qui s'étend des deux côtés de la plume, excepté dans la seconde, de laquelle elle n'occupe que le côté intérieur, & dans la huitième, de laquelle elle n'occupe que le côté extérieur. Dans cet espace blanc les tiges des plumes sont noirâtres. La première des plumes de l'aile est très-courte ; la troisième est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un noir tirant sur le verd. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Le bec est rouge à son origine & jaune vers le bout.

Les pieds sont d'un jaune tirant sur l'orangé; & les ongles d'un brun clair. Il siffle & chante très-bien; & apprend facilement à parler. On le trouve aux *Indes Orientales*, d'où il a été apporté à M. l'Abbé Aubry, qui le conserve dans son cabinet.

inclinantes; ungues verò dilutè fusci. Egregiè cantat, sibilatque; & vocem humanam facilè imitatur. Habitat in *India Orientali*, unde in *musèum D. Aubry* allatus est.

50. LE GRAND MAINATE.

Turdus splendidè nigro-violaceus; uropygio nigro-viridi; capite membranis nudis, luteis ornato; remigibus majoribus taniâ transversâ, albâ in medio notatis; rectricibus nigris, ad viride vergentibus; rostro flavo . . . MAINATUS MAJOR.

Cornicula, seu Monedula Indiæ Orientalis. *Klein. Avi. pag. 60. N°. 12.* Grand Minor, ou Mino. *Edwards. Tom. I. pag. XVII; avec une figure exacte Pl. 17.*

Il ressemble parfaitement au précédent par sa forme & la variété de ses couleurs; il en diffère seulement par sa grandeur, qui égale celle du *Choucasc*, & par la couleur de son bec, qui est jaune dans toute sa longueur. Les pieds sont pareillement jaunes, & n'ont rien d'orangé. On le trouve dans l'Isle de *Hainan*, en *Asie*.

Formâ & colorum varietate cum præcedente perfectè convenit; ab illo tantùm discrepat magnitudine, quâ *Monedulam* adæquat, & rostri colore per totam longitudinem flavo. Pedes similiter flavi, nil aurantii admixtum habent. Habitat in *Insula Haina*, in *Asia*.

51. LE MERLE D'AMÉRIQUE.

Turdus superne splendidè niger, ad violaceum inclinans, infernè niger; remigibus majoribus apice rufescentibus; rostro, pedibusque luteis. (Mas).

Turdus in toto corpore griseus; rostro, pedibusque luteis. (Fœmina) . . . MERULA AMERICANA.

Merle, ou Cornicula Americana nigra, aut fusca. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 125. (ed. 1725).*

Magnitudine & crassitie *Merulam nostratem* circiter æquat. Caput, pars colli superior, dorsum, pennæ scapulares, alarumque tectrices sunt splendide nigræ ad violaceum inclinantes. Gut-tur, pars colli inferior, pec-tus, venter, latera, crura, uropygium & tectrices cau-dæ superiores & inferiores nigræ quidem, sed multò minùs splendentes. Alarum remiges majores nigræ, pau-co rufescente terminatæ : minores, sicut & rectrices, penitus nigræ. Oculorum pu-pilla nigerrima : ipsorum iri-des luteæ. Rostrum & pedes quoque lutei.

Fœmina à *mare* discrepat colore in universo corpore griseo. In reliquis cum *mare* perfectè convenit.

Habitant in *America*.

Il est à peu près de la gros-seur & de la grandeur de *notre Merle*. La tête, la partie supé-rieure du col, le dos, les plu-mes scapulaires & les couver-tures des aîles sont d'un noir brillant & tirant sur le violet. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, le crou-pion & les couvertures du des-sus & du dessous de la queue sont d'un noir beaucoup moins brillant. Les grandes plumes des aîles sont noires, & ter-minées d'un peu de rouffâtre : les moyennes, ainsi que les plumes de la queue, sont tout-à-fait noires. La prunelle des yeux est d'un beau noir : leur iris est jaune. Le bec & les pieds sont de cette dernière couleur.

La *femelle* diffère du *mâle* par sa couleur, qui est grise par tout le corps. Du reste elle res-semble parfaitement au *mâle*.

On les trouve en *Amérique*.

** 52. LE MERLE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Voyez Pl. XXIII. Fig. 2.

Turdus splendide niger, ad viride inclinans ; remigibus ma-joribus rufis, tribus primoribus fusco, sequentibus nigro

Q q iij

terminatis ; rectricibus nigris MERULA CAPITIS
BONÆ SPEI.

Il est un peu plus gros que le *Merle ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long ; sa queue quatre pouces ; son pied quatorze lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a quinze pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un noir brillant & tirant sur le verd. Les couvertures du dessus & du dessous des aîles sont de la même couleur. Les grandes plumes des aîles sont rousses ; les trois premières sont terminées de brun, & les suivantes sont terminées d'un noir brillant & tirant sur le verd : les moyennes sont noires, mais leurs barbes extérieures sont en-dessus d'un noir bril-

Craffitie *Merulam vulgarem* nonnihil antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat, & ad extremos ungues novem pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est ; cauda quatuor pollices ; pes quatuordecim lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quindecim pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Universum corpus vestiunt pennæ splendide nigræ, ad viride inclinantes. Alarum rectrices superiores & inferiores concolores. Remiges majores sunt rufæ ; tres autem priores fusco, sequentes verò nigro splendenti & ad viride vergente terminantur : minores nigræ, sed superne in latere exteriore nigro splendenti, ut in corpore, perlustrantur.

Cauda duodecim constat re-
ctricibus : binæ intermediæ
sunt superne splendide nigræ
& ad viride vergentes , in-
fernè penitus nigræ : latera-
les omnes superne & infernè
penitus nigræ. Rostrum ni-
grum, validum. Pedes, un-
guesque fuscii. Habitat in *Ca-
pite Bonæ Spei*, unde missa
ad *D. Comitem de Bentinck*,
qui *D. de Reaumur* dono de-
dit.

lant comme celui du corps. La
queue est composée de douze
plumes : les deux du milieu
sont en-dessus d'un noir bril-
lant & tirant sur le verd, & en-
dessous tout-à-fait noires : tou-
tes les latérales sont dessus &
dessous de cette dernière cou-
leur. Le bec est noir & fort. Les
pieds & les ongles sont bruns.
On le trouve au *Cap de Bonne
Espérance*, d'où il a été en-
voyé à *M. le Comte de Ben-
tinck*, qui en a fait présent à
M. de Reaumur.

** 53. LE MERLE VERD D'ANGOLA.

Voyez Pl. XXX. Fig. 2.

*Turdus viridi anatino tinctus ; maculâ in alis violaceo-cha-
lybeâ ; remigibus , reëtricihusque subtus nigricantibus . . .*
MERULA VIRIDIS ANGOLENSIS.

Merulam vulgarem craf-
sitie circiter æquat. Ipsius
longitudo ab apice rostri ad
caudam extremam octo pol-
lices & decem lineas explet,
& ad extremos ungues octo
pollices cum quinque lineis.
Rostrum ab ipsius apice ad
oris angulos usque undecim
cum semi lineas longum est ;
cauda duos pollices cum un-
decim lineis ; pes quindecim
lineas ; & trium digitorum
anticorum medius cum un-
gue duodecim lineas : late-

Il est à peu près de la gros-
seur du *Merle ordinaire*. Sa
longueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est de
huit pouces dix lignes, & jus-
qu'à celui des ongles de huit
pouces cinq lignes. Son bec
depuis son bout jusqu'aux coins
de la bouche a onze lignes & de-
mie de long ; sa queue deux pou-
ces onze lignes ; son pied quin-
ze lignes ; & celui du milieu
des trois doigts antérieurs ,
joint avec l'ongle, un pouce :
les latéraux sont un peu plus

courts ; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Il a douze pouces trois lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un beau verd de *Canard*. Les couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur , excepté quelques-unes des petites , qui sont d'un violet - d'acier poli fort brillant , & qui forment sur l'aîle une tache de cette couleur. Les couvertures du dessous des aîles sont aussi du même verd de *Canard* , & sont mêlées du côté extérieur & à leur bout d'un peu de violet - d'acier poli. Les plumes des aîles sont d'un verd de *Canard* en-dessus & noirâtres en-dessous. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles des aîles. Le bec , les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve dans le Royaume d'*Angola* , d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. de Castelan*.

rales paulò sunt breviores ; posticus autem laterales longitudine nonnihil antecellit. Alis expansis , extremitates majorum remigum duodecim pollicum & trium linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. In universo corpore pennis vestitur viridi *Anatino* tinctis. Alarum teñtrices superiores eodem imbuuntur colore , exceptis ex minoribus aliquot splendidissimè violaceo - chalybeis , maculam concolorem in utraque ala efficientibus. Teñtrices alarum inferiores viridi quoque *Anatino* tinguntur , & in latere exteriori & apice aliquid violaceo - chalybei admixtum habent. Remiges superne viridi *Anatino* imbutæ , infernè nigricantes. Caudam componunt duodecim reñtrices alarum remigibus concolores. Rostrum , pedes , unguesque nigri. Habitat in *Angolensi* regno , unde in *musæum Reaumurianum* allata est à *D. de Castelan*.

** 54. LE MERLE VERD A LONGUE QUEUE DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XXXI. Fig. 1.

Turdus viridi anatino tinctus; summo capite nigricante-aureo; uropygio violaceo colore variante; remigibus, rectricibusque subtus nigris; caudâ longissimâ . . . MERULA VIRIDIS LONGICAUDA SENEGALENSIS.

Præcedentem crassitie non-nihil antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & sex pollices æquat, & ad extremos ungues decem pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim lineas longum est; cauda undecim pollices; pes octodecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem usque protenduntur. Caput in superiore parte & ad latera nigricante-aureo imbitur. In toto reliquo corpore, capitis scilicet parte

Tome II.

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix-huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue onze pouces; son pied un pouce six lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a quatorze pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à environ un tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure & les côtés de la tête sont d'un noirâtre-doré. Tout le reste du corps, sçavoir le derrière de la tête, le col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous

Rr

LE REGNE
des aîles , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les plumes qui recouvrent la queue dessus & dessous sont d'un verd de *Canard* très-éclatant. Le croupion change en un beau violet selon qu'il est exposé à différens rayons de lumière : le ventre & les jambes changent aussi selon différens aspects en une belle couleur de cuivre de rosette. Les plumes de la queue sont toutes d'inégale longueur : les deux du milieu sont les plus longues ; & toutes les latérales vont en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte. Elles sont toutes , ainsi que les grandes & les moyennes plumes de l'aîle , de la même couleur que le dos en-dessus , & en-dessous elles sont noires. Les deux du milieu de la queue changent aussi selon différens jours , comme le croupion , en un beau violet. Le bec , les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Sénégal* , d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

posteriore, collo, dorso, uropygio, alarum tectricibus superioribus & inferioribus, pectore, ventre, lateribus, cruribus & pennis caudam superne & infernè cooperientibus, splendidissimo viridi *Anatino* tingitur. Uropygium eleganti violaceo colore variat pro vario quo lucis radii incidunt modo : & secundum varios ad lucem objectus splendidus cupri puri color ventrem & crura variegat. Rectrices omnes inæqualem longitudinem obtinent : binæ intermediae longiores sunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque brevior. Quæ omnes rectrices, sicut & alarum remiges majores & minores, sunt superne dorso concolores, infernè verò nigræ. Binæ intermediae pro vario ad lucem objectu, uropygii instar, eleganti quoque violaceo colore variant. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Senegalensi* regione, unde in *musæum Reaumurianum* missa à *D. Adanson*.

55. LE MERLE VERD DE LA CAROLINE.

Turdus superne obscurè viridis, infernè luteus; taniâ supra oculos candidâ; imo ventre sordidè albo; rectricibus fuscis.

. . . . MERULA VIRIDIS CAROLINENSIS.

Turdus pectore luteo. Klein. Avi. pag. 69. N°. 26.

Cul-blanc à la poitrine jaune. Catesb. Tom. I. pag. 50; avec une figure exacte Pl. 50.

Les Anglois l'appellent YELLOW BRESTED CHAT. Catesb.

Craffitie Alaudam non multùm superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & tres circiter lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; cauda tres pollices; pes duodecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem anticorum extremum longitudine æmulatur. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multùm extenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alarum tectrices superiores, quæque caudam superne cooperiunt, sunt obscurè virides. In utroque capitis latere tania extenditur longitudi-

Il n'est guères plus gros qu'une Alouette. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue trois pouces; son pied douze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un verd obscur. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale,

blanche, qui s'étend depuis les narines jusqu'au - dessus des yeux, sous lesquels il y a aussi une petite tache de la même couleur. Tout le long de la mâchoire inférieure est encore de chaque côté une petite ligne blanche, fort étroite. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont jaunes. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale. Les plumes des ailes sont d'un verd obscur en-dessus, & cendrées en-dessous. Celles de la queue sont brunes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. Il fréquente les bords des grandes rivières. On le trouve à la *Caroline*.

nalis, candida, à naribus supra oculos usque protensa; & infra oculos exigua adest macula quoque candida. Secundum mandibulæ inferioris longitudinem alia est utrinque lineola strictior, alba. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem supremum & latera vestiunt pennæ luteæ. Venter imus, crura & rectrices caudæ inferiores sunt sordide albæ. Alarum remiges superne obscure virides, inferne cinereæ. Rectrices fuscæ. Rostrum, pedes, unguisque nigri. Majorum fluminum ripas frequentat. Habitat in *Carolina*.

** 56. LE MERLE VERD DES MOLUQUES.

Voyez *Pl. XXXII. Fig. 1.*

Turdus superne viridis, inferne fulvus; capite nigro, taniâ utrinque fulvâ in cervice; uropygio & rectricibus alarum minoribus Beryllinis; rectricibus nigris, apice viridibus....
MERULA VIRIDIS MOLUCCENSIS.

Pica Indica vulgaris. Raj. Syn. Avi. pag. 195. N°. 12. hujus icon pessima Tab. I. Fig. 10.

Coturnix Capensis. Klein. Avi. pag. 115. N°. 2.

Caille de Bengale. Alb. Tom. I. pag. 27; avec une mauvaise figure Pl. 31.

Les Anglois l'appellent MADRASS-JAY. Raj.

Les Habitans de Madras, PONNANDUTTY. Raj.

Les Gentils, PONNUNKY PITTA. Raj.

Craffitie Merulam nostram circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices explet, & ad extremos ungues octo pollices cum septem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim lineas longum est; cauda unum pollicem & quinque lineas; pes octodecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas: laterales multò sunt breviores; posticus autem laterales nonnihil longitudine superat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum; alæ verò complicatæ ad tres lineas ultra caudam extremam protenduntur. Caput & guttur nigra sunt. In summo capite tænia est longitudinalis, fulva, prope nares orta, & ad occipitum usque protensa. Pars colli superior, dorsum & scapulares pennæ elegantiori colore viridi tinguntur. Uropygium & tectrices caudæ superiores sunt splendide Beryllino colore imbutæ. Partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ fulvæ. Quæ caudam subtus coope-

Il est à peu près de la grosseur de *notre Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue un pouce cinq lignes; son pied dix-huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a treize pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. La tête & la gorge sont noires. Sur le sommet de la tête il y a de chaque côté une bande longitudinale, fauve, qui commence auprès des narines, & s'étend jusqu'à l'occiput. La partie supérieure du col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un beau-verd. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'une couleur d'Aigue-marine éclatante. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, & les jambes sont fauves. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve beaucoup plus clair. Celles du

deffous des aîles font noires : les petites du deffus font d'une couleur d'Aigue-marine éclatante : les grandes font du même verd que le dos. Les grandes plumes de l'aîle font noires : les six premières ont vers leur milieu une tache transversale , blanche , qui occupe le côté intérieur dans les trois premières , les deux côtés dans les deux suivantes , & le côté extérieur , plus la moitié de l'intérieur dans la sixième ; ce qui forme vers le bas de l'aîle une grande tache blanche : les moyennes plumes de l'aîle font noires , & ont leurs barbes extérieures terminées de verd ; cette couleur s'étend d'autant plus loin , que la plume se rapproche plus du corps ; la plus proche est même tout-à-fait verte. La queue est composée de douze plumes noires & terminées de verd. L'iris des yeux est blanchâtre. Les coins de la bouche font orangés. Le bec est d'un gris-brun. Les pieds font orangés ; & les ongles d'un rouge sale. On le trouve aux *Molouques* , d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck* , qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

riunt , eodem colore tinguntur , sed multò dilutior. Alarum rectrices inferiores nigrae : superiores minores splendido Beryllino colore tinctae : majores verò eodem ac dorsum viridi imbutae. Remiges majores nigrae sunt : primores sex versùs mediam ipsarum longitudinem maculâ notantur transversâ , albâ , ad latus interius in tribus prioribus , in utroque latere in sequentibus binis , in latere exteriori & interioris medietate in sexta collocatâ ; unde versùs infimam alae partem majuscula macula efficitur candida : minores remiges nigrae , pinnulis exterioribus viridi terminatis ; qui color eò majus spatium occupat , quò remix fit corpori vicinior ; proximior quidem in toto viridis est. Cauda duodecim constat rectricibus nigris , apice viridibus. Oculorum irides candicantes. Oris anguli aurantii. Rostrum griseo-fuscum. Pedes aurantii ; ungues verò sordidè rubri. Habitat in *Moluccis Insulis* , unde missa est ad *D. Comitem de Bentinck* , qui *D. de Reaumur* dono dedit.

** 57. LE MERLE VERD A TESTE NOIRE DES MOLUQUES.

Voyez Pl. XXXII. Fig. 2.

Turdus viridis, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; capite & collo nigris; uropygio & rectricibus alarum superioribus Beryllinis; rectricibus caudæ inferioribus roseis; rectricibus nigris *MERULA VIRIDIS ATRICAPILLA MOLUCENSIS.*

Præcedenti nonnihil crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est; cauda duodecim lineas; pes unum pollicem & quinque cum semi lineas; & trium digitorum anticorum mediùs cum ungue undecim lineas: laterales multò sunt breviores; posticus autem laterales longitudine paululum antecellit. Alis expansis, extremitates majorum remigum undecim pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres lineas ultra caudæ extremitatem extenduntur. Caput, guttur, & collum vestiunt pennæ nigræ. Dorsum & scapulares pennæ

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue douze lignes; son pied un pouce cinq lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Il a onze pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la gorge & le col sont noirs. Le dos & les plumes scapulaires sont d'un verd foncé. La poitrine, le haut du ventre & les côtés sont d'un verd plus clair. Le bas-ventre est couvert

de plumes noires à leur origine, & terminées de couleur de rose. Les couvertures du dessous de la queue sont d'une couleur de rose dans toute leur longueur. Le croupion, les couvertures de dessus de la queue & celles du dessus des aîles sont d'une couleur d'Aigue-marine éclatante. Les grandes plumes de l'aîle sont noires à leur origine, ensuite blanches, & terminées de brun-noirâtre : les moyennes sont noirâtres, & ont leurs barbes extérieures terminées de verd : & les plus petites, qui sont les plus proches du corps, sont tout-à-fait vertes. La queue est composée de douze plumes noires. Le bec est brun. Les pieds sont d'une couleur plus claire. On le trouve aux *Moluques*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

sunt saturatè virides. Pectus, venter supremus & latera viridi dilutiorè tinguntur. Pennæ imum ventrem cooperientes sunt in exortu nigræ, apicibus roseo colore tinctis. Tectrices caudæ inferiores per totam longitudinem roseæ. Pennæ uropygium & caudam superne vestientes, alarumque tectrices superiores splendido Beryllino colore perlustrantur. Remiges majores in exortu nigræ, deinde candidæ, apicibus fusco-nigricantibus : mediæ nigricantes, pinnulis exterioribus viridi terminatis : minimæ, quæ quidem corpori finitimæ, penitus virides. Caudam componunt duodecim rectrices nigræ. Rostrum fuscum. Pedes dilutiorè colore tincti. Habitat in *Moluccis Insulis*, unde in museum *D. Aubry* missa est.

** 58. LE LORIOT.

Turdus luteus, uropygio ad olivaceum vergente; maculâ utrinque rostrum inter & oculum nigrâ; rectricibus lateralibus in exortu nigris, apice luteis. (*Mas*).

Turdus superne viridi-olivaceus, ad luteum vergens, infernè sordidè albus, lineis longitudinalibus griseo-fuscis varius; maculâ utrinque rostrum inter & oculum fuscâ; rectricibus lateralibus primùm viridi-olivaceis, dein nigricantibus, apice luteis, oris interioribus luteis. (*Fœmina*).... **ORIOLOUS.**

Turdus

- Turdus flavus, alis & extremâ caudâ nigris, pupillis rubris. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXII. sp. 12.*
- Turdus. *Moehr. Avi. Gen. 10.*
- Turdus aureus. *Klein. Avi. pag. 66. N^o. 7.*
- Turdus luteus. *Frisch. maris & fœminæ icones satis accuratæ Tab. 31.*
- Oriolus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 312.*
- Oriolus apud Recentiores quosdam. *Gesn. icon. Avi. pag. 37, in qua hujus icon minimè accurata.*
- Oriolus, vel Picus nidum suspendens. *Gesn. Avi. pag. 713, in qua eadem icon.*
- Oriolus (flavus, alis extremâque caudâ nigris, pupillis rubris) *Gesneri. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 73. sp. 1.*
- Picus nidum suspendens. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 854. icones pessimæ, maris pag. 858, & fœminæ pag. 857.*
- Jonst. Avi. pag. 80. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 41.*
- Galbula, vel Galgulus. *Gesn. Avi. pag. 393.*
- Galbula Aldrovandi, seu Picus nidum suspendens. *Willugh. Ornith. pag. 147. icones ab Aldrovando mutuata, maris Tab. XXXVIII, sub titulo, Oriolus, seu Galbula, & fœminæ Tab. XXXVI, sub titulo, Galbula juvenis.*
- Galbula, seu Picus nidum suspendens Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag. 68. N^o. 5.*
- Galbulus, vel Galgulus Aldrovando; Galbula Gesnero; Aliis Chlorio, Vireo, Luteolus, Oriolus, Picus nidum suspendens. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 280.*
- Galgulus & Vireo *Bellonii.*
- Chlorion, seu Chloreus. *Gesn. Avi. pag. 261.*
- Chloreus Aristotelis. *Aldrov. Jonst. Willugh. Raj.*
- Icterus Plinii. *Willugh. Raj. Klein.*
- Loriot. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 294; avec une très-mauvaise figure pag. 295.*
- Loriot; Orio. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 72 b, dans laquelle est la même figure.*
- Oiseau jaune de Bengale. *Alb. Tom. III. pag. 8; avec une figure passable Pl. 20.*
- Les Grecs l'appellent *Χλωρίαν. Bel. Schwenck. Κολλος; Ἰκτερος. Bel.*
- Les Grecs modernes, *Συκοφάγος. Aldrov. Jonst.*
- Les Espagnols, *OROYÉNDOLA. Gesn. Aldrov. OROPENDOLA. Aldrov.*
- Les Catalans, *OROPENDOLA; ORIOL. Barr.*
- Les Italiens, *ORIOLO. Aldrov. GARBELLA. Bel. Gesn.*
- Les Vénitiens, *BECQUAFIGO. Aldrov. BECQUAFIGA; BRUSOLA. Bel. Gesn.*
- Les Vicentins, *BECQUAFIGA; BRUSOLA. Bel. Gesn.*
- Les Boulonnois, *GALBEDRO; REGALBULO; REIGALBERO; RIGEYO. Aldrov.*

Les Ferrarois, MELZIOZALLO. *Aldrov.*

Les Lombards, GALBEDRO. *Bel. Gesn.*

Les Allemands, WITWOL; WEIDWAL; WEDEWAELE; WIDWOL; WIDWAL; WIDDEWAL. *Gesn. Aldrov. Witteval. Gesn. Wideval; Pyrold. Frisch. Wittevale; Beerhold; Kirschholdt. Schwenck. Gelbling. Rzac.*

Les Allemands aux environs de Cologne, KERSENRIE. *Gesn. Aldrov.*

Les Allemands aux environs de Francfort, BIEROLFF. *Gesn. Aldrov.*

Schwenck. Brouder-Berolff. Gesn. Aldrov.

Les Saxons, BYROLT; TYROLT. *Gesn. Aldrov. Bierholt. Schwenck.*

Les Hessois, GEROLFF. *Gesn. Aldrov.*

Les Bas Allemands, GOLD-MERLE. *Gesn. Gold-Meerle. Schwenck.*

Gout-Merle. Aldrov. Willugh.

Les Brabançons, OLI-MERLE. *Gesn. Aldrov.*

Les Suisses, WITTEWALCH. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, WYWIELGA; WILGA. *Rzac.*

Les Anglois, WITWOL. *Gesn. Widwol. Aldrov.*

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue trois pouces quatre lignes; son pied neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes & demie; l'extérieur neuf lignes; l'intérieur sept lignes & demie; & celui de derrière huit lignes. Il a seize pouces huit lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la partie

Craffitie Merulam circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim lineas longum est; cauda tres pollices cum quatuor lineis; pes novem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem cum semi lineas; extimus lineas novem; intimus septem cum semi lineas; posticus autem octo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ

ad tres quartas longitudinis caudæ partes protenduntur. Caput, guttur, collum, dorsi partem supremam, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ elegantissimè luteæ. Tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes concolores. Dorsi infima pars, uropygium & superiores caudæ tectrices similiter luteæ, sed ad olivaceum nonnihil vergentes. In utroque capitis latere macula est nigra, rostrum inter & oculum sita. Scapulares pennæ nigro variegantur & luteo ad olivaceum vergente. Alarum tectrices superiores penitus nigræ, exceptis tamen majoribus à corpore remotioribus, quæ apicibus donantur pallidè luteis. Remiges nigræ : majores & minorum aliquot, à secunda scilicet ad decimam-quartam usque inclusivè, margine donantur exteriore albâ, quæ margo in quibusdam est strictissima : à quinta ad decimam-septimam usque inclusivè margine candidâ in apice prædictæ sunt : à decima-octava tandem ad vigesimam usque inclusivè strictiore margine ex albo ad luteum inclinante similiter terminantur. Remix

supérieure du dos, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un très-beau jaune. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur, mais qui tire un peu sur l'olive. De chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, est une tache noire. Les plumes scapulaires sont variées de noir & de jaune tirant sur l'olive. Les couvertures du dessus des ailes sont entièrement noires, excepté les plus grandes les plus éloignées du corps, qui sont terminées de jaune pâle. Les plumes des ailes sont noires : les grandes & une partie des moyennes, savoir depuis la seconde jusqu'à la quatorzième inclusivement, sont bordées extérieurement de blanc ; cette bordure est fort étroite dans quelques-unes : depuis la cinquième jusqu'à la dix-septième inclusivement elles sont terminées d'une bordure blanche : & depuis la dix-huitième jusqu'à la vingtième inclusivement elles sont pareillement terminées d'une petite bordure d'un blanc tirant sur le jaune. La première de ces plumes est très-courte ; la troisième est la plus longue de tou-

tes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un verd-d'olive à leur origine ; le reste de leur longueur est noir & terminé par un petit point jaune : toutes les latérales sont noires à leur origine & terminées de jaune ; cette dernière couleur s'étend d'autant plus loin vers l'origine de la plume , qu'elle est plus extérieure. L'iris des yeux est rouge. Le bec est de la même couleur. Les pieds sont d'une couleur de plomb ; & les ongles noirâtres.

La femelle diffère du mâle par ses couleurs. La tête , la partie supérieure du col , le dos & le croupion sont d'un verd-d'olive tirant sur le jaune. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un jaune tirant un peu sur l'olive. Les plumes scapulaires sont d'un verd-d'olive du côté extérieur & brunes du côté intérieur. De chaque côté de la tête , entre le bec & l'œil , est une tache brune. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un gris-blanc varié de petites lignes longitudinales , tirant sur le brun. La poitrine & le ventre sont d'un blanc sale , chaque plume ayant une bande longitudinale , d'un gris-brun , qui s'étend selon la longueur de sa tige. Les côtés sont couverts de

prima brevissima ; tertia omnium longissima. Cauda duodecim constat rectricibus , quarum binæ intermediæ sunt in exortu viridi-olivaceæ , in reliqua longitudine nigra , punctulo luteo apice notatæ : laterales omnes in exortu nigra , apice lutea ; qui color luteus eò magis versùs pennæ exortum protrahitur , quò rectrix fit exterior. Oculorum irides rubra. Rostrum eodem colore tinctum. Pedes plumbei ; ungues verò nigricantes.

Fœmina coloribus à mare discrepat. Caput , pars colli superior , dorsum & uropygium pennis vestiuntur viridi-olivaceis ad luteum vergentibus. Rectrices caudæ superiores ex luteo ad olivaceum nonnihil inclinant. Scapulares pennæ sunt in latere exteriori viridi-olivaceæ , in interiori fusca. In utroque capitis latere , rostrum inter & oculum , macula est fusca. Guttur & collum inferius cinereo-alba , lineolis longitudinalibus , ad fuscum vergentibus variegata. Pectus & ventrem cooperiunt pennæ sordide albæ , taniâ longitudinali , griseo-fuscâ , secundùm scapi longitudinem ductâ , notatæ.

Quæ latera obtegunt, luteæ sunt, & taniâ similiter longitudinali, griseo-fuscâ, secundum scapi longitudinem protensâ, donantur. Quæ crura vestiunt, griseo-fuscæ, apicibus luteis. Inferiores caudæ teñtrices & pennæ alas subtus tegentes eleganter luteæ : alarum teñtrices superiores minores fuscæ, viridi-olivaceo terminatæ : majores corpori viciniore pariter fuscæ, aliquid viridi-olivacei admixtum habentes : à corpore remotiorum primores in latere exteriori nigricantes, marginibus cinereis, apicibus pallidè luteis, in latere verò interiore candidæ, apicibus pariter pallidè luteis : sequentes nigricantes, ad marginem anteriorem cinereæ & pallidè luteo terminatæ. Alarum remiges fuscæ, secundæ, tertiæ & quartæ oris exterioribus candidis : sex sequentium, à quinta scilicet ad decimam usque inclusivè, oris exterioribus cinereis, apicis margine candidâ : sex rursus sequentes, ab undecima scilicet ad decimam-sextam usque inclusivè, in latere exteriori maximâ parte ex cinereo ad olivaceum vergunt, & ut præcedentes,

plumes jaunes, qui ont pareillement chacune une bande longitudinale, d'un gris-brun, étendue selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent les jambes sont d'un gris-brun, & terminées de jaune. Les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un beau jaune : les petites du dessus sont brunes & terminées de verd-d'olive : les grandes les plus proches du corps sont pareillement brunes & mêlées d'une légère teinte de verd-d'olive : les premières des plus éloignées du corps sont noirâtres du côté extérieur, bordées de cendré & terminées de jaune pâle ; & du côté intérieur elles sont blanches & terminées aussi de jaune pâle : & les suivantes sont noirâtres, bordées extérieurement de cendré & terminées pareillement de jaune pâle. Les plumes des ailes sont brunes ; le bord extérieur de la seconde, de la troisième & de la quatrième est blanc : les six suivantes, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la dixième inclusivement, ont leur bord extérieur cendré, & sont bordées de blanc par le bout : les six autres, sçavoir depuis la onzième jusqu'à la seizième inclusivement, ont une grande partie de leur côté extérieur d'un cendré

tirant sur l'olive, & sont, comme les précédentes, bordées de blanc par le bout : enfin les quatre dernières sont d'un verd-d'olive du côté extérieur & brunes du côté intérieur. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un verd-d'olive, excepté leur bout, qui tire sur le noirâtre & est bordé de jaune ; leur tige est pareillement noirâtre : toutes les latérales sont d'un verd-d'olive à leur origine, noirâtres vers le bout & terminées de jaune ; cette dernière couleur s'étend d'autant plus loin vers l'origine de la plume, mais du côté intérieur seulement, que la plume est plus extérieure : de plus le bord intérieur de toutes les latérales est jaune. Le bec est rouge à sa base & jaune vers le bout. Les pieds sont plombés ; & les ongles noirâtres. Il se nourrit d'*Insectes* & de *Bayes* : il mange beaucoup de *Cerises*.
Du cabinet de M. de Reaumur.

apicis margine candidâ præditæ sunt : quatuor tandem corpori finitimæ in latere exteriori viridi-olivaceæ, in interiori fuscæ. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ sunt viridi-olivaceæ, excepto tamen apice ad nigricantem colorem inclinante, & margine luteâ prædito ; scapis nigricantibus quoque donantur : laterales omnes sunt in exortu viridi-olivaceæ, versùs apicem nigricantes & luteo terminatæ ; qui color luteus eò magis versùs pennæ exortum protenditur, sed ad latus tantùm interius, quò rectrix sit exterior : margines insuper lateralium omnium interiores lutescunt. Rostrum basi rubrum, apice luteum. Pedes plumbei ; ungues verò nigricantes. *Insectis* & *Baccis* victitat : *Cerasis* delectatur. *Ex museo Realmuriano.*

** 59. LE LORIOT DE LA COCHINCHINE.

Voyez Pl. XXXIII. Fig. 1.

Turdus luteus ; taniâ ab angulo ad angulum oris nigrâ, per oculos & summum caput ductâ, ferri equini figuræ æmulâ ; rectricibus nigris, apice luteis . . . *ORIOLOUS COCHINSENSIS.*

On l'appelle à la Cochinchine COULIAVAN.

Crassitie præcedentem circiter æmulatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices æquat, & ad extremos ungues octo pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuordecim lineas longum est; cauda tres pollices cum novem lineis; pes octo cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum intimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & quinque pollicum; alæ verò complicatæ tres circiter quartas longitudinis caudæ partes attingunt. Per universum corpus pennis vestitur eleganter luteis, exceptâ tamen tæniâ nigrâ, ab angulo ad angulum oris protensâ, per oculos & summum caput ductâ: quæ tænia majorem in medio latitudinem obtinet, apicibus ipsius binis in acutum desinentibus; ita ut ferri equini figuram circiter emuletur. Alarum remiges sunt nigræ: ex minoribus tamen aliquot exiguâ maculâ flavicante terminantur. Caudam compo-

Il est à peu près de la longueur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue trois pouces neuf lignes; son pied huit lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a un pied cinq pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un très-beau jaune, si l'on en excepte une bande noire, qui s'étend d'un coin de la bouche à l'autre, en passant par les yeux & par le sommet de la tête: cette bande est plus large dans son milieu, & ses deux bouts se terminent en pointe; de sorte qu'elle a à peu près la figure d'un fer à cheval. Les plumes de l'aîle sont noires: quelques-unes des moyennes sont terminées par une petite tache jaunâtre. La queue est composée de douze plumes.

noires & terminées de jaune : cette couleur n'occupe que le bout dans les deux plumes du milieu, & dans les latérales elle s'étend d'autant plus loin vers leur origine, que la plume est plus extérieure ; de sorte que la plus extérieure de chaque côté est jaune dans presque la moitié de sa longueur. Le bec & les ongles sont jaunâtres ; & les pieds sont noirs.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est d'un jaune plus pâle, & ce qu'elle a de noir est beaucoup moins foncé.

On les trouve à la *Cochinchine*, d'où ils ont été apportés à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

nunt duodecim rectrices nigrae, apice luteae : color autem luteus duarum intermediarum apicem tantum occupat, in lateralibus verò eò magis versùs ipsarum exortum protenditur, quò rectrix fit exterior ; ita ut utrinque extrema mediâ ferè longitudinis parte lutea sit. Rostrum, unguesque flavicantes ; pedes verò nigri.

Fœmina à mare differt colore luteo multò pallidiore, & nigro multò minùs saturato.

Habitant in *Cochinsina*, unde in *museum Realmurianum* à *D. Poivre* allati sunt.

60. LE LORIOT DES INDES.

Turdus luteus ; taniâ ab angulo ad angulum oris cœruleâ, per oculos & summum caput ductâ ; rectricibus luteis, taniâ transversâ cœruleâ notatis *ORIOLOUS INDICUS*.

Chlorio Indicus. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 862, in qua hujus icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 80. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 41, sub titulo, Picus Chlorio Indicus.

Il est à peu près de la même grosseur & de la même grandeur que le précédent, excepté sa queue, qui ne paroît pas aussi longue. Tout son corps, savoir la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, & les

Præcedentem magnitudine & crassitie circiter æquat ; attamen non videtur habere caudam ita longam. Per universum corpus, caput scilicet, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crura, luteus

luteus est. Pennæ scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Ab angulo ad angulum oris tænia protenditur cœrulea, per oculos & summum caput ducta. Alarum remiges sunt luteæ, majusculis maculis cœruleis, longitudinalibus variæ. Rectrices similiter luteæ, tæniâ transversâ, cœruleâ circa medium notatæ. Rostrum, pedesque insigniter rubri. Habitat in *India Orientali*.

jambes, est d'un beau jaune. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Il a sur la tête une bande bleue, qui s'étend d'un coin de la bouche à l'autre, en passant par les yeux & par le sommet de la tête. Les plumes des aîles sont jaunes, & variées d'assez grandes taches longitudinales, bleues. Celles de la queue sont pareillement jaunes, & marquées vers leur milieu d'une bande transversale, bleue. Le bec & les pieds sont d'un fort beau rouge. On le trouve aux *Indes Orientales*.

** 61. LE LORIOT DE BENGALÉ.

Turdus luteus; capite nigro; rectricibus luteis, duabus intermediis ultimâ medietate nigris, proximè sequenti maculâ nigrâ interiùs notatâ *ORIOLOUS BENGALENSIS*.

Loriot à tête noire des Indes. *Edwards. Tom. II. pag. LXXVII; avec une figure exacte Pl. 77.*

Etourneau jaune de Bengale. *Alb. Tom. II. pag. 27; avec une mauvaise figure Pl. 41. (C'est peut-être la femelle de cette espece).*

Les Anglois l'appellent *YELLOW STARLING FROM BENGALL. Alb.*

Merulæ crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum octo
Tome II,

Il n'est pas si gros que le *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces huit lignes.
T t

Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long ; sa queue trois pouces quatre lignes ; son pied dix lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , neuf lignes & demie ; l'intérieur huit lignes & demie ; l'extérieur sept lignes ; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a quinze pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à un pouce de distance du bout de la queue. La tête & la gorge sont d'un très-beau noir. Le col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un très-beau jaune. Les petites couvertures du dessus des aîles & les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont noires du côté extérieur depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur ; le reste est jaune , ainsi que tout le côté intérieur. L'aîle est composée de vingt plumes jaunes à leur origine , & noires dans le reste de leur longueur :

lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est ; cauda tres pollices & quatuor lineas ; pes decem cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem cum semi lineas ; intimus octo cum semi lineas ; extimus septem lineas ; posticus autem anticorum intimum longitudine æmuletur. Alis expansis , extremitates majorum remigum quindecim pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam extremam , exceptâ unius pollicis distantia , pertingunt. Caput & guttur vestiunt pennæ splendide nigræ. Quæ collum , dorsum , uropygium , pectus , ventrem , latera & crura cooperiunt , sicut & scapulares pennæ , quæ caudam superne & infernè obtegunt , alarumque tectrices inferiores , elegantissimo tinguntur luteo. Alarum tectrices superiores minores , sicut & majores corpori viciniore , concolores : majores à corpore remotiores in latere exteriori ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque nigræ , in reliqua longitudine luteæ , in latere verò interiori penitus luteæ.

Alam componunt viginti remiges in exortu luteæ, in reliqua longitudine nigræ : quinta & sexta exiguâ donantur margine luteâ, in latere exteriori versùs duas tertias longitudinis partes collocata : aliæ, à decima scilicet ad decimam-octavam usque inclusivè, luteo obliquè terminantur, sed in latere exteriori tantùm : binæ tandem corpori finitimæ sunt penitùs luteæ, exceptâ tamen lateris interioris medietate versùs apicem nigrâ. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque luteæ, alterâ medietate nigrâ, margine luteâ in apice præditâ : utrinque proximè sequens lutea, majusculâ maculâ nigrâ interiùs versùs apicem notata : & quatuor utrinque extimæ penitùs luteæ : duodecim autem rectricum scapi ab exortu ad mediam longitudinem usque albent. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum rubrum. Pedes plumbeo colore tincti ; ungues verò nigricantes.

In illo ab *Albino* descripto guttur & collum inferius lutea erant, & minutis maculis longitudinalibus, fuscis

la cinquième & la sixième ont un petit bord jaune sur le côté extérieur vers les deux tiers de leur longueur : d'autres, savoir depuis la dixième jusqu'à la dix-huitième inclusivement, sont terminées obliquement de jaune du côté extérieur seulement : & les deux plus proches du corps sont entièrement jaunes, excepté la moitié de leur côté intérieur vers le bout, qui est noire. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont jaunes depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur longueur ; l'autre moitié est noire & bordée de jaune par le bout : celle qui les suit de chaque côté est jaune, & marquée d'une grande tache noire du côté intérieur vers le bout : & les quatre plus extérieures de chaque côté sont entièrement jaunes : la tige de ces douze plumes est blanche depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Le bec est rouge. Les pieds sont d'une couleur de plomb ; & les ongles noirâtres.

Celui qu'a décrit *Albin* avoit la gorge & la partie inférieure du col d'un jaune varié de petites taches longitudinales, bru-

nes. C'est peut-être la femelle de cette espèce.

On le trouve dans le Royaume de *Bengale*, d'où il a été apporté à M. l'Abbé *Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

varia. An hujus speciei femina?

Habitat in *Bengalensi* regno, unde in museum D. *Aubry* allatus est.

62. LE LORIOT A TESTE RAYÉE.

Turdus luteo-rubescens; capite & collo inferiore nigricantibus, apicibus pennarum candicantibus; remigibus nigricantibus, oris exterioribus albis; rectricibus luteo-rubescantibus *ORIOLOUS* CAPITIS STRIATO.

Turdus ex nigro & luteo rubescens. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXII. sp. II.

Merula bicolor. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 624. hujus icon non satis accurata pag. 623.

Jonst. Avi. pag. 75.

Merula bicolor Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 144. N°. I.

Raj. Syn. Avi. pag. 67. N°. II.

Il est un peu moins gros & moins grand que le *Merle*. Il a aussi le bec plus court; & sa queue n'est pas si longue que celle du *Merle*. Ses pieds sont courts; & ses doigts sont proportionnellement fort longs. La tête, la gorge & la partie inférieure du col sont couvertes de plumes noirâtres, terminées de blanchâtre. La partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un jaune-rougeâtre. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue

Magnitudine & crassitie paululum *Merulæ* cedit. Rostrum donatur breviori. Cauda itidem quàm in *Merula* brevior est. Pedes breviusculi; digiti verò, servatâ proportionem, longi. Caput, guttur & collum inferius nigricant, apicibus pennarum candicantibus. Pars colli superior, dorsum, uropygium & rectrices caudæ superiores ex luteo rubescunt. Pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores eodem imbuuntur colore, sed dilutiore. Alarum rectrices

nigricant, & marginibus candidis præditæ sunt. Remiges similiter nigricantes, oris exterioribus albis. Caudam componunt duodecim rectrices luteo-rubescences. Rostrum pariter ex luteo rubescit. Pedes sunt lutei; ungues verò rubicundi. Locum in quo habitat, prorsus ignoro.

font de la même couleur, mais plus claire. Les couvertures des ailes sont noirâtres, & bordées de blanc. Les plumes des ailes sont pareillement noirâtres, & ont leur bord extérieur blanc. La queue est composée de douze plumes d'un jaune - rougeâtre. Le bec est de la même couleur. Les pieds sont jaunes; & les ongles rouges. J'ignore entièrement quel pays il habite.

** 63. LE JASEUR DE BOHEME.

Turdus cristatus, avellaneo-vinaceus; uropygio cinereo; ventre cinereo-albo ad vinaceum vergente; taniâ per oculos & gutture nigris; remigibus octo minoribus apice membranaceis; rectricibus apice luteis . . . BOMBYCILLA BOHEMICA.

Turdus cristatus, rostro brevî ad ortum lato, Europæus. *Klein. Avi. pag. 70. N°. 34. hujus icon non satis accurata pag. 70.*

Turdus cristatus aut *Bohemicus*. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 32.*

Bombycilla. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 229.*

Ampelis remigibus quibusdam apice membranaceo terminatis. *Faun. Suec. Linn. N°. 179.*

Ampelis. *Moehr. Avi. Gen. 29.*

Gnaphalus. *Gesn. Avi. pag. 520.*

Garrulus Bohemicus. *Gesn. Avi. pag. 703, in qua icon non satis accurata. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 796. hujus icon minimè accurata pag. 798.*

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 78. sp. 1.

Garrulus Bohemicus, vel *Picæ glandariæ* genus tertium. *Gesn. icon. Avi. pag. 27, in qua icon non satis accurata.*

Garrulus Bohemicus *Gesneri*, seu *Ampelis Aldrovandi*. *Jonst. Avi. pag. 28. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 43, sub titulo, Picæ glandariæ genus.*

Garrulus Bohemicus *Gesneri*, seu *Ampelides Aldrovandi*. *Charlet. Exer. pag. 76. N°. 5.*

Charlet. Onomazt. pag. 68. N°. 5.

Garrulus Bohemicus *Aldrovandi*. *Willugh. Ornith. pag. 90. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 85. Lit. A.

Garrulus Bohemicus Aldrovandi & Gefneri ; Bombycilla Schwenckfeldii ; Galerita varia ; Gallulus sylvestris ; Zinzirella. *Rzac. Auſt. Hiſt. nat. Pol. pag. 381.*

Fringilla criſtata , Xomotl dicta. *Klein. Avi. pag. 98. N°. 11.*

Avis Americana criſtata , Xomotl dicta. *Seb. Vol. II. pag. 66. hujus icon miniùs accurata Tab. LXV. Fig. 5.*

Fullo Eberi & Peuceri. *Schwenck.*

Microphœnix Fabri , Paduani. *Schwenck.*

Incendiaria Nonnullorum. *Schwenck.*

Geay de Bohême. *Alb. Tom. II. pag. 19 ; avec une figure mal coloriée Pl. 26.*

Les Grecs l'appellent Γράφαλος. Gefn. Schwenck.

Les Italiens en quelques endroits , BECCO-FRISONE ; & en d'autres , GALLETTO DEL BOSCO. Aldrov.

Les Oifeleurs Boulonnois , UCCELLO DEL MONDO NOVO. Aldrov.

Les Allemands , ZINZERELLE. Gefn. Aldrov. WIPSTERTZ. Gefn. Schwenck. SCHNEE-VOGEL. Schwenck. SILK-TAIL. Raj.

Les Allemands aux environs de Nuremberg , BEEMERLE. Gefn. BEHEMLE. Gefn. Aldrov. Schwenck. Rzac.

Les Siléſiens , SCHNEE-LESCHKE ; SEIDE-SCHWANTZ. Schwenck. SEYDEN-SCHWANTZ. Gefn. Rzac. Friſch.

Les Bohémiens , BRKOSLAW. Rzac.

Les Polonois , JEDWABNICZKA ; JEMIOLUCHA. Rzac.

Les Flamands , INCINERARIA. Aldrov.

Les Suédois , SIDEN-SWANTZ. Linn.

Les Anglois , BOHEMIAN JAY ; BOHEMIAN CHATTERER. Alb.

Il eſt un peu plus gros que l'*Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de ſept pouces trois lignes , & juſqu'à celui des ongles de ſix pouces dix lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long ; ſa queue deux pouces trois lignes ; ſon pied neuf lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , neuf lignes & demie : les laté-

Alaudam criſtatam craſſitie paululùm antecellit. Ipfius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam ſeptem pollices & tres lineas æquat , & ad extremos ungues ſex pollices & decem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque novem lineas longum eſt ; cauda duos pollices cum tribus lineis ; pes novem lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue

novem cum femi lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum intimum longitudine æmulatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. In universo corpore pennis vestitur serici instar mollissimis. In summo capite pennæ cæteris longiores sunt , easque Avis , cristæ in modum , erigere potest. Quæ basin mandibulæ superioris & guttur obtegunt , sunt nigræ. In utroque capitis latere tænia extat concolor , ab exortu rostri circiter ad occipitum usque protensa , & per oculum ducta. Synciput eleganti tingitur castaneo ; qui color utrinque supra oculos protenditur. Summum caput , occipitum , collum , pectus & latera vestiunt pennæ avellaneo-vinacæ. Genæ eodem imbuuntur colore , & aliquid castanei admixtum habent. Dorsi suprema pars , pennæ scapulares , alarumque tectrices superiores (exceptis tamen majoribus à corpore remotioribus) colore tinguntur avellaneo-vinaceo , sed quàm in pectore obscuriore. Pars dorsi inférieure

raux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a treize pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Tout son corps est couvert de plumes douces comme de la soie. Celles du sommet de la tête sont plus longues que les autres ; & l'Oiseau peut les redresser en forme de hupe. Celles qui couvrent la base du demi-bec supérieur & la gorge sont noires. De chaque côté de la tête est une bande de la même couleur , qui s'étend depuis l'origine du bec jusque vers l'occiput , en passant par les yeux. Le synciput est d'un beau marron ; cette couleur s'étend de chaque côté au-dessus des yeux. Le sommet de la tête , l'occiput , le col , la poitrine & les côtés sont d'une couleur de noisette - vineuse. Les joues sont de la même couleur , & mêlées d'une légère teinte de marron. La partie supérieure du dos , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles (excepté les grandes les plus éloignées du corps) sont d'une couleur de noisette - vineuse , mais plus sombre que celle de la poitrine. La partie inférieure du dos , le croupion & les couvertures du

dessus de la queue font d'un joli cendré. Le haut du ventre & les jambes font d'un gris-blanc tirant sur le vineux. Le bas-ventre est blanc. Les couvertures du dessous de la queue font d'un beau-marron : celles du dessous des aîles font d'un gris-blanc : les grandes du dessus les plus éloignées du corps font noirâtres & terminées de blanc. Les grandes plumes des aîles sont pareillement noirâtres : la troisième & la quatrième sont terminées de blanc du côté extérieur seulement ; & les suivantes, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la neuvième inclusivement, sont terminées de jaune aussi du côté extérieur seulement : les moyennes sont d'un cendré foncé ; leur bout est blanc du côté extérieur seulement, & leur tige est terminée par une petite membrane plate, oblongue & d'un rouge vif. La queue est composée de douze plumes cendrées à leur origine, ensuite noirâtres, & terminées de jaune éclatant. L'iris des yeux est rouge. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. Il se nourrit de fruits ; il mange sur-tout beaucoup de *Raisins* & de *Bayes* de *Genévrier*. On le trouve en *Bohême* & en différens cantons d'*Allemagne*. Du cabinet de M. de Reaumur,

ma, uropygium & superiores caudæ rectrices sunt eleganter cinereæ. Venter supremus & crura ex cinereo-albo ad vinaceum vergunt. Venter imus albet. Rectrices caudæ inferiores eleganter castaneæ : pennæ alas subtus tegentes cinereo-albæ : rectrices alarum superiores majores à corpore remotiores nigricantes, apicibus albis. Remiges majores pariter nigricant : tertia & quarta albo terminantur, sed in latere exteriori tantum ; quæ sequuntur, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, luteo sunt terminatæ, sed, ut suprâ, in latere tantum exteriori : minores sunt saturatè cinereæ, apicibus in latere tantum exteriori albis, & scapis donantur exiguâ membranâ planâ, oblongâ, coccineâ terminatis. Caudam componunt duodecim rectrices in exortu cinereæ, deinde nigricantes, apicibus splendidè luteis. Oculorum irides rubræ. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Fructibus victitat ; *Uvis* præcipuè & *Juniperi Baccis* maximè delectatur. Habitat in *Bohemia* & variis *Germaniæ* regionibus. Ex museo *Realmuriano*.

64. LE JASEUR DE LA CAROLINE.

Turdus cristatus, avellaneo-vinaceus ; uropygio cinereo ; ventre pallidè luteo ; tæniâ per oculos nigrâ , marginibus albis ; remigibus octo minoribus apice membranaceis ; rectricibus apice luteis . . . BOMBYCILLA CAROLINENSIS.

Turdus Garrulus Caroliniensis. Klein. Avi. pag. 70. N°. 35.

Caquantototl. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 55. cap. CCXV.

Raj. Syn. Avi. pag. 174.

Jaseur de la Caroline. Catesb. Tom. I. pag. 46 ; avec une figure passable Pl. 46.

Edwards. Glanur. pag. 66. Chap. XXXII ; avec une figure exacte Pl. 242.

Les Anglois l'appellent CHATTERER. Catesb. CHATTERER OF CAROLINA. Edwards.

Les Mexiquains , CAQUANTOTOTL. Fern. Raj.

Præcedenti nonnihil craf-
fitie cedit. Ipsiꝯ longitudo
ab apice rostri ad caudam
extremam sex pollices & no-
vem circiter lineas explet ,
& ad extremos ungues sex
pollices cum lineis binis.
Rostrum ab ipsius apice ad
oris angulos usque octo li-
neas longum est ; cauda duos
pollices cum tribus lineis ;
pes octo lineas ; & trium di-
gitorum anticorum medius
cum ungue novem lineas :
laterales paulò sunt brevio-
res ; posticus autem anti-
corum intimi longitudinem
adæquat. Alæ complicatæ
nonnihil ultra mediam cau-
dæ longitudinem extendun-
tur. Supra basin mandibulæ

Tome II.

Il est un peu moins gros que
le précédent. Sa longueur de-
puis le bout du bec jusqu'à ce-
lui de la queue est d'environ six
pouces neuf lignes , & jusqu'à
celui des ongles de six pouces
deux lignes. Son bec depuis son
bout jusqu'aux coins de la bou-
che a huit lignes de long ; sa
queue deux pouces trois lignes ;
son pied huit lignes ; & celui du
milieu des trois doigts anté-
rieurs , joint avec l'ongle , neuf
lignes : les latéraux sont un
peu plus courts ; & celui de
derrière est de la même lon-
gueur que l'intérieur de ceux
de devant. Ses aîles , lorsqu'el-
les sont pliées , s'étendent un
peu au-delà de la moitié de la
longueur de la queue. Au-des-

V u

fus de la b  se du demi-bec sup  rieur est une bande transversale, noire, qui s'  tend de chaque c  t   de la t  te jusque vers l'occiput, en passant par les yeux. Cette bande est bord  e dessus & dessous par une petite ligne blanche. Les plumes du sommet de la t  te sont plus longues que les autres, & l'Oiseau les redresse en forme de hupe ou les abaisse selon sa volont  . La t  te, la gorge & le col sont d'une couleur de noisette-vineuse. La poitrine est d'une couleur beaucoup plus claire & presque blanche. La partie sup  rieure du dos & les plumes scapulaires sont d'une couleur de noisette-vineuse tr  s-fonc  e. La partie inf  rieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un joli cendr   clair. Le ventre, les c  t  s & les jambes sont d'un jaune p  le. Les couvertures du dessous de la queue sont blanch  tres. Celles du dessus des a  les sont cendr  es ; il faut cependant en excepter les grandes les plus   loign  es du corps, qui sont noir  tres. Les plumes des a  les sont d'un cendr   fonc  , & ont leur bord ext  rieur d'un cendr   clair : les trois plus proches du corps ont leurs barbes int  rieures blanches ; & les huit suivantes ont leur tige ter-

superioris t  nia adest transversa, nigra, in utroque capitis latere circiter ad occipitium usque protensa & per oculos ducta ; qu   t  nia superne & infern   lineol   donatur alb  , margines concolores efficiente. In summo capite penn   sunt c  teris longiores, easque, crist   in modum, erigit Avis aut illas ad libitum componit. Caput, guttur & collum colore tinguntur avellaneo-vinaceo. Pectus colore imbitur dilutius multo & fer   candido. Dorsi suprema pars & scapulares penn   sunt saturatissim   avellaneo-vinace  . Dorsum infimum, uropygium & rectrices caud   superiores eleganti cinereo diluto tinct  . Venter, latera & crura pallid   flavent. Inferiores caud   rectrices candicant. Penn   alas superne cooperientes cinere  , exceptis tamen majoribus    corpore remotioribus nigricantibus. Alarum remiges saturat   cinere  , oris exterioribus dilut   cinereis : tres corpori viciniore pinnulis donantur interioribus albis ; octo proxim   sequentes scapis pr  dit   sunt exigu   membran   plan  , oblong  , coccine   terminatis. Caudam

componunt duodecim rectrices cinereo colore tinctæ, qui color sensim atque sensim fit saturatior, versùs uniuscujusque rectricis apicem procedendo; apex autem cujuslibet rectricis splendide luteus est. Rostrum nigricans. Pedes, unguesque nigri.

Fœmina à mare discrepat coloribus non ita splendentibus.

Habitant in Carolina.

XXIII.

Genus Cotingæ. (1).

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Rostrum rectum, superne convexum; basis latitudine crassitiem superante:

Mandibula superior apice utrinque emarginata.

(1) *Cotinga*, nomen Americanum, quibusdam hujus generis speciebus inditum.

minée par une petite membrane plate, oblongue & d'un rouge très-vif. La queue est composée de douze plumes d'un cendré, qui devient d'autant plus foncé, qu'il approche du bout de chaque plume, lequel est d'un jaune éclatant. Le bec est noirâtre. Les pieds & les ongles sont noirs.

La femelle diffère du mâle par ses couleurs, qui sont moins vives.

On les trouve à la Caroline.

XXIII.

Le genre du Cotinga. (1).

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Le bec droit, convexe en-dessus, plus large qu'épais à sa base:

Les bords de la mandibule supérieure échancrés vers le bout.

(1) *Cotinga*, nom qu'on donne en Amérique à quelques espèces de ce genre.

Voyez Pl. XXXIV. Fig. 1.

Cotinga superne splendide cœrulea, infernè purpuro-violacea; remigibus, rectricibusque nigris; oris exterioribus remigum minorum & rectricum cœruleis COTINGA.

Manakin blue à Poitrine pourpre. *Edwards. Glanur. pag. 65. Chap. XXXI; avec une assez bonne figure Pl. 241.*

Les Anglois l'appellent PURPLE-BREADED BLUE MANAKIN. *Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur de la *petite Grive*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue deux pouces dix lignes; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a treize pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, les petites du def-

Turdum minorem crassitie circiter æquat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & totidem lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices cum novem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est; cauda duos pollices cum decem lineis; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extremum longitudine æmulator. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & decem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium;

latera, crura, pennæ caudam superne & infernè tegentes, alarumque rectrices superiores minores sunt splendidissimè cœruleæ. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, concolores. Guttur, collum inferius, pectus & venter eleganti tinguntur purpuro-violaceo. Hujus speciei Avium aliquot taniâ donantur in pectore transversâ, eodem ac dorsum cœruleo tinctâ, & maculis quibusdam in parte colli inferiore ac ventre roseis. Pennæ alas subtus tegentes sunt nigræ, marginibus cœruleo-viridibus : rectrices alarum superiores majores similiter nigræ, marginibus exterioribus & ad apicem cœruleis. Remiges nigræ, oris exterioribus minorum cœruleis. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Brasilia*, unde missa ad *Serenissimum Principem de Craon*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

fus de l'aîle, le bord de l'aîle vers le pli qui répond à celui du poignet, les côtés & les jambes sont d'un bleu très-éclatant. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine & le ventre sont d'un très-beau pourpre-violet. Quelques-uns ont à la poitrine une bande transversale, du même bleu que celui du dos, & quelques taches couleur de rose à la partie inférieure du col & au ventre. Les couvertures du dessous de l'aîle sont noires & bordées d'un bleu-verd ; les grandes du dessus sont aussi noires & bordées de bleu extérieurement & à leur bout. Les plumes des aîles sont noires, & le bord extérieur des moyennes est bleu. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes des aîles. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Brésil*, d'où il a été envoyé à *M. le Prince de Craon*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

** 2. LE COTINGA DES MAYNAS.

Voyez Pl. XXXIV. Fig. 2.

Cotinga splendidè cœrulea, cœruleo-Beryllino varians ; gutture saturatè violaceo ; remigibus fusco-nigricantibus ;

interiùs albis, oris exterioribus cœruleis; rectrice extimâ
penitùs fusco-nigricante COTINGA MAYNA-
NENSIS.

Il est un peu plus petit que le *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes & demie de long; sa queue deux pouces dix lignes; son pied neuf lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a treize pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont couvertes de plumes fort étroites & assez longues, brunes à leur origine, & terminées de bleu éclatant, mais de façon qu'il n'y a que cette dernière couleur qui paroît, lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. La gorge est d'un violet foncé. Le dos, le croupion, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre

Turdo Iliaco nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & quatuor lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum quatuor lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & decem lineas; pes novem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem anticorum intimi longitudinem æquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput & collum superius vestiunt pennæ strictissimæ, longiusculæ, in exortu fuscæ, apice splendide cœruleæ, ita tamen ut, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, cœruleus color solus appareat. Guttur est saturatè violaceum. Dorsum, uropygium, pars colli inferior,

pectus, venter & latera pen-
nis vestiuntur in exortu al-
bis, dein violaceo - purpu-
reis, apice splendide cœru-
leis, ita ut, pennis aliæ aliis
incumbentibus, nil nisi cœ-
ruleus color appareat. Cau-
dæ tectrices superiores & in-
feriores concolores. Crura
fusca. Alarum tectrices su-
periores minores eodem ac
dorsum tinguntur cœruleo,
attamen sunt in exortu fus-
cæ : majores in latere exte-
riore & apice cœruleæ, in
latere interiore fusco-nigri-
cantes : tectrices alarum in-
feriores fusco - nigricantes,
cœruleo terminatæ, excep-
tis tamen majoribus candi-
dis. Remiges majores fusco-
nigricantes, oris exterioribus
ab exortu pennæ ad mediam
circiter longitudinem usque
cœruleis, latere autem in-
teriore in exortu albo ; quæ
albedo eò magis versùs pen-
næ apicem protenditur, quò
remix fit corpori vicinior :
minores, exceptis quatuor
corpori finitimis, concolo-
res ; attamen oris exteriori-
bus cœruleis per totam lon-
gitudinem præditæ sunt : qua-
tuor tandem corpori vici-
niores sunt in latere exte-
riore & apice cœruleæ, in
latere verò interiore fusco-

& les côtés sont couverts de
plumes blanches à leur origine,
ensuite d'un violet-pourpré, &
terminées d'un bleu éclatant,
de façon aussi qu'il n'y a que
cette dernière couleur qui pa-
roît, lorsque les plumes sont
couchées les unes sur les autres.
Les couvertures du dessus & du
dessous de la queue sont de la
même couleur. Les jambes sont
brunes. Les petites couvertures
du dessus des aîles sont du mê-
me bleu que le dos, & ont ce-
pendant leur origine brune : les
grandes sont bleues du côté ex-
térieur & à leur bout, & leur
côté intérieur est d'un brun-noi-
râtre : celles du dessous sont
d'un brun-noirâtre & terminées
de bleu, excepté les plus gran-
des, qui sont blanches. Les
grandes plumes de l'aîle sont
d'un brun - noirâtre ; leur bord
extérieur est bleu depuis leur
origine jusque vers la moitié de
leur longueur, & leur côté in-
térieur est blanc à leur origi-
ne, mais cette couleur s'étend
d'autant plus loin, que la plume
est plus proche du corps : les
moyennes, si l'on en excepte les
quatre plus proches du corps,
sont de la même couleur ; mais
leur bord extérieur est bleu dans
toute la longueur de la plume :
enfin les quatre plus voisines
du corps sont bleues du côté

extérieur & à leur bout, & leur côté intérieur est d'un brun-noirâtre. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un brun-noirâtre dans leur milieu, & leurs bords, ainsi que leur bout, sont bleus : les quatre suivantes de chaque côté sont d'un brun-noirâtre, & ont leur bord extérieur bleu : & la plus extérieure de chaque côté est toute entière d'un brun-noirâtre. Le bleu de cet Oiseau, vu dans un certain jour, se change en un bleu d'Aigue-marine. Le bec est brun. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve dans le pays des *Maynas*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Godin*.

nigricantes. Cauda duodecim constat rectricibus, quarum binæ intermediæ sunt in medio fusco - nigricantes, marginibus & apice cœruleis : quatuor utrinque sequentes fusco - nigricantes, oris tantum exterioribus cœruleis : utrinque tandem extrema penitus fusco - nigricans. In illa Ave cœruleus color, pro varia ad lucem obversione, cœruleo-Beryllino colore variat. Rostrum fuscum. Pedes, unguisque nigri. Habitat in *Maynansensi* regione, unde in *museum Realmurianum* allata est à *D. Godin*.

** 3. LE COTINGA DE CAYENNE.

Voyez Pl. XXXIV. Fig. 3.

Cotinga superne nigra, apicibus pennarum cœruleo-Beryllinis, infernè cœruleo-Beryllina; gutture & collo inferiore purpuro - violaceis; remigibus, rectricibusque nigris, oris exterioribus cœruleo-Beryllinis; rectrice extimâ penitus nigra COTINGA CAYANENSIS.

Lanius Oocolin dictus. *Klein. Avi. pag. 54. N° 6.*

Avis de Oocolin dicta, species Pici. *Seb. Vol. II. pag. 102. hujus icon non satis accurata Tab. XCVI. Fig. 3.*

Quereiva. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 557.*

Jonst. Avi. pag. 125.

Il est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. Sa longueur

Turdum Iliacum crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo

tudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem cum semi lineas longum est; cauda tres pollices; pes decem lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem lateralium longitudinem nonnihil antecellit. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Pennæ caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestientes, sicut & tectrices caudæ superiores & inferiores, sunt in exortu nigrae, apice verò cœruleo-Beryllinae, ita ut, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, non multum nigri appareat. Guttur & collum inferius splendidissimo tinguntur purpureo-violaceo. Pectus, venter & latera pennis vestiuntur, sicut in dorso, in exortu nigris, apice verò cœruleo-Beryllinis, ita tamen ut, dum pennæ aliæ aliis incum-

Tome II.

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue trois pouces; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est tant soit peu plus long que ces derniers. Il a treize pouces huit lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les plumes qui couvrent la tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion, ainsi que les couvertures du dessus & du dessous de la queue, sont noires à leur origine & d'un bleu d'Aigue-marine à leur bout, de façon que, lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres, il paroît fort peu de noir. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un pourpre-violet très-éclatant. La poitrine, le ventre & les côtés sont couverts de plumes, comme sur le dos, noires à leur origine & d'un bleu d'Aigue-marine à leur bout, mais de façon que le noir ne paroît point du tout, lorsqu'

Xx

que les plumes sont couchées les unes sur les autres. Les plumes qui couvrent les jambes sont noires & terminées de bleu d'Aigue-marine. Les couvertures du dessus & du dessous des aîles sont de la même couleur, excepté les plus grandes, qui, ainsi que les plumes scapulaires, sont noires & n'ont qu'une étroite bordure de ce bleu. Les plumes de l'aîle sont noires : les grandes sont bordées extérieurement & très-étroitement de bleu d'Aigue-marine depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur seulement, & les moyennes sont bordées de cette couleur dans toute la longueur de leur côté extérieur. La queue est composée de douze plumes noires : les deux du milieu ont la même bordure que les plumes de l'aîle, mais du côté extérieur & intérieur; les quatre suivantes de chaque côté n'ont cette bordure que du côté extérieur; & la plus extérieure de chaque côté est toute noire & sans bordure. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Brésil* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

Brasilia & Cayana, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. des Essars*.

bunt, nulla appareat nigredo. Quæ crura obtegunt, sunt nigræ, cœruleo-Beryllino terminatæ. Alarum tectrices superiores & inferiores minores & mediæ concolores; majores verò, sicut & scapulares pennæ, sunt nigræ, & strictissimâ margine cœruleo-Beryllinâ præditæ. Alarum remiges nigræ : majores oris exterioribus donantur strictissimis, cœruleo-Beryllinis, ab exortu pennæ ad mediani circiter longitudinem usque protensis; minores verò marginibus concoloribus, in latere exteriori per totam longitudinem extensis, præditæ sunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigræ, quarum binæ intermediæ, sicut & remiges, oris donantur cœruleo-Beryllinis, sed in utroque latere, exteriori scilicet & interiori; quatuor utrinque sequentes marginibus cœruleo-Beryllinis in latere tantum exteriori præditæ sunt; utrinque tandem extrema est penitus nigra & margine cœruleo-Beryllinâ destituta. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in

4. LE COTINGA DU MEXIQUE.

Cotinga cyaneo & subnigro in toto corpore varia
COTINGA MEXICANA.

Caxcaxtototl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 46. cap. CLVIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 167. N°. 16.

Les Mexiquains l'appellent CAXCAXTOTOTL; & quelques-uns, HUEITZANATL. Fern.

Magnitudine *Sturnum* æmulatur. In toto corpore cyaneo, subnigroque colore variegatur. Caput habet parvum; oculos nigros, quorum irides luteæ sunt; rostrum quoque nigrum. Vivit in plagis temperatis, qualis est *Mexicensis*, aut paulò calidioribus.

Il est de la grandeur d'un *Etourneau*. Il est varié par tout le corps de bleu & de noirâtre. Sa tête est petite. Ses yeux sont noirs; & leur iris est jaune. Le bec est pareillement noir. Il vit dans des lieux tempérés, tel qu'est le *Mexique*, ou même dans des regions un peu plus chaudes.

** 5. LE COTINGA POURPRE.

Voyez Pl. XXXV. Fig. 1.

Cotinga splendide purpurea; remigibus albis, septem primoribus apice fuscis; rectricibus lateralibus interiùs roseis; rectricibus alarum majoribus longissimis, rigidis, carinatis CONTINGA PURPUREA.

Turdum minorem crassitie circiter æmulatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum novem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda duos

Il est à peu près de la grosseur de la *petite Grive*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue deux pouces cinq lignes;

X x ij

son pied neuf lignes & demie ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a quatorze pouces trois lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Tout son corps, sçavoir la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus & du dessous de la queue, est d'un pourpre très-éclatant ; cependant l'origine de chaque plume est blanche ; mais cette couleur ne paroît pas, lorsqu'elles sont couchées les unes sur les autres. Les couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur : les plus grandes sont très-longues, roides & courbées en gouttière ; leurs barbes sont détachées les unes des autres ; & leur tige est blanche. Les jambes sont de cette dernière couleur mêlée d'un peu de pourpre. Les couvertures du dessous des aîles sont tout-à-fait blanches. Les plumes des aîles sont de la même couleur, excepté le bout des sept premières, qui est brun.

pollices & quinque lineas ; pes novem cum semi lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & trium linearum ; alæ verò complicatæ tres quartas longitudinis caudæ partes attingunt. In universo corpore, capite scilicet, gutture, collo, dorso, uropygio, pectore, ventre, lateribus, scapularibus pennis & rectricibus caudæ superioribus & inferioribus, splendidissimo tingitur purpureo ; quælibet tamen penna in exortu albet ; ista autem albedo, pennis aliæ aliis incumbentibus, nullo modo apparet. Rectrices alarum superiores concolores : majores sunt longissimæ, rigidæ & carinatæ ; ipsarum pinulæ nequaquam inter se connectuntur ; & scapi albet. Crura quoque alba, cum aliqua purpurei mixtura. Alarum rectrices inferiores penitus albæ. Remiges concolores, exceptis septem primorum apicibus fuscis. Duodecim rectricibus cauda con-

stat : binæ intermediae sunt splendide purpureæ : laterales omnes in latere exteriori concolores, in interiori vero roseæ. Rostrum griseofuscum. Pedes, unguesque nigricantes. Habitat in *Cayana*, unde in *musæum Reaumurianum* missa à *D. des Essars*.

La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un pourpre éclatant : toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & d'une couleur de rose du côté intérieur. Le bec est d'un gris-brun. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

** 6. LE COTINGA GRIS-POURPRE.

Voyez Pl. XXXV. Fig. 2.

Cotinga è purpureo & cinereo varia; remigibus fuscis, interioribus oblique candidis; rectricibus fuscis; rectricibus alarum majoribus longissimis, rigidis, carinatis COTINGA CINEREO-PURPUREA.

Præcedentem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & quinque lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem cum semi lineas longum; cauda duos pollices cum quatuor lineis; pes novem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas : laterales paulò sunt breviores; post-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces cinq lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue deux pouces quatre lignes; son pied neuf lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est

de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a quatorze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont variées de cendré & de pourpre. Les couvertures du dessous de la queue sont couleur de rose. Celles du dessous des ailes sont blanches: celles du dessus sont des mêmes couleurs que le dos, excepté les plus grandes, qui sont pourpres, & qui ont leur tige blanche. Ces dernières sont très-longues, roides & courbées en gouttière; leurs barbes sont détachées les unes des autres. Les grandes plumes de l'aile sont brunes du côté extérieur & à leur bout; & blanches obliquement du côté intérieur depuis leur origine jusqu'à vers les deux tiers de leur longueur: les moyennes sont de la même couleur, excepté qu'elles ont le bord extérieur blanc. La queue est composée de douze plumes tout-à-fait brunes. Le bec est d'un gris-brun. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été

cus autem anticorum extimi longitudinem æquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, tectrices caudæ superiores, pectus, venter, latera & crura purpureo & cinereo variegantur. Inferiores caudæ tectrices roseo colore tinguntur. Pennæ alas subtus tegentes albescent. Alarum tectrices superiores dorso concolores, exceptis tamen majoribus purpureis, & scapo albo præditi: quæ pennæ purpureæ longissimæ sunt, rigidæ & carinatæ; & ipsarum pinnulæ nullo modo inter se connectuntur. Remiges majores in latere exteriori & apice fuscæ, in latere verò interiori ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque obliquè candidæ: minores concolores, attamen oris exterioribus albis præditæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus penitus fuscis. Rostrum griseo-fuscum. Pedes, unguesque nigricantes. Habitat

in *Cayana*, unde in *museum* envoyé à *M. de Reaumur* par
Realmurianum missa est à *D. M. des Essars.*
des Essars.

7. LE COTINGA ROUGE.

Cotinga anteriùs fordidè rubra, posteriùs coccinea; vertice
coccineo; remigibus obscurè rubris, ad apicem subnigris;
rectricibus coccineis, apice nigris COTINGA
RUBRA.

Turdus totus ruber. *Klein. Avi. pag. 68. N°. 12.*

Fringillæ adfinis. *Moehr. Avi. Gen. 101.*

Avicula de Pipizton dicta. *Seb. Vol. I. pag. 92. hujus icon minùs accurata*
Tab. 57. Fig. 4.

Oiseau rouge de Surinam. *Edwards. Tom. I. pag. XXXIX; avec une*
figure exacte Pl. 39.

Crassitie Coccothraustem
nostratem circiter æquat. Ip-
sius longitudo ab apice rostri
ad caudam extremam septem
circiter pollices explet, &
ad extremos ungues sex pol-
lices. Rostrum ab ipsius apice
ad oris angulos novem lineas
longum est; cauda duos pol-
lices cum quinque lineis;
pes septem cum semi lineas;
& trium digitorum antico-
rum medius cum ungue sep-
tem lineas: laterales paulò
sunt breviores; & posticus
anticorum extimum longitu-
dine æmulatur. Alæ compli-
catæ tertiam longitudinis
caudæ partem non attingunt.
Caput superius, dorsi pars
infima, uropygium, venter
imus, crura & tectrices

Il est à peu près de la gros-
seur de notre *Gros-bec*. Sa lon-
gueur depuis le bout du bec jus-
qu'à celui de la queue est d'en-
viron sept pouces, & jusqu'à
celui des ongles de six pouces.
Son bec depuis son bout jus-
qu'aux coins de la bouche a neuf
lignes de long; sa queue deux
pouces cinq lignes; son pied
sept lignes & demie; & celui
du milieu des trois doigts anté-
rieurs, joint avec l'ongle, sept
lignes: les latéraux sont un peu
plus courts; & celui de derriere
est de la même longueur que
l'extérieur de ceux de devant.
Ses aîles, lorsqu'elles sont
pliées, ne s'étendent pas tout-
à-fait jusqu'au tiers de la lon-
gueur de la queue. Le dessus
de la tête, la partie inférieure

du dos, le croupion, le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un rouge d'écarlate. Les côtés de la tête, la gorge, le col, la partie supérieure du dos, les plumes scapulaires, la poitrine & le haut du ventre sont d'un rouge terni, plus sombre aux parties supérieures du col & du dos qu'ailleurs, excepté autour du rouge éclatant de la tête, où il est encore plus obscur. Les couvertures du dessus des ailes sont de ce même rouge terni; & cette couleur dégénère peu à peu en brunâtre à mesure qu'elle approche du bout de chaque plume. Les plumes des ailes sont pareillement d'un rouge terni, qui dégénère de même en approchant du bout de chaque plume, qui est presque noir. La queue est composée de douze plumes d'un rouge d'écarlate, terminées de noir. Le bec est d'un rouge terni. Les pieds & les ongles sont d'un jaune sale : de plus la partie postérieure des pieds est garnie de petits poils depuis le talon jusqu'aux doigts. On le trouve à *Surinam*.

caudæ superiores & inferiores coccineo colore tinguntur. Caput ad latera, guttur, collum, dorsum supremum, pennæ scapulares, pectus & venter supremus sordido imbuuntur rubro, in collo superiore & dorso supremo quàm in aliis corporis partibus obscuriore, at tamen circa summi capitis coccineum colorem adhuc magis obscuro. Tectrices alarum superiores sordido quoque tinguntur rubro, qui color sensim atque sensim, versùs pennæ apicem procedendo, ad subfuscum vergit. Remiges sunt quoque sordide rubræ; ipsarum autem color gradatim fit obscurior, versùs remigis apicem procedendo; apex verò subniger est. Caudam componunt duodecim rectrices coccineæ, apice nigræ. Rostrum sordide rubrum. Pedes, unguisque sordide flavi : pedes insuper in parte posteriore à calcaneo ad digitos usque exiguis pilis obsiti sunt. Habitat in *Surinamensi* regione.

8. LE COTINGA GRIS.

Cotinga superne cinerea , infernè alba , ad griseum dilutum vergens ; taniâ utrinque per oculos nigrâ ; remigibus nigricantibus ; rectricibus nigris , apice albis . . . COTINGA CINEREA.

Guiraru Nheengeta Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 209, in qua hujus icon minimè accurata.*

Jonst. Avi. pag. 143. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 59.

Guiraru Nheengeta Brasiliensis Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag. 166. N°. 5.*

Oenanthe Americana Guiraru Nheengeta Brasiliensibus dicta Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 170.*

Les Brasiliens l'appellent GUIRARU NHEENGETA. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Turdum Iliacum magnitudine circiter æquat. Rostrum habet plus dimidio pollice longum. Totum caput, guttur, collum, pectus, venter & latera pennis vestiuntur albis, ad griseum dilutum accedentibus. Tectrices caudæ inferiores concolores. In utroque capitis latere tania extat oblonga, nigra, à rostro versùs occipitium usque protensa, & per oculos ducta. Dorsum, uropygium & crura cinerea sunt. Scapulares pennæ quoque cinereæ. Caudam superne cooperientes albæ. Alarum tectrices superiores, sicut & remiges, nigricantes. Caudam componunt rectrices nigerrimæ, apicibus albis præditæ. Ocu-

Tome II.

Il est à peu près de la grosseur du *Mauvis*. Son bec a plus d'un demi-pouce de long. Toute la tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre & les côtés sont couverts de plumes d'un blanc tirant sur le gris clair. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande noire, oblongue, qui s'étend depuis le bec jusque vers l'occiput, en passant par les yeux. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les jambes sont cendrées. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches. Celles du dessus des aîles & les plumes des aîles sont noirâtres. La queue est composée de plumes d'un très-beau noir, & terminées de

Y y

blanc. La prunelle des yeux est noire ; leur iris est d'une belle couleur de Saphir. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Brésil*.

lorum pupilla nigra ; ipsorum irides Sapphirinæ. Rostrum, pedes, unguisque nigri. Habitat in *Brasilia*.

9. LE COTINGA TACHETÉ.

Cotinga cinerea, nigricante & virescente admixtis ; capite obscurè fusco ; remigibus nigricantibus ; rectricibus cinereo & nigricante variis, viriditate admixtâ. (*Mas*).

Cotinga in toto corpore nigricans, fusco & dilutè virenti admixtis. (*Fœmina*.) COTINGA NÆVIA.

Guira-punga. *Pison. Hist. Nat. pag. 93*, in qua maris & fœminæ icones à *Marcgravio mutuatae*.

Guira-punga Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 201*, maris & fœminæ icones pessimæ pag. 202.

Jonst. Avi. pag. 137. hujus icones à Marcgravio mutuatae, maris Tab. 59, & fœminæ Tab. 57, sub titulo, *Mitaporanga*.

Guira-punga Brasiliensibus Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 147, maris icon à *Marcgravio mutuata* Tab. XXXVIII.

Raj. Syn. Avi. pag. 166. N°. 4.

Les Portugais l'appellent AVE DE VERANO. Marcgr. Jonst. Willugh.

Les Brâsiliens, GUIRA-PUNGA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Il est plus gros que la *Litorne* & même presque aussi gros qu'un *Pigeon*. Son bec a un pouce de long ; l'ouverture en est fort grande, & les coins de la bouche s'étendent jusque sous les yeux. Sa queue est longue de trois pouces ; & ses pieds de plus d'un pouce. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. La tête est couverte de plumes d'un brun obscur. Celles qui couvrent la

Turdum Pilarem magnitudine Superat & *Columbam* ferè adæquat. Rostrum habet pollicem longum ; os amplum, quod aperire potest usque sub oculos ; caudam tres pollices longam ; pedes plus pollice longos. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multùm protenduntur. Caput obscurè fuscis vestitur pennis. Totum colum, guttur, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera

& crura cinereis cooperiuntur pennis, quibus, potissimum in dorso, nigricantes admixtæ sunt, ac in uropygio etiam virescentes. Scapulares pennæ & tectrices caudæ superiores & inferiores concolores. Sub gutture & in collo inferiore multas habet pollicem longas, propendentes particulas carneas, nigras, figurâ spiculi hastæ vel quasi ligulæ. Alarum tectrices superiores minores sunt nigræ; majores nigricantes, quibus obscurè virescentes admiscuntur. Remiges quoque nigricant. Cauda rectricibus constat cinereo & nigricante variis, paucâ viriditate admixtâ. Oculorum irides è nigro cœrulescunt. Rostrum, unguisque nigri; pedes verò nigricantes.

gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes, sont cendrées & mêlées, sur-tout sur le dos, de plumes noirâtres, & de quelques-unes verdâtres sur le croupion. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Sous la gorge & à la partie inférieure du col pendent plusieurs appendices charnus, noirs, longs d'un pouce, & qui imitent par leur figure un fer de lance ou une espee d'éguillette. Les petites couvertures du dessus des aîles sont noires : les grandes sont noirâtres & mêlées de quelques-unes d'un verd obscur. Les plumes des aîles sont pareillement noirâtres. Celles de la queue sont variées de cendré & de noirâtre, & mêlées d'un peu de verd. L'iris des yeux est

d'un noir tirant sur le bleu. Le bec & les ongles sont noirs ; & les pieds noirâtres.

Fœmina magnitudine paululum *mari* cedit. Ab illo quoque colore discrepat. Per universum corpus pennis vestitur nigricantibus, quibus fuscæ & dilutè virentes sunt mixtæ : magis tamen fuscus est in dorso color ; in gutture, collo inferiore, pectore & ventre magis dilutè virens. Sub gutture & in col-

La *femelle* est un peu plus petite que le *mâle*. Elle en diffère aussi par sa couleur. Tout son corps est couvert de plumes noirâtres, mêlées de quelques plumes brunes & de quelques autres d'un verdâtre clair : le brun domine sur le dos ; & le verdâtre clair sur la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine & le ventre. Elle n'a point

sous la gorge ni à la partie inférieure du col ces appendices charnus, qui pendent sous la gorge du *mâle*. Du reste elle lui ressemble assez.

Cet Oiseau a la voix forte, & se fait entendre de très-loin; mais ce n'est qu'au milieu de l'été, sçavoir aux mois de Décembre & de Janvier, & cela pendant cinq ou six semaines seulement : pendant les autres mois on ne l'entend point du tout. On le trouve au *Brésil*.

lo inferiore propendentibus particulis caret carneis, quibus *mas* præditus est. Reliqua ut in *mare* se habent.

Fortem clamorem edit; ipsiusque sonus longè auditur. Clamat autem solum mediâ æstate, Decembre & Januario mensibus, per quinque aut sex septimanas; reliquis mensibus non auditur. Habitat in *Brasilia*.

10. LE COTINGA BLANC.

Cotinga in toto corpore alba COTINGA ALBA.

Guira-panga. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 557.*
Jonst. Avi. pag. 125.

Il est d'une grandeur moyenne. Tout son corps est couvert de plumes blanches. Il a la voix très-forte, & se fait entendre presque à une demi-lieue. On le trouve au *Brésil*.

Modicâ magnitudine donatur. In toto corpore albet. Stentoream habet vocem; quæ ad dimidiam pœnè leucam exauditur. Habitat in *Brasilia*.

SECTIO II.

Eæ quæ rostro donantur horizontaliter basi compresso & ferè triangulari.

HÆc sectio unico constat genere, *Muscicapæ* scilicet.

SECTION II.

Ceux dont le bec est comprimé horizontalement à sa base & presque triangulaire.

IL n'y a dans cette section qu'un seul genre, qui est celui du *Gobe-mouche*.

Genus Muscicapæ.

Le genre du Gobe-mouche.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis
 destituti; tres scilicet an-
 tici, posticus unus; om-
 nes circiter usque ad exor-
 tum discreti:

Crura ad calcaneum usque
 plumosa:

Rostrum rectum, horizon-
 taliter basi compressum,
 ferè triangulare:

Mandibula superior apice
 utrinquè emarginata.

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de mem-
 branes; trois devant, un der-
 rière; tous séparés environ
 jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plu-
 mes jusqu'au talon:

Le bec droit, comprimé hori-
 zontalement à sa bâte, &
 presque triangulaire:

Les bords de la mandibule su-
 périeure échancrés vers le
 bout.

** I. LE GOBE-MOUCHE.

Voyez Pl. XXXV. Fig. 3.

Muscicapa superne griseo-fusca, infernè albicans; collo in-
 feriore & pectore maculis longitudinalibus griseo-fuscis
 insignitis; rectricibus alarum inferioribus dilutè rufescen-
 tibus; rectricibus griseo-fuscis . . . MUSCICAPA.

Curruca subfusca. Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 22.

*Currucis, seu Ficedulis cognata Avicula. Gesn. Avi. pag. 629, in qua
 hujus icon non satis accurata.*

Gesn. icon. Avi. pag. 47, in qua eadem icon.

Sylvia pestilentialis. Klein. Avi. pag. 79. N°. 12.

*Grisola vulgò dicta. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 737. hujus icon minis
 accurata pag. 738.*

Grisola Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 153.

Raj. Syn. Avi. pag. 81. N°. 7.

Grisola ex cinereo fusca Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 171. N°. 7.

Stoparola, aut Stoparolæ similis Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 159.

Les Boulonnois l'appellent GRISOLA. *Aldrov. Willugh.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg, BURSTNER. Gefn.

Il est à peu près de la grosseur d'une *Fauvette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces seulement. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes & demie de long; sa queue deux pouces une ligne; son pied sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est encore un peu plus court que ces derniers. Il a huit pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un gris-brun, le milieu de chaque plume étant cependant plus obscur. Le derrière & les côtés de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine & les côtés sont couverts de plumes blanchâtres, marquées chacune d'une bande d'un gris-brun, qui

Crassitie Currucam circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & octo lineas æquat, & ad extremos ungues quinque tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo cum semi lineas longum est; cauda duos pollices cum linea una; pes septem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem lateralibus nonnihil longitudine cedit. Alis expansis, extremitates majorum remigum octo pollicum & totidem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Partem capitis superiorem cooperiunt pennæ griseo-fuscæ, in medio tamen obscuriore colore tinctæ. Posterior pars & latera capitis, pars colli superior, dorsum, uropygium & tectrices caudæ superiores sunt griseo-fuscæ. Pennæ guttur, partem colli inferiorem, petus & latera vestientes albidæ, omnes taniâ griseo-

fuscâ, secundum scapi longitudinem ductâ, notatâ. Quæ ventrem obtegunt, sicut & tectrices caudæ inferiores, albent: pennæ autem omnes istæ sunt in exortu cinereo-nigricantes, qui color, pennis aliæ aliis incumbentibus, nullo modo apparet. Crura, alarumque tectrices inferiores dilutè rufescunt. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, eodem colore tinguntur. Tectrices alarum superiores minores sunt griseo-fuscæ: majores concolores, marginibus tamen in latere exteriori & apice candicantibus. Remiges griseo-fuscæ, oris interioribus albo-rufescentibus, & minorum tantùm margine exteriori candicante. Cauda duodecim conflatur rectricibus griseo-fuscis. Supra nares & versùs oris angulos quidam rigent exigui pili nigricantes, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum nigricat, exceptâ basi mandibulæ inferioris candicante. Pedes, unguefque saturatè fusci. *Ex museo Realmuriano.*

s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent le ventre, ainsi que les couvertures du dessous de la queue, sont blanches : cependant toutes ces plumes sont à leur origine d'un cendré - noirâtre, mais cette couleur ne paroît pas, lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. Les jambes & les couvertures du dessous des ailes sont d'un rouffâtre clair. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est de la même couleur. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un gris-brun : les grandes sont de la même couleur, mais elles sont bordées de blanchâtre extérieurement & par le bout. Les plumes de l'aile sont d'un gris-brun ; leur bord intérieur est d'un blanc-rouffâtre, & le bord extérieur des moyennes seulement est blanchâtre. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont quelques petits poils noirâtres, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est noirâtre, excepté la bête du demi-bec inférieur, qui est blanchâtre. Les pieds & les ongles sont d'un brun foncé. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. LE GOBE-MOUCHE DE L'ISLE DE BOURBON.

Voyez le mâle Pl. XXXIX. Fig. 1.

Muscicapa superne fusca, oris pennarum rufescentibus, infernè rufescens (*mas*) sordidè alba (*fœmina*); rectricibus saturatè fuscis, oris exterioribus dilutiùs fuscis
 MUSCICAPA BORBONICA.

Les Habitans de l'Isle de Bourbon l'appellent TECTEC.

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes & demie de long; sa queue un pouce dix lignes; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est presque aussi long que celui du milieu de ceux de devant. Il a sept pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont brunes, & variées par petits points d'un peu de roussâtre, les bords de

Præcedenti nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos septem cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem cum decem lineis; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem anticorum intimi longitudinem ferè adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est septem pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput & collum superius fusca sunt, & paucorufescente



Dessiné et Gravé par Martinet

1. Colinga . 2. Colinga des Maynas . 3. Colinga de Cayenne.



Designé et Gravé par Martinet

1. Cotinga Pourpre . 2. Cotinga gris-pourpre . 3. Gobe-Mouche .

rufescente punctulatim variegata, cujuslibet scilicet pennæ marginibus, & præsertim apice, rufescentibus. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, rectricesque caudæ superiores similiter fuscæ, rufescente admixto, qui color rufescens uniuscujusque pennæ margines occupat. Guttur & collum inferius sordidè albescent. Pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes rufescent. Remiges fuscæ, oris exterioribus rufescentibus, interioribus eodem colore, sed dilutiore, tinctis; apicis margines quoque rufescent. Caudam componunt duodecim rectrices saturatè fuscæ, oris exterioribus dilutiùs fuscis præditæ. Supra nares & versùs oris angulos exigui extant pili nigricantes, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque fusci.

Fœmina à *mare* discrepat pectore, ventre, lateribus, cruribus, rectricibus caudæ inferioribus & pennis alas subtus cooperientibus sordidè albis, quæ partes in *mare* rufescent.

chaque plume, & sur-tout la pointe, étant de cette couleur. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont pareillement brunes, & mêlées de roussâtre, qui occupe les bords de chaque plume. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc sale. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont roussâtres. Les plumes des aîles sont brunes; leur bord extérieur est roussâtre, & l'intérieur est de la même couleur, mais plus claire: leur bout est aussi bordé de roussâtre. La queue est composée de douze plumes d'un brun foncé; & dont le bord extérieur est d'un brun plus clair. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de petits poils noirâtres, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont bruns.

La *femelle* diffère du *mâle* en ce qu'elle a la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles d'un blanc sale, au lieu que ces parties sont roussâtres dans le *mâle*.

On les trouve à l'*Isle de Bourbon*, d'où ils ont été envoyés à *M. de Reaumur* par *M. de Lanux*.

Habitant in *Borbonica Insula*, unde in *museum Reaumurianum* missæ sunt à *D. de Lanux*.

** 3. LE GOBE-MOUCHE HUPÉ DE LA MARTINIQUE.

Voyez *Pl. XXXVI. Fig. 2.*

Muscicapa cristata, superne fusca, infernè cinerea; remigibus, rectricibusque fuscis, oris exterioribus remigum albidis *MUSCICAPA MARTINICANA CRISTATA.*

Il est un peu plus gros que notre *Gobe-mouche*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long; sa queue deux pouces quatre lignes; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a huit pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du def-

Muscicapam nostratem non-nihil crassitie superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices æquat, & ad extremos ungues quinque pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem lineas longum; cauda duos pollices & quatuor lineas; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimi longitudinem æmulatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est octo pollicum & decem linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt

pennæ fuscæ. Scapulares , alarum rectrices superiores , quæque caudam superne obtegunt , concolores. Quæ summum caput cooperiunt , cæteras nonnihil longitudine excedunt , exiguamque cristam efformant ; pennæ autem istæ sunt in exortu candidæ , apice verò fuscæ , ita tamen ut , dum pennæ aliæ aliis incumbunt , nulla appareat albedo. Guttur , pars colli inferior , pectus , venter , latera , crura , rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes sunt cineræ : color autem cinereus fit in ventre dilutior. Remiges fuscæ , oris exterioribus albidis. Cauda duodecim constat rectricibus penitus fuscis. Supra nares & versùs oris angulos longiusculi extant pili nigricantes , antrorsum versi , setarum instar rigidi. Rostrum , unguisque fusci ; pedes verò cinerei. Habitat in *Martinetica* , unde in *musæum D. Aubry* missa est.

fus des ailes & celles du dessus de la queue sont brunes. Les plumes du sommet de la tête sont un peu plus longues que les autres , & forment une petite hupe : ces plumes sont blanches à leur origine & brunes vers le bout , de façon cependant qu'il ne paroît rien de blanc lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont cendrées : cette couleur est un peu plus claire au ventre qu'ailleurs. Les plumes des ailes sont brunes ; & ont leur bord extérieur blanchâtre. La queue est composée de douze plumes tout - à - fait brunes. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirâtres , tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec & les ongles sont bruns ; & les pieds sont cendrés. On le trouve à *la Martinique* , d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry* , qui le conserve dans son cabinet.

** 4. LE GOBE-MOUCHE BRUN DE LA MARTINIQUE.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 1.

Muscicapa superne saturatè fusca, infernè cinerea, rufo maculata; gutture & tectricibus caudæ inferioribus rufis; rectricibus lateralibus fusco & candido variis.... MUSCICAPA MARTINICANA FUSCA.

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; son pied sept lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a neuf pouces neuf lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusque vers la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun foncé. La gorge est d'un roux foncé. La partie inférieure du col & la

Præcedentem crassitie paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos unguis quinque pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos septem lineas longum est; cauda duos pollices & sex lineas; pes septem cum femi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum novem pollicum & totidem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam versùs caudæ longitudinem extenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum & uropygium penis vestiuntur saturatè fuscis. Scapulares pennæ, quæ alas superne cooperiunt, & su-

periores caudæ teñtrices concolores. Guttur saturato imbutur rufo. Pars colli inferior & pectus ex cinereo fufcescunt. Venter, latera & crura sunt cinerea, maculis rufis varia. Teñtrices caudæ inferiores rufæ. Pennæ alas subtus tegentes cineræ. Remiges saturatè fuscæ. Caudam componunt duodecim rectrices : binæ intermediæ fusco tinguntur saturatissimo & subnigro : laterales autem fusco & candido variegantur. Circa oris angulos longi sunt pili nigricantes, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum nigrum. Pedes, unguisque fusci. Habitat in *Martinica*, unde in *museum D. Aubry* missa est.

poitrine sont d'un cendré-brun. Le ventre, les côtés & les jambes sont d'un cendré varié de taches rouffes. Les couvertures du dessous de la queue sont rouffes. Celles du dessous des aîles sont cendrées. Les plumes des aîles sont d'un brun foncé. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un brun très-foncé & presque noir : toutes les latérales sont variées de brun & de blanc. Vers les coins de la bouche sont de longs poils noirâtres, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve à *la Martinique*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

5. LE GOBE-MOUCHE BRUN DE VIRGINIE.

Muscicapa superne saturatè fusca, inferne cinerea; capite superius nigro; teñtricibus caudæ inferioribus sordidè rubris; rectricibus nigricantibus. . . . MUSCICAPA VIRGINIANA FUSCA.

Chat-Oiseau, Catesb. Tom. I. pag. 66; avec une figure exacte Pl. 66. Les Anglois l'appellent CAT-BIRD. Catesb.

Craffitie Alaudam paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo circiter pollices æquat, & ad extremos ungues septem pollices.

Il est un peu plus gros qu'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces. Son bec depuis son

bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue trois pouces; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est noire. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun foncé. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, & les jambes sont cendrées. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un rouge sale. Les plumes des aîles sont de la même couleur que le dos. La queue est composée de douze plumes noirâtres, toutes d'égale longueur. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. On ne voit point cet Oiseau sur les grands arbres; il ne fréquente que les arbrisseaux & les buissons. Il se nourrit d'*Insectes*. Sa voix imite celle d'un Chat. Ses œufs sont bleus. On le trouve en *Virginie* pendant l'été seulement.

Rostrum ab ipsius apicē ad oris angulos usque decem cum semi lineas longum est; cauda tres pollices; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas; laterales paulò sunt breviores; posticus autem anticorum extimi longitudinem æquat. Alæ complicatæ ad tertiam longitudinis caudæ partem usque protenduntur. Caput superius nigrum est. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ caudam superne tegentes, alarumque rectrices superiores, sicut & scapulares, sunt saturatè fusca. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera & crura cinerea. Inferiores caudæ rectrices sordidè rubent. Alarum remiges sunt dorso concolores. Cauda duodecim constat rectricibus nigricantibus, omnibus longitudine æqualibus. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque fusci. Majoribus arboribus non insidet hæc Avis; arbutulas tantùm & sepēs frequentat. *Insectis* victitat. Vocem *Felinam* æmulatur. Ova ponit cœrulea. Habitat in *Virginia*, sed æstate tantùm.

6. LE GOBE-MOUCHE BRUN DE LA CAROLINE.

Muscicapa superne saturatè fusca , infernè albo-flavicans ; capite superiùs nigro ; remigibus , rectricibusque fuscis

MUSCICAPA CAROLINENSIS FUSCA.

Luscinia nigricans. Klein. Avi. pag. 74. N^o. 5.

Preneur de mouches noirâtre. Catesb. Tom. I. pag. 53 ; avec une figure exacte Pl. 53.

Les Anglois l'appellent BLACK CAP FLY-CATCHER. Catesb.

Muscicapam nostratem non-nihil crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sex pollices & tres circiter lineas explet , & ad extremos ungues quinque pollices cum septem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum est ; cauda duos pollices & septem lineas ; pes decem cum semi lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas ; laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine æmuletur. Alæ complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caput superius nigrum est. Pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , quæ alas superne cooperiunt , & rectrices caudæ superiores sunt saturatè fusca. Gut-

Il est un peu plus gros que *notre Gobe-mouche*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ six pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long ; sa queue deux pouces sept lignes ; son pied dix lignes & demie ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le dessus de la tête est noir. La partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun foncé.

La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-jaunâtre. Les plumes des aîles sont brunes. La queue est composée de douze plumes de la même couleur, dont les deux du milieu sont un peu plus courtes que les latérales; ce qui rend la queue un peu fourchue. Au-dessus des coins de la bouche sont quelques petits poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. Il se nourrit de *Mouches* & autres *Insectes*.

La femelle diffère du mâle en ce que le dessus de sa tête est d'un noir moins foncé.

On les trouve à la Caroline pendant l'été seulement.

tur, partem colli inferiorum, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ albo-flavicantes. Inferiores caudæ rectrices concolores. Alarum remiges fuscæ. Caudam componunt duodecim rectrices eodem colore imbutæ, quarum binæ intermediæ lateralibus paululum sunt breviores; unde fit cauda nonnihil bifurca. Supra oris angulos quidam extant exigui pili nigri, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigri. *Muscis*, aliisque *Insectis* victitat.

Fœmina à mare discrepat capite superiore nigro non ita intenso tincto.

Habitant in *Carolina*, sed æstate tantum.

7. LE GOBE-MOUCHE CENDRÉ DE LA CAROLINE:

Muscicapa superne saturatè cinerea, infernè sordidè albo-flavicans; remigibus, rectricibusque fuscis, oris exterioribus minorum remigum albis . . . MUSCICAPA CAROLINENSIS CINEREA.

Luscinia, Muscicapa fusca. Klein. Avi. pag. 74. N°. 7.

Petit preneur de mouches brun. *Catesb. Tom. I. pag. 54; avec une figure assez exacte Pl. 54.*

Les Anglois l'appellent *LITTLE BROWN FLY-CATCHER. Catesb.*

Il est à peu près de la grosseur de notre *Gobe-mouche*. Sa longueur depuis le bout du bec

Muscicapam nostratem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam

caudam extremam quinque pollices & octo circiter lineas explet, & ad extremos ungues quinque tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo lineas longum est; cauda duos pollices; pes sex cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas: laterales paulo sunt breviores; posticus autem anticorum extimi longitudinem adæquat. Alæ complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ saturatè cineræ. Scapulares, alarum superiores tectrices, quæque caudam superne cooperiunt, concolores. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores ex sordidè albo flavicant. Alarum remiges majores fuscæ sunt: minores concolores, oris exterioribus albis. Cauda duodecim conflatur rectricibus fuscis. Supra oris angulos quidam sunt exigui pili nigri, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Mandibula superior nigra est, inferior verò flava. Pedes, ungues-

jusqu'à celui de la queue est d'environ cinq pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long; sa queue deux pouces; son pied six lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un cendré foncé. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale & jaunâtre. Les grandes plumes des aîles sont brunes: les moyennes sont de la même couleur & bordées extérieurement de blanc. La queue est composée de douze plumes brunes. Au-dessus des coins de la bouche sont quelques petits poils noirs, tournés en-devant & roides comme des

foyes. Le demi-bec supérieur est noir, l'inférieur est jaune. Les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à la *Caroline* pendant l'été seulement.

que nigri. Habitat in *Carolina*, sed æstate tantum.

** 8. LE GOBE-MOUCHE A COLLIER DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XXXVI. Fig. 1.

Muscicapa superne saturatè cinerea, infernè alba; collo inferiore castaneo, taniâ nigrâ in infima parte circumdato; taniâ transversâ in alis albâ; rectricibus nigris, lateralibus apice albis, extimâ exteriùs albâ, . . . MUSCICAPA SENEGALENSIS TORQUATA.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long; sa queue un pouce huit lignes; son pied neuf lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a huit pouces cinq lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supé-

Præcedentem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & novem lineas explet, & ad extremos unguis quatuor pollices cum sex lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem lineas longum; cauda unum pollicem & octo lineas; pes novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum octo pollicum & quinque linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ

longitudinem attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, superiores caudæ rectrices & pennæ scapulares saturatissimo tinguntur cinereo. Guttur & collum inferius elegantissimo castaneo imbuuntur : quem castaneum colorem in parte infima tænia ambit nigra, torquem quodammodo efficiens. Pectus, venter, latera, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes albescent. Crura albo & nigricante variegantur. Alarum rectrices superiores nigricant & marginibus donantur cinereis : ex istis quædam albo terminantur ; unde fit in utraque ala tænia transversa, concolor. Alarum remiges nigricantes, oris exterioribus cinereis, interioribus albis : ex minoribus corpori vicinioribus binæ in latere exteriori, versùs remigis margines, maximâ parte albescent ; quo fit in utraque ala tænia longitudinalis, alba. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae nigrae : laterales omnes concolores, attamen apice albæ ; utrinque insuper extrema in latere exteriori penitus alba. Supra nares & circa oris angulos

rieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un cendré très-foncé. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un très-beau marron : cette couleur est entourée par le bas d'une bande noire, qui forme une espece de collier. La poitrine, le ventre, les côtés, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blanches. Les jambes sont variées de blanc & de noirâtre. Les couvertures du dessus des aîles sont noirâtres & bordées de cendré : quelques-unes sont terminées de blanc ; ce qui forme sur chaque aîle une bande transversale, de cette couleur. Les plumes des aîles sont noirâtres ; leur bord extérieur est cendré, & l'intérieur est blanc : deux des moyennes les plus proches du corps ont une grande partie de leur côté extérieur blanche, & cela vers le bord de la plume ; ce qui forme sur chaque aîle une tache longitudinale, de cette couleur. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noires : toutes les latérales sont de la même couleur & terminées de blanc ; la plus extérieure de chaque côté est en-outre entièrement blanche du côté extérieur.

Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est noir. Les pieds sont cendrés; & les ongles bruns. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

longiusculi extant pili nigri; antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum nigrum. Pedes cinerei; ungues verò fusci. Habitat in *Senegalsi* regione, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Adanson*.

** 9. LE GOBE-MOUCHE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE:

Voyez Pl. XXXVI. fig. 3.

Muscicapa superne fusca, internè alba; pectore nigro; lateribus rufis; tæniâ transversâ in alis rufâ; rectricibus nigris, apice albis, extimâ exteriùs albâ . . . MUSCICAPA CAPITIS BONÆ SPEI.

Il est de la grosseur des précédens. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces sept lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long; sa queue un pouce huit lignes; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a huit pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu

Præcedentes crassitie æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quatuor pollices & septem lineas æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices cum quinque lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos septem lineas longum est; cauda unum pollicem cum octo lineis; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimi longitudinem æquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est octo

pollicum ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Superior capitis pars cinereo imbitur saturatissimo & quidem subnigro. Capitis latera sive genæ sunt nigræ. Collum superius, dorsum & uropygium fusca. Pennæ scapulares concolores. Tectrices caudæ superiores nigræ. Collum inferius & pectus idem tingit color. Guttur, venter, tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes albescent. Latera sunt rufa. Crura fusca, paucò albo variegata. Alarum tectrices superiores minores fuscæ : majores eodem colore tinctæ, rufoque terminatæ ; quo fit in utraque ala tænia transversa, concolor. Alarum remiges fuscæ, oris interioribus albis, exterioribus griseis, exceptâ tamen minorum remigum corpori viciniorum margine exteriori rufâ : minores insuper remiges paucò rufescente terminantur. Caudam componunt duodecim rectrices nigræ, apice albæ : utrinque autem extrema in latere exteriori penitus alba est. Supra nares & circa oris angulos exigui extant pili nigri, antrorsum versi & seta-

au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un cendré très-foncé & presque noir. Les côtés de la tête ou les joues sont noires. La partie supérieure du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont brunes. Les couvertures du dessus de la queue, la partie inférieure du col & la poitrine sont noires. La gorge, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blanches. Les côtés sont roux. Les jambes sont brunes, & variées d'un peu de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles sont brunes : les grandes sont de la même couleur, & terminées de roux ; ce qui forme sur chaque aîle une bande transversale, de cette couleur. Les plumes des aîles sont brunes ; leur bord intérieur est blanc, & l'extérieur est gris, excepté celui des moyennes les plus proches du corps, qui est roux : les moyennes plumes de l'aîle sont aussi terminées d'un peu de roussâtre. La queue est composée de douze plumes noires, & terminées de blanc : la plus extérieure de chaque côté est de plus entièrement blanche du côté extérieur. Au-dessus des narines & vers les coins de

la bouche sont de petits poils noirs, tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck*, qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

rum instar rigidi. Rostrum nigrum. Pedes, unguisque fuscii. Habitat in *Capite Bonæ Spei*, unde missa est ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

** 10. LE GOBE-MOUCHE A POITRINE ROUSSE DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 2.

Muscicapa superne è griseo, nigricante & albo confusè mixta, infernè alba; pectore dilutè rufo; genis nigris; taniâ supra oculos albo-rufescente; taniâ transversâ in alis albâ; rectricibus nigris, tribus extimis exteriùs & apice albis, proximè sequenti apice albâ. . . . MUSCICAPA SENEGALENSIS PECTORE RUFO.

Il est à peu près de la grosseur de *notre Becfigue*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces deux lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces onze lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de longueur; sa queue un pouce cinq lignes; son pied sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux

Crassitie Ficedulam nostratem circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & lineas binas explet, & ad extremos unguis tres pollices & undecim lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem lineas longum est; cauda unum pollicem cum quinque lineis; pes septem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque lineas: laterales paulò sunt breviores: posticus autem cum anticorum extimo longitudine

convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est septem pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ fuscæ. In utroque capitis latere tænia extat longitudinalis, alborufescens, prope nares orta, supra oculum ducta & ad partem capitis posteriorem protensa, ibique alteri connexa. Genæ sunt nigræ. Collum superius & guttur ex albo rufescunt. Dorsum, uropygium & pennæ scapulares griseo & nigricante, cum pauco albo confusè mixtis, variegantur. Superiores caudæ rectrices nigræ. Pectus dilutè rufum. Pars colli inferior, venter, latera & rectrices caudæ inferiores albæ. Pennæ alas subtus cooperientes nigræ, exceptis ex illis quibusdam candidis. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, quoque candidæ. Crura fusca, albo variegata. Superiores alarum rectrices fuscæ, marginibus albo-rufescentibus; majores tamen corpori viciniore, sicut & mediæ ipsis finitimæ, albescent; unde fit in utraque ala

de devant. Il a sept pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est brune. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale, d'un blanc-roussâtre, qui commence auprès des narines, passe par-dessus l'œil & va se réunir à l'autre derrière la tête. Les joues sont noires. La partie supérieure du col & la gorge sont d'un blanc-roussâtre. Le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont variées de gris, de noirâtre & d'un peu de blanc, mêlés confusément. Les couvertures du dessus de la queue sont noires. La poitrine est d'un roux clair. La partie inférieure du col, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Celles du dessous des ailes sont noires, excepté quelques-unes, qui sont blanches. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est de cette dernière couleur. Les jambes sont brunes & variées de blanc. Les couvertures du dessus des ailes sont brunes & bordées de blanc-roussâtre, excepté les grandes les plus proches du corps, ainsi que les moyennes qui les suivent, qui sont blanches; ce qui

forme sur chaque aîle une bande transversale, de cette couleur. Les plumes des aîles sont brunes ; leur bord extérieur est gris, & l'intérieur est blanc. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont noires : les deux suivantes de chaque côté sont de la même couleur & terminées de blanc ; mais la plus extérieure de ces deux-là a aussi le bord extérieur blanc : enfin les deux plus extérieures de chaque côté sont blanches du côté extérieur & à leur bout, & noires du côté intérieur. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

tænia transversa, concolor. Alarum remigès sunt fuscae, oris exterioribus griseis, interioribus candidis. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum quatuor intermediæ sunt nigrae : binæ utrinque sequentes concolores, apicibus tamen albis ; ex istis autem duabus extrema margine exteriori albâ prædita est : binæ tandem utrinque extremae sunt in latere exteriori & apice albæ, in latere interiori nigrae. Supra nares & circa oris angulos longiusculi rigent pili nigri, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Senegalsensi* regione ; unde in *musæum Realmurianum* missa est à *D. Adanson*.

** 11. LE GOBE-MOUCHE A POITRINE NOIRE DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 3.

Muscicapa superne è cinereo, nigro & albo confusè mixta ; infernè alba ; capite & pectore nigris ; tæniâ supra oculos albâ ; tæniâ transversâ in alis candidâ ; rectricibus nigris, duabus extimis exteriùs & apice albis . . . , MUSCICAPA SENEGALENSIS PECTORE NIGRO.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur

Præcedentem crassitiè circiter æmulatur. Ipsiùs longitudo

tudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quatuor pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues quatuor tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos septem lineas longum est; cauda unum pollicem cum septem lineis; pes septem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus verò anticorum extimi longitudinem æquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum septem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput & pectus vestiunt pennæ nigræ. In utroque capitis latere tænia extat longitudinalis, alba, prope nares orta, supra oculum ducta & ad partem capitis posteriorem protensa, ibique alteri connexa. Collum superius pennis vestitur cinereis. Dorsum & uropygium, sicut & scapulares pennæ, cinereo & nigricante, cum pauco albo confusè mixtis, variegantur. Tectrices caudæ superiores sunt nigræ. Guttur, pars colli inferior, venter, latera, inferioresque caudæ tectrices albæ.

Tome II.

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces seulement. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long; sa queue un pouce sept lignes; son pied sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a sept pouces de vol: & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête & la poitrine sont noires. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale, blanche, qui commence auprès des narines; passe par-dessus l'œil & va se réunir à l'autre derriere la tête. La partie supérieure du col est cendrée. Le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont variées de cendré, de noir & d'un peu de blanc mêlés confusément. Les couvertures du dessus de la queue sont noires. La gorge, la partie inférieure du col, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les jambes sont noirâtres, variées

Bb b

d'un peu de blanc. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est de cette dernière couleur. Les couvertures du dessous des aîles & les petites du dessus sont noires : les grandes du dessus les plus éloignées du corps sont noirâtres : les grandes les plus proches du corps, ainsi que les moyennes qui les suivent, sont blanches ; ce qui forme sur chaque aîle une bande transversale, de cette couleur. Les plumes des aîles sont d'un brun-noirâtre ; leur bord extérieur est gris, & l'intérieur est blanchâtre. La queue est composée de douze plumes : les huit du milieu sont noires : celle qui les suit de chaque côté est de la même couleur & terminée de blanc ; son bord extérieur est aussi de cette couleur : enfin la plus extérieure de chaque côté est blanche du côté extérieur & à son bout, & noire du côté intérieur. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

Crura nigricant, & aliquid albi admixtum habent. Alarum margines, versus articulum carpo humano respondentem, candidæ. Tectrices alarum inferiores & minores superiores sunt nigrae : majores superiores à corpore remotiores nigricantes : majores autem corpori viciniore, sicut & mediae ipsis finitimæ, candidæ, quibus in utraque ala tænia transversa, concolor efficitur. Remiges ex fusco nigricant, orisque donantur exterioribus griseis, interioribus albidis. Duodecim rectricibus cauda constat : octo intermediae nigrae : utrinque proximè sequens concolor, attamen apice alba, margine quoque exteriori albâ prædita : utrinque tandem extrema in latere exteriori & apice alba, interiùs verò nigra. Supra nares & circa oris angulos longiusculi extant pili nigri, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Senegalenfi* regione, unde in *museum Realinurianum* missa à *D. Adanson*.

** 12. LE GOBE-MOUCHE A COLLIER DU CAP DE BONNE
ESPERANCE.*Voyez Pl. XXXVI. Fig. 4.*

Muscicapa superne nigra, infernè alba; pectore rufo; collo superiore torque albo cincto; maculâ in alis candidâ; remigibus, rectricibusque nigris, oris interioribus remigum albis MUSCICAPA TORQUATA CAPITIS BONÆ SPEI.

Craffitie *Muscicapam nostratam* circiter æmulatur. Ipfius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & decem lineas æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices cum octo lineis. Rostrum ab ipfius apice ad oris angulos usque septem lineas longum; cauda unum pollicem cum decem lineis; pes decem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; posticus autem laterales nonnihil longitudine superat. Alis expansis, extremitates majorum remigum octo pollicum & quinque linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem protenduntur. Caput, guttur, partes colli superior & inferior, dorsum & uropygium pennis vestiuntur

Il est à peu près de la grosseur de *notre Gobe-mouche*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long; sa queue un pouce dix lignes; son pied dix lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Il a huit pouces cinq lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, les parties supérieure & inférieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont noires. Les côtés du col sont blancs. Par-

dessus le col est aussi une bande transversale , blanche , qui forme une espece de collier. La poitrine est rousse. Le ventre , les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les jambes sont variées de noir & de blanc. Les couvertures du dessous des ailes sont de la même couleur : les petites du dessus & les grandes les plus éloignées du corps sont noires : les grandes du dessus les plus proches du corps sont blanches ; ce qui forme sur chaque aile une grande tache de cette couleur. Les plumes des ailes sont noires , & ont leur bord intérieur blanc. La queue est composée de douze plumes tou-à-fait noires : (j'ai cependant vu quelques individus de cette espece , dont toutes les plumes latérales de la queue étoient terminées de blanc sale). Au - dessus des narines & vers les coins de la bouche sont quelques poils noirs , tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance* , d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. l'Abbé de la Caille*.

nigris. Superiores caudæ rectrices & scapulares pennæ concolores. Collum ad latera albet. Supra collum tænia quoque adest transversa , alba , torquem quodammodo efficiens. Pectus rufum est. Venter , latera & rectrices caudæ inferiores albet. Cru-ra ex albo & nigro variegantur. Alarum rectrices inferiores concolores : superiores minores , sicut & majores à corpore remotiores , nigrae : majores superiores corpori finitimæ candidæ , quibus in utraque ala majuscula efformatur macula concolor. Remiges nigrae , oris interioribus albis. Caudam component duodecim rectrices penitus nigrae : (in quibusdam tamen hujus speciei individuis rectrices omnes laterales apicibus sordide albis præditas observavi). Supra na-res & circa oris angulos quidam extant pili nigri , antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum nigrum. Pedes , unguesque fusci. Habitat in *Capite Bonæ Spei* , unde in *musæum Realmurianum* missa est à *D. Abbate de la Caille*.

** 13. LE GOBE-MOUCHE NOIR.

Muscicapa superne nigra griseo admixto, infernè alba; maculâ in fronte candidâ; remigibus minoribus in exortu albis; rectricibus tribus extimis exteriùs albis. . . .

MUSCICAPA NIGRA.

Ficedula, sive Atricapilla sese mutans. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 758, in qua hujus icon non satis accurata.*

Ficedula secunda. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 82. sp. 17.*

Ficedula tertia Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 170.*

Atricapilla tertia. *Jonst. Avi. pag. 90. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 45, sub titulo, Alia Ficedula, sive Atricapilla.*

Oenanthe nostra quarta, monticola, Cold-Finch Germanis dicta. *Raj. Syn. Avi. pag. 77. N°. A. 5.*

Cold-Finch Germanis. *Willugh. Ornith. pag. 170.*

Motacilla remigibus nigricantibus; extimo dimidiato extrorsum albo; maculâ alarum albâ. *Faun. Suec. Linn. N°. 230.*

Curruca tergo nigro. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 24.*

Les Allemands l'appellent COLD-FINCH. *Willugh. Raj. SCHWARTZ RUCKIGE GRAS-MUCKE. Frisch.*

Muscicapam vulgarem craf-
fitie nonnihil antecellit. Ip-
sius longitudo ab apice rostri
ad caudam extremam quin-
que pollices & octo lineas
æquat, & ad extremos un-
gues quinque pollices cum
lineis binis. Rostrum ab ipsis
apice ad oris angulos sex
lineas longum est; cauda
unum pollicem cum unde-
cim lineis; pes octo lineas;
& trium digitorum antico-
rum medius cum ungue sep-
tem lineas: laterales paulò
sunt breviores; posticus au-
tem cum anticorum extimo

Il est un peu plus gros que le
Gobe-mouche ordinaire. Sa lon-
gueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est de
cinq pouces huit lignes, & jus-
qu'à celui des ongles de cinq
pouces deux lignes. Son bec
depuis son bout jusqu'aux coins
de la bouche a six lignes de
long; sa queue un pouce onze
lignes; son pied huit lignes; &
celui du milieu des trois doigts
antérieurs, joint avec l'ongle,
sept lignes: les latéraux sont un
peu plus courts; & celui de
derrière est de la même lon-
gueur que l'extérieur de ceux

de devant. Il a huit pouces dix lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un noir mêlé d'un peu de gris. Sur le front , immédiatement au-dessus de la bête du demi-bec supérieur , est une tache blanche. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous de l'aîle sont blanches. Les jambes sont variées de brun & de blanc. Les grandes couvertures du dessus des aîles sont noires & terminées de blanc. Les grandes plumes de l'aîle sont brunes : les moyennes sont blanches à leur origine & noires vers le bout ; mais le blanc s'étend d'autant plus loin vers le bout de la plume , qu'elle est plus proche du corps ; ce qui forme sur chaque aîle une grande tache blanche. La queue est composée de douze plumes : les six du milieu sont noires ; & les trois plus extérieures de chaque côté sont de la même couleur du côté intérieur & à leur bout , & blanches du côté extérieur.

longitudine perfectè convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est octo pollicum & decem linearum ; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem usque protenduntur. Caput , pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , alarumque tectrices superiores sunt nigræ , cum paucis griseo admixto. In fronte , scilicet supra basin mandibulæ superioris , macula extat candida. Guttur , pars colli inferior , pectus , venter , latera & tectrices caudæ superiores & inferiores , sicut & pennæ alas subtus tegentes , albescent. Crura ex fusco & albo variegantur. Alarum tectrices superiores majores sunt nigræ , alboque terminantur. Remiges majores fuscae ; minores in exortu albæ , versùs apicem nigræ ; albedo autem eò magis versùs pennæ apicem protenditur , quò remix fit corpori vicinior ; unde in utraque ala majuscula macula alba efficitur. Caudam componunt duodecim rectrices , quarum sex intermediae sunt nigræ ; tres autem utrinque extremae in latere interiore & apice concolores , in latere verò exteriori albæ.

Binæ rectrices intermediae lateralibus paulò sunt breviores; unde fit cauda nonnihil bifurca. Supra nares & circa oris angulos quidam rigent pili nigri, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Suecia*, *Germania* & *Italia*, sicut & in quibusdam *Galliæ Meridionalibus* Provinciis. *Ex museo Realmuriano.*

Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus courtes que les latérales; ce qui rend la queue un peu fourchue. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont quelques poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve en *Suede*, en *Allemagne*, en *Italie* & en quelques Provinces Méridionales de *France*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 14. LE GOBE-MOUCHE D'AMÉRIQUE.

Muscicapa superne nigra, infernè alba ad aurantium vergens; pectore aurantio; remigibus minoribus primâ medietate aurantiis; rectricibus quatuor extimis aurantiis, apice nigris. (*Mas*).

Muscicapa superne fusca, inferne alba ad luteum vergens; pectore luteo; remigibus minoribus primâ medietate luteis; rectricibus quatuor extimis luteis, apice fuscis. (*Fœmina*).

. . . . MUSCICAPA AMERICANA.

Passer Serino affinis è croceo & nigro varius. *Klein. Avi. pag. 89. No. 13.*
Serino affinis Avicula è croceo & nigro varia. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 312. No. L.*

Serino affinis è croceo & nigro varia. *Raj. Syn. Avi. pag. 188. No. 51.*
Rossignol de muraille de l'Amérique. *Catesb. Tom. I. pag. 67; avec une bonne figure du mâle Pl. 67.*

Petit Rossignol de muraille de l'Amérique. *Edwards. Tom. II. pag. LXXX; avec une figure très-exacte du mâle Pl. 80.*

Moucherolle à queue jaune. *Edwards. Glanur. pag. 101. Chap. XLVII; avec une figure exacte de la femelle Pl. 257.*

Les Anglois l'appellent RED-START. *Catesb. YELLOW-TAILED FLY-CATCHER. Edwards. SMALL BLACK AND ORANGE-COLOURED BIRD. Sloane. Raj.*

Ad *Ficedulæ* crassitiem accedit. Ipsius longitudo ab Il approche de la grosseur du *Becfigue*. Sa longueur depuis le

bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq lignes de long; sa queue deux pouces une ligne; son pied six lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a sept pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont noires. La poitrine, les côtés & les couvertures du dessous des aîles sont d'un bel orangé. Le ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc tirant sur l'orangé. Les grandes plumes des aîles sont noires, & ont leur bord intérieur d'un orangé clair: les moyennes sont orangées depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; l'autre moitié est noire. La queue est composée de douze plumes:

apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & octo lineas æquat, & ad extremos ungues tres pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quinque lineas longum est; cauda duos pollices cum linea una; pes sex cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem anticorum intimi longitudinem adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est septem pollicum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput, guttur, collum, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigræ. Scapulares, alarum tectrices superiores, quæque caudam superne cooperiunt, concolores. Pectus, latera, alarumque tectrices inferiores elegantiori aurantio tinguntur colore. Venter, crura & tectrices caudæ inferiores ex albo ad aurantium vergunt. Alarum remiges majores sunt nigræ, oris interioribus dilutè aurantiis: minores ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque aurantia

tia, à medietate ad apicem nigræ. Cauda duodecim constat rectricibus : binæ intermediæ sunt nigræ : utrinque proximè sequens concolor, excepto latere exteriori ab exortu rectricis ad mediam circiter longitudinem usque aurantio : quatuor utrinque extimæ ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque aurantiæ ; in reliqua longitudine nigræ : istarum insuper rectricum scapus per totam longitudinem niger est. Supra nares & circa oris angulos longiusculi rigent pili nigri, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum nigricans. Pedes, unguesque fusci.

Fœmina coloribus à *mare* discrepat. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alarum tectrices superiores & pennæ caudam superne tegentes sunt fuscæ. Guttur & pars colli inferior ex albo flavicant. Pectus, latera, alarumque tectrices inferiores eleganti luteo colore tinguntur. Venter, crura & tectrices caudæ inferiores ex albo ad luteum vergunt. Remiges majores sunt fuscæ, orisque donantur interiori-

Tome II.

Les deux du milieu sont noires : celle qui les suit de chaque côté est de la même couleur, excepté son côté extérieur, qui est orangé depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur : les quatre plus extérieures de chaque côté sont orangées depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur ; le reste est noir : de plus la tige est noire dans toute la longueur de la plume. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est noirâtre. Les pieds & les ongles sont bruns.

La *femelle* diffère du *mâle* par ses couleurs. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont brunes. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc-jaunâtre. La poitrine, les côtés & les couvertures du dessous des aîles sont d'un beau jaune. Le ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc tirant sur le jaune. Les grandes plumes des aîles

C c c

font brunes, & ont leur bord intérieur d'un jaune clair : les moyennes sont jaunes depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur ; l'autre moitié est brune. Les deux plumes du milieu de la queue sont brunes : celle qui les suit de chaque côté est de la même couleur, excepté son côté extérieur, qui est jaune depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur : les quatre plus extérieures de chaque côté sont jaunes depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur ; le reste est brun : de plus la tige est brune dans toute la longueur de la plume. Les poils roides, qu'elle a au-dessus des narines & des coins de la bouche, sont noirâtres. Le bec, les pieds & les ongles sont bruns.

On les trouve à *la Caroline*, à *la Jamaïque* & à *S. Domingue*, d'où ils ont été envoyés à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

bus dilutè luteis : minores ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque luteæ, alterâ medietate fuscâ. Binæ rectrices intermediæ fuscæ : utrinque proxima concolor ; si tamen excipias latus exterius ab exortu rectricis ad mediam circiter longitudinem usque luteum : quatuor utrinque extimæ ab ipsarum exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque luteæ, indè ad apicem fuscæ : istarum insuper rectricum scapus per totam longitudinem fuscus est. Pili rigidi, supra nares & circa oris angulos siti, nigricant. Rostrum, pedes, unguesque fusi.

Habitant in *Carolina*, *Jamaica* & *Dominicensi Insula*, unde in *museum Realmurianum* à *D. Chervain* missæ sunt.

** 15. LE GRAND GOBE-MOUCHE NOIR DE CAYENNE.

Voyez *Pl. XXXVIII. Fig. 3.*

Muscicapa nigra ; gutture & collo inferiore splendide purpureis ; remigibus, rectricibusque nigris *MUSCICAPA CAYANENSIS NIGRA MAJOR.*

An *Jacapu Brasiliensibus* ? *Marcgr. Hist. Br. pag. 192. Jonst. Avi. pag. 131.*

Les Brasiiliens l'appellent JACAPU. Marcgr. Jonst.

Craffitie Merulam vulgarem multum antecellit. Ipsi-
 us longitudo ab apice rostri
 ad caudam extremam un-
 decim pollices & sex lineas
 æquat, & ad extremos un-
 gues novem pollices & tres
 lineas. Rostrum ab ipso
 apice ad oris angulos sex-
 decim lineas longum est ;
 cauda quatuor pollices cum
 tribus lineis ; pes undecim
 lineas ; & trium digitorum
 anticorum medius cum un-
 gue decem cum semi lineas :
 laterales paulò sunt brevio-
 res ; posticus autem latera-
 lium longitudinem superat.
 Alis expansis , extremitates
 majorum remigum unius pe-
 dis decem pollicum & qua-
 tuor linearum intervallo dis-
 tant ; alæ verò complicatæ
 caudam ferè extremam attin-
 gunt. Per universum corpus
 pennis vestitur nigris , ex-
 ceptis tamen illis , guttur &
 collum inferius cooperien-
 tibus , splendide purpureis.
 Alarum remiges similiter
 nigrae. Caudam componunt
 duodecim rectrices conco-
 lores. Supra oris angulos
 quidam extant exigui pili
 nigri , antrorsum versi , se-
 tarum instar rigidi. Rostrum
 plumbeo colore tingitur.
 Pedes , unguisque nigri.

Il est beaucoup plus gros que
 le *Merle ordinaire*. Sa longueur
 depuis le bout du bec jusqu'à
 celui de la queue est d'onze
 pouces six lignes , & jusqu'à ce-
 lui des ongles de neuf pouces
 trois lignes. Son bec depuis son
 bout jusqu'aux coins de la bou-
 che a seize lignes de long ; sa
 queue quatre pouces trois li-
 gnes ; son pied onze lignes ; &
 celui du milieu des trois doigts
 antérieurs , joint avec l'ongle ;
 dix lignes & demie : les laté-
 raux sont un peu plus courts ; &
 celui de derriere est un peu
 plus long que ces derniers. Il a
 un pied dix pouces quatre li-
 gnes de vol ; & ses aîles , lors-
 qu'elles sont pliées , s'étendent
 presque jusqu'au bout de la
 queue. Tout son corps est cou-
 vert de plumes noires, si l'on en
 excepte cependant celles qui
 couvrent la gorge & la partie
 inférieure du col , qui sont d'un
 pourpre éclatant. Les plumes
 des aîles sont pareillement noi-
 res. La queue est composée de
 douze plumes de la même cou-
 leur. Au-dessus des coins de
 la bouche sont quelques petits
 poils noirs , tournés en-devant
 & roides comme des foyes. Le
 bec est d'une couleur de plomb.
 Les pieds & les ongles sont
 noirs. On le trouve à *Cayenne* ,
 d'où il a été envoyé à *M. de*

Reaumur par *M. des Effars*. Habitat in *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. des Effars*.

** 16. LE GRAND GOBE-MOUCHE NOIR HUPÉ DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 4.

Muscicapa cristata, nigro-viridans; remigibus, rectricibusque nigris, oris exterioribus nigro-viridescentibus; caudâ bifurcâ; cristâ in syncipite perpendiculariter erectâ . . .

MUSCICAPA MADAGASCARIENSIS NIGRA MAJOR CRISTATA.

Les Habitans de Madagascar l'appellent DRONGO.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes de long; sa queue cinq pouces; son pied huit lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est presque aussi long que celui du milieu de ceux de devant. Il a quatorze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un noir changeant en verd.

Crassitie Merulam circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices explet, & ad extremos ungues sex pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim lineas longum est; cauda quinque pollices; pes octo cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum medii longitudinem ferè adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Totum corpus

vestiunt pennæ nigro - viridescentes. In syncipite, supra mandibulæ superioris exortum, longæ sunt pennæ perpendiculariter erectæ, strictissimæ, quarum aliquot unius pollicis & octo linearum longitudinem obtinent, elegantissimam cristam efficientes. Alarum remiges sunt nigræ, oris exterioribus nigro - viridescentibus. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores, quarum binæ intermediae lateralibus sunt breviores; laterales autem gradatim majorem obtinent longitudinem ad utrinque extimam usque, binis intermediis unum pollicem & septem lineas longiorem; unde fit cauda maximè bifurca. Supra oris angulos exigui rigent pili nigri, antrosum versi & setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Madagascaria*, unde in *musæum Realmurianum* à D. Poivre allata est.

Sur le synciput, immédiatement au-dessus de l'origine du demi-bec supérieur, s'élèvent perpendiculairement de longues plumes très-étroites, & dont quelques-unes ont jusqu'à un pouce huit lignes de longueur, qui lui font une fort jolie hupe. Les plumes des ailes sont noires, & ont leur bord extérieur d'un noir changeant en verd. La queue est composée de douze plumés de la même couleur que celles des ailes : les deux du milieu sont plus courtes que les latérales, qui vont toutes en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue que les deux du milieu d'un pouce sept lignes ; ce qui rend la queue très-fourchue. Au-dessus des coins de la bouche sont de petits poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à M. de Reaumur par M. Poivre.

** 17. LE GRAND GOBE-MOUCHE CENDRÉ DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 1.

Muscicapa cinerea, superne saturatiùs, internè dilutiùs; capite saturatè cinereo; remigibus nigricantibus, oris exte-

rrioribus cinereis, interioribus candidis; rectricibus lateralibus nigris, duabus utrinque extimis apice dilutè cinereis.

. . . . MUSCICAPA MADAGASCARIENSIS CINEREA MAJOR.

Les Habitans de Madagascar l'appellent KINKI-MAVOU.

Il n'est pas si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces onze lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue trois pouces cinq lignes; son pied dix lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que l'intérieur de ceux de devant, qui est le plus court de tous. Il a treize pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, & la partie du col la plus voisine de la tête sont d'un cendré très-foncé & presque noir. Le reste du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un fort beau cendré. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes

Præcedenti crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & undecim lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda tres pollices cum quinque lineis; pes decem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas: laterales multò sunt breviores; posticus anticorum intimi longitudinem nonnihil superat; intimus autem omnium est brevissimus. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, guttur & pars colli capiti finitima cinereo tinguntur saturatissimo & ad nigrum accedente. Collum in reliqua longitudine, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alarum tectrices superiores, quæque caudam

superne obtegunt, eleganti imbuuntur cinereo. Pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores eodem tinguntur colore, sed dilutius. Alarum tectrices inferiores albescent. Remiges nigrescent, orisque donantur exterioribus per totam remigis longitudinem cinereis, interioribus verò ab exortu remigis ad duas circiter tertias longitudinis partes usque candidis. Cauda duodecim constat rectricibus: binæ intermediæ cineræ, & aliquid nigrescentis versùs apicem admixtum habentes: laterales omnes nigre, duabus tamen utrinque extimis apice dilutè cinereis. Supra nares & circa oris angulos longiusculi rigent pili nigri, antrosum versi, setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Madagascaria*, unde in *musæum Realmurianum* à *D. Poivre* allata.

& les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, mais plus claire. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les plumes de l'aile sont noirâtres; leur bord extérieur est cendré dans toute la longueur de la plume, & l'intérieur est blanc depuis l'origine de la plume jusque vers les deux tiers de sa longueur seulement. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont cendrées, & mêlées d'un peu de noirâtre vers le bout: toutes les latérales sont noires, mais les deux plus extérieures de chaque côté sont terminées de cendré clair. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

** 18. LE TYRAN.

Muscicapa superne griseo-fusca, infernè alba; pectore cinereo-albo; capite superius nigrescente, pennis verticis in exortu luteis; rectricibus fuscis, marginibus rufis. . . . TYRANNUS.

Turdus coronâ rubrâ. Klein. Avi. pag. 69. N°. 25.

Pica Americana cristata. Frisch. hujus icon accurata Tab. 62.

Tyrannus. Catesb. Tom. I. pag. 55; avec une figure exacte Pl. 55.

Les Allemands l'appellent KLEINE AMERICANISCHE NEUNTODER. Frisch.
Les Anglois, TYRANT. Catesb.

Il est un peu moins gros que le *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue trois pouces trois lignes; son pied neuf lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a treize pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est noirâtre. Sur le sommet de la tête est une tache jaune, peu apparente : elle provient de ce que les plumes encet endroit sont jaunes à leur origine, & terminées de noirâtre, qui est la couleur qui paroît le plus. La partie supérieure du col, le dos & le croupion, ainsi que les plumes scapulaires, sont d'un gris-brun. Les couvertures du dessus des aîles & celles du

Turdo Iliaco nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & decem lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum quatuor lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum; cauda tres pollices & totidem lineas; pes novem cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas : laterales paulò sunt breviores; & posticus cum anticorum intimo longitudine convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Caput superius nigricat. In capitis vertice macula adest lutea, parùm apparens : quæ macula pennis efformatur eo in loco in exortu luteis, nigricante terminatis; qui color nigricans magis apparet. Pars colli superior, dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt griseo-fuscæ. Alarum tectrices superiores & pennæ caudam

caudam superne cooperientes concolores, marginibus rufis. Guttur, pars colli inferior & pectus ex cinereo albescent. Ventrem & latera vestiunt pennæ albæ. Tectrices caudæ inferiores concolores. Crura griseo-fusca. Alarum remiges fuscae sunt, orisque donantur exterioribus rufis, interioribus sordide albo-rufescentibus. Caudam componunt duodecim rectrices fuscae, marginibus præditæ in tota circumferentia rufis. Supra nares & circa oris angulos longiusculi rigent pili nigricantes, antrosum versi & setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguisque ex fusco nigricant. *Insectis* victitat. In arbuscularum & sepium summitatibus nidificat. Dum femina incubat, mas Aves omnes, *Falcones* etiam & *Aquilas*, procul à nido discedere cogit. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Chervain*. Mense Aprili *Virginiam* quoque & *Carolinam* frequentat, & in eis prolem educat.

dessus de la queue sont de la même couleur & bordées de roux. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un gris-blanc. Le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les jambes sont d'un gris-brun. Les plumes des ailes sont brunes; leur bord extérieur est roux, & l'intérieur est d'un blanc sale & roussâtre. La queue est composée de douze plumes brunes, bordées de roux dans toute leur circonférence. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirâtres, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont d'un brun-noirâtre. Il se nourrit d'*Insectes*. Il fait son nid sur le sommet des arbrisseaux & des buissons. Tandis que la femelle couve, le mâle chasse d'auprès de son nid tous les Oiseaux; même les *Faucons* & les *Aigles*. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*. On le trouve aussi vers le mois d'Avril à la *Virginie* & à la *Caroline*, où il fait ses Petits.

** 19. LE TYRAN DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 2.

Muscicapa superne griseo-fusca, infernè alba; pectore cinereo-albo; rectricibus fuscis, oris exterioribus & apice rufescentibus TYRANNUS DOMINICENSIS.

On l'appelle à S. Domingue PIPIRY ou QUIQUIRY.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue trois pouces deux lignes; son pied huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes & demie: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a treize pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun. Les couvertures du dessus de la queue sont brunes & bordées de roux. La poitrine est d'un

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices explet, & ad extremos ungues sex pollices cum totidem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim lineas longum est; cauda tres pollices cum lineis binis; pes octo lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo cum semi lineas: laterales multò sunt breviores; posticus autem anticorum intimi longitudinem æquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt griseo-fuscæ. Rectrices caudæ superiores fuscæ, marginibus rufis præditæ. Pe-

ctus cinereo-album. Guttur, pars colli inferior, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus cooperientes albæ. Alarum rectrices superiores minores fuscæ, marginibus rufis : majores similiter fuscæ, sed marginibus rufescentibus. Remiges majores fuscæ, apicis tantum margine rufescente : minores quoque fuscæ, oris exterioribus albis, interioribus candicantibus. Caudam componunt duodecim rectrices fuscæ, quarum binæ intermediæ marginibus donantur in tota circumferentia rufescentibus : laterales verò margine rufescente in latere exteriori & apice tantum præditæ sunt. Supra nares & circa oris angulos longiusculi extant pili fusci, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigricantes. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Chervain*.

gris-blanc. La gorge, la partie inférieure du col, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont blanches. Les petites du dessus des ailes sont brunes & bordées de roux : les grandes sont pareillement brunes & bordées de roussâtre. Les grandes plumes des ailes sont brunes, & bordées de roussâtre seulement par le bout : les moyennes sont aussi brunes ; leur bord extérieur est blanc, & l'intérieur blanchâtre. La queue est composée de douze plumes brunes : les deux du milieu sont bordées de roussâtre dans toute leur circonférence ; & toutes les latérales n'ont cette bordure roussâtre que du côté extérieur & à leur bout seulement. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils bruns, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à *S. Dominique*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

** 20. LE TYRAN A QUEUE FOURCHUE.

Voyez Pl. XXXIX. Fig. 3.

Muscicapa superne cinerea, infernè alba ; capite superius & ad latera nigro, pennis verticis in exortu luteis ; rectricibus

D d d ij

nigris, extimæ margine exteriori primâ medietate candidâ; caudâ maximè bifurcâ TYRANNUS CAUDA BIFURCA.

Il est à peu près de la grosseur de l'*Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatorze pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue neuf pouces quatre lignes; son pied sept lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Il a treize pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à environ deux pouces au-delà de l'origine de la queue. La partie supérieure & les côtés de la tête sont noirs. Les plumes du sommet de la tête sont d'un beau jaune à leur origine; mais cette couleur ne paroît point lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. La partie supérieure du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont cendrées. Les couvertures du dessus de la queue sont noires. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés,

Crassitie Alaudam cristatam circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices explet, & ad extremos ungues sex pollices cum duabus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda novem pollices & quatuor lineas; pes septem cum semi lineas, & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem omnium brevissimus. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duos circiter pollices ultra caudæ exortum protenduntur. Caput superius & ad latera nigrum est. Pennæ capitis verticem cooperientes sunt in exortu eleganter luteæ; color autem luteus, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, nullo modo apparet. Partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ cinereæ. Scapulares concolores. Tectrices caudæ superiores nigrae. Guttur, pars

colli inferior, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus obtegentes albæ. Alarum rectrices superiores minores cineræ : majores fusæ. Remiges quoque fusæ, oris interioribus candidantibus. (In quibusdam hujus speciei individuis oras remigum exteriores similiter candidantes observavi : forsitan juniora erant ista ; minorem enim magnitudinem obtinuerant). Caudam componunt duodecim rectrices nigæ ; attamen utrinque extrema, ab ipsius exortu ad mediam circiter longitudinem usque, margine donatur exteriori candidâ. Rectrix utrinque extrema proximè sequentem quatuor pollicum & decem linearum longitudine superat : reliquæ omnes gradatim longitudine minuuntur ad duas intermedias usque omnium brevissimas ; unde fit cauda maximè bifurca. Supra oris angulos exigui rigent pili nigricantes, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *America*. A *Canada* in *musæum Realmurianum* missus est à *D. Comite de la Galissonniere*, &

les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blanchés. Les petites couvertures du dessus des aîles sont cendrées : les grandes sont brunes. Les plumes des aîles sont de cette dernière couleur, & ont leur bord intérieur blanchâtre. (J'ai vu quelques individus de cette espèce dont le bord extérieur des plumes des aîles étoit aussi blanchâtre : cela vient peut-être de ce qu'ils étoient plus jeunes ; car ceux-là étoient plus petits). La queue est composée de douze plumes noires, excepté le bord extérieur de la plus extérieure de chaque côté, qui est blanc depuis l'origine de la plume jusque vers la moitié de sa longueur. La plume de la queue la plus extérieure de chaque côté est plus longue que celle qui la suit de quatre pouces dix lignes : toutes les autres diminuent de longueur par degrés jusqu'aux deux du milieu, qui sont les plus courtes de toutes ; ce qui rend la queue très-fourchue. Au-dessus des coins de la bouche sont de petits poils noirâtres, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve en *Amérique*. Il a été envoyé à

M. de Reaumur de Canada par M. le Comte de la Galissonniere, & de Cayenne par M. des Essars. à Cayana missus à D. des Essars.

** 21. LE TYRAN DE CAYENNE.

Muscicapa superne saturatè fusca, infernè dilutè sulphurea; pectore cinereo; remigibus, rectricibusque saturatè fuscis, oris exterioribus majorum remigum fusco-olivaceis
TYRANNUS CAYANENSIS.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue trois pouces deux lignes; son pied neuf lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a onze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un brun

Præcedenti nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices æquat, & ad extremos ungues quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem lineas longum est; cauda tres pollices cum lineis binis; pes novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores; & posticus cum anticorum intimo longitudine convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ saturatissimè fuscae. Rectrices caudæ su-

periores, sicut & scapulares, concolores. Quæ guttur, partem colli inferiorem & pectus obtegunt, sunt cineræ. Venter, latera, inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus cooperientes colore tinguntur dilutissimè sulphureo. Crura sunt fusco-olivacea. Alarum rectrices superiores minores saturatissimè fuscæ : majores eodem colore tinctæ, & fusco-olivaceo terminatæ. Remiges fusco similiter imbuuntur saturatissimo, orisque donantur interioribus sordidè albo-flavicantibus, exterioribus verò fusco-olivaceis, exceptâ tamen minorum remigum corpori viciniore margine exteriori candicante. Cauda duodecim constat rectricibus saturatissimè fuscis. Supra nares & circa oris angulos longiusculi rigent pili fusci, antrosum versi & setarum instar rigidi. Rostrum fuscum. Pedes, unguesque nigricantes.

Fœmina à mâle differt corpore superiore fusco non ita saturato tincto.

Habitant in *Cayana*, unde in *musæum Realmurianum* missi sunt à *D. Artur*.

très-foncé. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont cendrées. Le ventre, les côtés, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'une couleur de soufre très-claire. Les jambes sont d'un brun-olivâtre. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un brun très-foncé : les grandes sont de la même couleur, & terminées de brun-olivâtre. Les plumes des ailes sont aussi d'un brun très-foncé ; leur bord intérieur est d'un blanc sale & jaunâtre, & l'extérieur est d'un brun-olivâtre, si l'on en excepte cependant celui des moyennes les plus proches du corps, qui est blanchâtre. La queue est composée de douze plumes d'un brun très-foncé. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils bruns, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est brun. Les pieds & les ongles sont noirâtres.

La femelle diffère du mâle par la couleur du dessus de son corps, qui est d'un brun moins foncé.

On les trouve à *Cayenne*, d'où ils ont été envoyés à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

** 22. LE PETIT TYRAN DE CAYENNE.

Muscicapa superne fusca, infernè dilutè sulphurea; pectore cinereo; rectricibus fuscis, lateralibus interiùs maximâ parte rufis TYRANNUS CAYANENSIS MINOR.

Il est à peu près de la grosseur d'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces seulement. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue deux pouces huit lignes; son pied huit lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont brunes. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont cendrées. Le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la

Crassitie *Alaudam* circiter æmulatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues quinque tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pes octo cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem anticorum extremi longitudinem æquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, tectrices caudæ superiores & scapulares pennæ sunt fuscæ. Guttur, collum inferius & pectus pennis vestiuntur cinereis. Venter, latera, crura, tectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus

tus tegentes colore tinguntur dilutè sulphureo. Alarum rectrices superiores minores sunt fuscae : majores concolores , marginibus cinereo-rufescentibus præditæ. Remiges fuscae , oris interioribus rufescentibus ; oræ autem exteriores remigum majorum sunt rufæ , minorum verò rufescentes. Cauda duodecim constat rectricibus : binæ intermediae fuscae : laterales omnes concolores , exceptâ lateris interioris maximâ parte rufâ. Binæ rectrices intermediae laterales longitudine nonnihil excedunt : laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Supra nares & circa oris angulos longiusculi extant pili nigricantes , antrorsum versi , fetarum instar rigidi. Rostrum , pedes , unguesque nigricant. Habitat in *Cayana* , unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Artur*.

queue & celles du dessous des ailes sont d'une couleur de soufre claire. Les petites couvertures du dessus des ailes sont brunes : les grandes sont de la même couleur & bordées de cendré-rouffâtre. Les plumes des ailes sont brunes ; leur bord intérieur est rouffâtre , l'extérieur des grandes est roux & celui des moyennes est rouffâtre. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont brunes : toutes les latérales sont de la même couleur , excepté la plus grande partie de leur côté intérieur , qui est rousse. Les deux plumes du milieu sont un peu plus longues que les latérales , qui vont un peu en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirâtres , tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec , les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à *Cayenne* , d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

*** 23. LE TYRAN DU BRÉSIL.

Voyez *Pl. XXXVI. Fig. 5.*

Muscicapa superne fusca , marginibus pennarum olivaceis ,
Tome II. E e e

infernè lutea ; pennis verticis in exortu aurantiis ; taniâ supra oculos albâ ; rectricibus superne fuscis , marginibus rufescentibus , infernè griseo-olivaceis TYRANNUS BRASILIENSIS.

Pitanga guacu Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 216, in qua hujus icon pessima.*

Jonst. Avi. pag. 148. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 60.

Piranga guacu Brasiliensibus Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag. 165. N°. 1.*

Pitanga guacu Brasiliensibus , Bemtere Lusitanis , Marcgravii. *Willugh.*

Ornith. pag. 146. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XXXVIII.

Les Portugais l'appellent BEMTERE. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Les Brasiliens , PITANGA GUACU. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces dix lignes , & jusqu'à celui des ongles de sept pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes & demie de long ; sa queue trois pouces deux lignes ; son pied huit lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a treize pouces neuf lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un brun foncé ; cependant les plumes du sommet de la tête sont

Merulam crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & decem lineas explet , & ad extremos unguis septem pollices cum quatuor lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos sexdecim cum semi lineas longum est ; cauda tres pollices cum lineis binis ; pes octo lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus cum anticorum extimo longitudine convenit. Alis expansis , extremitates majorum remigum tredecim pollicum & novem linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput in parte superiore saturatè

fufcefcit ; pennæ tamen capitæ verticem cooperientes funt in exortu eleganter aurantiæ , eoque in loco maculam concolorem efformant ; quæ macula , pennis aliæ aliis incumbentibus , non multum apparet. In utroque capitæ latere tænia extat longitudinalis , alba , prope nares orta , fupra oculum ducta , & ad occipitium ufque protenfa. Infra & ponè utrumque oculum macula quoque adeft faturatiffimè fufca. Partem colli fuperiorem , dorfum & uropygium veftiunt pennæ fufcæ , marginibus olivaceis præditæ. Quæ caudam fupèrne cooperiunt , alarum teñtrices fuperiores minores & fcapulares pennæ concolores. Guttur albet. Pars colli inferior , peñtus , venter , latera , crura , teñtrices caudæ inferiores & pennæ alas fubtus tegentes elegantiffimo tinguntur luteo : ex longioribus tamen teñtricibus caudæ inferioribus quælibet exiguis quibusdam variegatur maculis fufcis , in ipfarum medio collocatis. Alarum teñtrices fuperiores majores fufco tinguntur colore , marginibusque rufefcentibus præditæ funt. Remiges quo-

à leur origine d'un bel orangé ; ce qui forme en cet endroit une tache de cette couleur , qui paroît peu lorsque les plumes font couchées les unes fur les autres. De chaque côté de la tête eft une bande longitudinale , blanche , qui commence auprès des narines , paffe par-deffus l'œil , & s'étend jufqu'à l'occiput. Au-deffous & derrière chaque œil eft une tache d'un brun très-foncé. La partie fupérieure du col , le dos & le croupion font couverts de plumes brunes , bordées d'olivâtre. Les couvertures du deffus de la queue , les petites du deffus des aîles & les plumes fcapulaires font de la même couleur. La gorge eft blanche. La partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du deffous de la queue & celles du deffous des aîles font d'un très-beau jaune : il y a cependant quelques petites taches brunes au milieu de chacune des plus longues couvertures du deffous de la queue. Les grandes couvertures du deffus des aîles font brunes & bordées de rouffâtre. Les plumes des aîles font brunes ; leur bord extérieur eft roux , & la plus grande partie de leur côté intérieur eft d'un roux très-

clair. La queue est composée de douze plumes brunes en-dessus & bordées des deux côtés de rouffâtre, & en-dessous d'un gris tirant sur l'olive. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirâtres, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est brun & très-gros. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve au *Brésil*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur*.

des, unguisque nigricantes. Habitat in *Brasilia*, unde in *musæum Reaumurianum* missus.

que fusca, oris exterioribus rufis, & lateris interioris maximâ parte dilutissimo colore rufo tinctâ. Caudam componunt duodecim rectrices superne fusca, marginibus in utroque latere, exteriore scilicet & interiore, rufescentibus, internè verò griseo-olivacea. Supra nares & circa oris angulos longiusculi rigent pili nigricantes, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum crassissimum, fuscum. Pedes, unguisque nigricantes. Habitat in *Brasilia*, unde in *musæum Reaumurianum* missus.

** 24. LE GOBE-MOUCHE DE CAYENNE.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 4.

Muscicapa superne fusca, marginibus pennarum olivaceis, internè lutea; pennis verticis in exortu flavo-aurantiis; taniâ supra oculos albâ; rectricibus superne fuscis, marginibus rufis, internè fusco-olivaceis.... MUSCICAPA CAYANENSIS.

Il n'est pas tout-à-fait si gros qu'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces deux lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes & demie de long; sa queue deux pouces cinq lignes; son pied huit li-

Crassitie ad *Alaudam* accedit, sed eam non adæquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & lineas binas explet, & ad extremos ungues sex pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem cum semi lineas longum; cauda duos pollices &

quinque lineas ; pes octo lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum extimum longitudine æmulatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Capitis superior pars fusca est ; attamen pennæ capitis verticem cooperientes sunt in exortu flavo - aurantiæ ; qui verò color , pennis aliæ aliis incumbentibus , nullo modo apparet. In utroque capitis latere tania extat longitudinalis , alba , ab exortu mandibulæ superioris orta , supra oculum ducta , versùs occipitium usque protensa , ibique alteri connexa. Infra & ponè utrumque oculum majuscula adest macula saturatè fusca. Collum superius , dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscæ , marginibus olivaceis præditæ. Pennæ scapulares , alarum , sicut & caudæ , tectrices superiores minores concolores. Majores verò caudæ & alarum tectrices superiores fuscæ , marginibus rufis. Guttur album. Pars colli in-

gues ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , six lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a dix pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est brune ; cependant les plumes du sommet de la tête sont à leur origine d'un jaune-orangé , mais cette couleur ne paroît pas lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale , blanche , qui commence à l'origine du demi-bec supérieur , passe par-dessus l'œil , & va se réunir à l'autre vers l'occiput. Au-dessous & derrière chaque œil est une grande tache d'un brun foncé. La partie supérieure du col , le dos , le croupion , les petites couvertures du dessus de la queue , les petites du dessus des aîles & les plumes scapulaires sont brunes , chaque plume étant bordée d'olivâtre. Les grandes couvertures du dessus de la queue & les grandes du dessus des aîles sont brunes & bordées de roux. La gorge est blanche. La par-

tie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un beau jaune. Les plumes des ailes sont brunes ; leur bord extérieur est roux, & la plus grande partie de leur côté intérieur est de la même couleur, mais plus claire. La queue est composée de douze plumes brunes en-dessus & bordées extérieurement & intérieurement de roux, & en-dessous d'un brun tirant sur l'olive. Au-dessus des coins de la bouche sont de longs poils noirâtres, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

ferior, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes eleganter luteæ. Remiges fuscæ, oris exterioribus rufis, & lateris interioris maximâ parte rufâ quidem, sed dilutiùs. Caudam componunt duodecim rectrices superne fuscæ, marginibus exterioribus & interioribus rufis, infernè verò fusco-olivaceæ. Supra oris angulos longi sunt pili nigricantes, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguisque nigricant. Habitat in *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Artur*.

** 25. LE GOBE-MOUCHE CENDRÉ DE CANADA.

Voyez Pl. XXXIX. Fig. 4.

Muscicapa superne cinerea, infernè lutea; maculis in vertice & collo inferiore nigris; maculâ narem inter & oculum luteâ; remigibus, rectricibusque griseo-fuscis, oris exterioribus cinereis MUSCICAPA CANADENSIS CINEREA.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que *notre Gobe-mouche*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces sept lignes,

Muscicapæ nostrati non nihil crassitie cedit. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudam extremam quatuor pollices & septem li-

neas æquat, & ad extremos ungues quatuor tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem & undecim lineas; pes octo lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas : laterales paulo sunt breviores; posticus autem cum anticorum extimo longitudine convenit. Alis expansis, extremitates majorum remigum septem pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ in medio nigrae, marginibus cinereis; quo fit ut vertex capitis maculis nigris videatur variegatus. In utroque capitis latere macula quoque adest lutea, narem inter & oculum sita; & insuper infra oculum macula nigra. Capitis posterior pars, collum superius, dorsum, uropygium, tectrices caudæ superiores & scapulares pennæ sunt cinereæ. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera & crura vestiunt pennæ eleganter luteæ, minutis quibusdam maculis nigris in

& jusqu'à celui des ongles de quatre pouces seulement. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq lignes & demie de long; sa queue un pouce onze lignes; son pied huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a sept pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Le dessus de la tête est couvert de plumes noires dans leur milieu & bordées de cendré; ce qui fait paroître le sommet de la tête tout tacheté de noir. Il y a aussi de chaque côté de la tête une tache jaune, placée entre la narine & l'œil; & une tache noire au-dessous de l'œil. Le derrière de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont cendrées. La gorge, la partie inférieure du col; la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont d'un beau jaune, varié de quelques petites taches noires à la partie inférieure du col seulement.

Les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blanchâtres : les petites du dessus des aîles sont cendrées ; les grandes sont de la même couleur du côté extérieur & d'un gris-brun du côté intérieur. Les plumes des aîles sont d'un gris-brun ; leur bord extérieur est cendré, & l'intérieur est blanchâtre. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun, bordées extérieurement de cendré. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont quelques petits poils bruns, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est gris-brun. Les pieds & les ongles sont jaunâtres. On le trouve en *Canada*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. le Comte de la Galissonniere*.

collo inferiore tantum variegata. Inferiores caudæ rectrices & pennæ alas subtus tegentes candicantes : alarum rectrices superiores minores cinereæ ; majores in latere exteriori concolores, in interiori griseo - fuscæ. Remiges quoque griseo-fuscæ, oris exterioribus cinereis, interioribus albidis. Caudam componunt duodecim rectrices griseo - fuscæ, oris exterioribus cinereis præditæ. Supra nares & circa oris angulos quidam extant exigui pili fusci, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum griseo-fuscum. Pedes, unguisque flavicantes. Habitat in *Canada*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Comite de la Galissonniere*.

** 26. LE GOBE-MOUCHE OLIVE DE CANADA.

Muscicapa superne fusco-olivacea, infernè sordidè alba, fusco-olivaceo confusè mixta ; taniâ duplici in alis sordidè albâ ; rectricibus fuscis, oris exterioribus fusco-olivaceis
MUSCICAPA CANADENSIS OLIVACEA.

Il est à peu près de la grosseur de *notre Gobe-mouche*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois

Craffitie Muscicapam nostratè circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & octo lineas æquat, & ad extremos un-
 gues

gues tres pollices & undecim lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex lineas longum est; cauda unum pollicem & undecim lineas; pes septem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque lineas : laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est septem pollicum & decem linearum; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem non attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, teñtrices caudæ superiores & scapulares pennæ sunt fusco-olivaceæ. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter supremus & latera pennis vestiuntur sordidè albis, fusco-olivaceo confusè mixtis. Quæ crura obtegunt, sunt fusco-olivaceæ. Venter imus & teñtrices caudæ inferiores ex albo flavicant. Pennæ alas subtus cooperientes dilutè luteæ : teñtrices alarum superiores minores fusco-olivaceæ; majores fuscæ, apicibus præditæ sordidè albis, quibus in utraque ala duplex efficitur tania transversa, concolor.

Tome II.

pouces onze lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six lignes de long; sa queue un pouce onze lignes; son pied sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a sept pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent pas tout-à-fait jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un brun tirant sur l'olive. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont d'un blanc sale, mêlé confusément de brun-olivâtre. Les jambes sont de cette dernière couleur. Le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-jaunâtre. Celles du dessous des aîles sont d'un jaune clair : les petites du dessous sont d'un brun tirant sur l'olive; les grandes sont brunes & terminées de blanc sale; ce qui forme sur chaque aîle deux bandes transversales de cette couleur. Les plumes des aîles sont

Fff

brunes ; leur bord intérieur est d'un blanc-jaunâtre ; l'extérieur des grandes est d'un brun-olivâtre , & celui des moyennes est d'un blanc sale. La queue est composée de douze plumes brunes , bordées extérieurement de brun-olivâtre. Au-dessus des coins de la bouche sont quelques petits poils bruns , tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec , les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve en *Canada* , d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Gautier*.

Alarum remiges sunt fuscae , orisque donantur interioribus albo-flavicantibus ; oræ autem exteriores majorum remigum sunt fusco-olivaceæ , minorum verò sordide albæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus fuscis , oris exterioribus fusco-olivaceis. Supra oris angulos quidam rigent exigui pili fusci , antrosum versi & setarum instar rigidi. Rostrum , pedes , unguesque fusci. Habitat in *Canada* , unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Gautier*.

27. LE GOBE-MOUCHE DE LA JAMAÏQUE.

Muscicapa superne saturatè olivacea , infernè candicans , olivaceo admixto ; tæniâ per oculos fuscescente , supra oculos albidâ ; rectricibus superne saturatè olivaceis , infernè cinereis , oris interioribus lateralium albis . . . MUSCICAPA JAMAICENSIS.

Luscinia Muscicapa oculis rubris. Klein. Avi. pag. 74. N°. 6.

Oriolus subolivaceus canorus , rostri apice attenuato , adunco. Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 476.

Preneur de mouches aux yeux rouges. Catesb. Tom. I. pag. 54 ; avec une figure passable Pl. 54.

Moucherole olive. Edwards. Glanur. pag. 93. chap. XLIII ; avec une figure exacte Pl. 253.

Les Anglois l'appellent RED EY'D FLY-CATCHER. Catesb. OLIVE-COLOURED FLY-CATCHER. Edwards.

Les Habitans de la Jamaïque, WHIP-TOM-KELLY. Browne. Edwards.

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à ce-

Præcedentem crassitie paululum antecellit. Ipsius longitudo à rostri apice ad cau-

dam extremam quinque pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues quinque tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo lineas longum est; cauda unum pollicem & decem lineas; pes sex cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum extimi longitudinem æquat. Alæ complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem usque protenduntur. Capitis superior pars, collum superius, dorsum & uropygium penis vestiuntur viridi-fuscescentibus sive potius saturatè olivaceis. Scapulares, alarum tectrices superiores & pennæ alas superne cooperientes eodem imbuuntur colore. In utroque capitis latere exigua extat tænia longitudinalis, fuscescens, à basi mandibulæ superioris orta, per oculos ducta & versùs occipitium usque protensa, cui alia adest parallela tænia albida, supra oculos posita. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores candicant, &

lui de la queue est d'environ cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces seulement. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long; sa queue un pouce dix lignes; son pied six lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un verd-brunâtre ou plutôt d'un olive foncé. De chaque côté de la tête est une petite bande longitudinale, brunâtre, qui part de la base du demi-bec supérieur & s'étend jusque vers l'occiput, en passant par les yeux, au-dessus desquels est une autre bande blanchâtre, parallele à la première. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanchâ-

tre mêlé d'une légère teinte d'olivâtre. Celles du dessous des aîles & le bord de l'aîle font blanchâtres. Les plumes des aîles font d'un olive foncé en-dessus, cendrées en-dessous, & ont leur bord intérieur blanc. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu font d'un olive foncé en-dessus & cendrées en-dessous : toutes les latérales font de la même couleur & ont leur bord intérieur blanc. L'iris des yeux est rouge. Au-dessus des coins de la bouche font quelques poils noirâtres, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le demi-bec supérieur est d'une couleur de plomb, & l'inférieur incline vers la couleur de chair. Les pieds sont bruns. On le trouve en été à la Caroline, & en hiver à la Jamaïque.

aliquid olivacei admixtum habent. Pennæ alas subtus tegentes, alarumque margines albidæ. Remiges superne saturatè olivaceæ, infernè cinereæ, oris interioribus candidis. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ sunt superne saturatè olivaceæ, infernè cinereæ : laterales omnes concolores, oris interioribus albis. Oculorum irides rubræ. Supra oris angulos quidam rigent pili nigricantes, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Mandibula superior colore plumbeo tingitur, inferior verò ad carneum colorem inclinat. Pedes sunt fuscii. Habitat æstate in Carolina, hieme verò in Jamaica.

28. LE GOBE-MOUCHE HUPÉ DE VIRGINIE.

Muscicapa cristata superne obscurè viridis, infernè lutea; collo inferiore & pectore cinereis; rectricibus fuscis, lateralibus interiùs spadiceis . . . MUSCICAPA VIRGINIANA CRISTATA.

Turdus cristatus. *Klein. Avi. pag. 69. N^o. 28.*

Preneur de mouches huppé. *Catesb. Tom. I. pag. 52; avec une figure exacte Pl. 52.*

Les Anglois l'appellent CRESTED FLY-CATCHER. *Catesb.*

Il est à peu près de la grosseur d'une Alouette hupée. Sa

Cum *Alauda cristata* crassitie circiter convenit. Ipsius

longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo circiter pollices explet, & ad extremos ungues sex pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim cum semi lineas longum; cauda tres pollices & novem lineas; pes decem cum semi lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue novem lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anteriorum extimam longitudine æmulatur. Alæ complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput , pars colli superior, dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt obscurè virides. Quæ summum caput obtegunt, reliquas longitudine excedunt, & cristam efformant. Alarum tectrices superiores & pennæ caudam superne tegentes fuscæ. Guttur, pars colli inferior & pectus cinereo imbuuntur colore. Ventrem, latera, crura & tectrices caudæ inferiores luteus tingit color. Alarum remiges fuscæ sunt, oris exterioribus majorum spadiceis. Cauda duodecim constat rectricibus, quarum binæ intermediæ penitus fuscæ : laterales verò in latere exte-

longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes & demie de long ; sa queue trois pouces neuf lignes ; son pied dix lignes & demie ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un verd sombre. Les plumes du sommet de la tête sont plus longues que les autres, & forment une hupe. Les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont brunes. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont cendrées. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont jaunes. Les plumes des aîles sont brunes ; & les grandes sont bordées extérieurement de rougebay. La queue est composée de douze plumes : les deux du mi-

lieu sont entièrement brunes : les latérales sont de la même couleur du côté extérieur & leur côté intérieur est d'un rouge-bay. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirâtres, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à la *Caroline* & à la *Virginie*, mais pendant l'été seulement. Il y fait ses Petits.

riore concolores, in interiorē spadiceæ. Oculorum irides avellaneæ. Supra nares & circa oris angulos longirigent pili nigricantes, anteriorum versi, setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Carolina*, & *Virginia*, sed æstate tantum; in eisquenidificat & prolem educat.

** 29. LE GOBE-MOUCHE BLANC HUPÉ DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Voyez Pl. XLI. Fig. 2.

Muscicapa cristata, alba; capite & collo superiore nigro-videscens; rectricibus albis, oris exterioribus & scapis nigris . . . MUSCICAPA CRISTATA ALBA CAPITIS BONÆ SPEI.

Il n'est guères plus gros que notre *Gobe-mouche*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue quatre pouces; son pied sept lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle,

Craffitie *Muscicapam nostratē* non multum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim lineas longum est; cauda quatuor pollices; pes septem cum semi lineas; & trium digitorum antico-

rum medius cum ungue septem lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem cum anticorum extimo longitudine convenit. Alis expansis , extremitates majorum remigum decem pollicum & trium linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput , guttur & partem colli superiorem vestiunt pennæ splendide nigro-viridescentes. Istarum quæ summum caput cooperiunt , aliquot longissimæ sunt & strictiores , elegantemque cristam efformant. Quæ dorsum , uropygium , collum inferius , pectus , ventrem , latera & crura obtegunt , sicut & scapulares , tectrices caudæ superiores & inferiores & pennæ alas subtus tegentes , albescent. Alarum tectrices superiores minores , nec non majores corpori finitimæ , concolores , attamen scapis nigris præditæ. Omnes pennæ istæ sunt in exortu nigrae ; quæ tamen nigredo , dum pennæ aliæ aliis incumbunt , nullo modo apparet. Tectrices alarum superiores majores à corpore remotiores sunt nigrae , marginibus in tota cir-

sept lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a dix pouces trois lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête , la gorge & la partie supérieure du col sont d'un noir fort brillant & changeant en verd. Quelques-unes des plumes du sommet de la tête sont extrêmement longues & étroites , & forment une belle hupe. Le dos , le croupion , les plumes scapulaires , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blanches. Les petites du dessus & les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur , mais elles ont leur tige noire. Toutes ces plumes sont noires à leur origine ; mais cette couleur ne paroît pas lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. Les grandes couvertures du dessus des aîles les plus éloignées du corps sont noires & bordées de blanc tout autour. Les plumes des aîles sont pareillement noires , & bordées de blanc des deux côtés , & non

pas à leur bout. La première est plus courte d'un pouce sept lignes que la quatrième & la cinquième, qui sont les plus longues de toutes. Les plumes de la queue sont blanches, & bordées extérieurement de noir; leurs tiges sont de cette dernière couleur. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant un peu par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Il y a au-dessus des narines & vers les coins de la bouche de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec & les ongles sont noirâtres. Les pieds sont d'une couleur de plomb. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où il a été apporté à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

cumferentia candidis. Remiges similiter nigrae, oris in utroque latere, non verò apice, albis. Prima remigum unius pollicis & septem linearum longitudine superatur à quarta & quinta, quae sunt omnium longissimae. Rectrices albae, oris exterioribus & scapis nigris praeditae. Binae intermediae laterales nonnihil longitudine excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Supra nares & circa oris angulos longi sunt pili nigri, antrosum versi & setarum instar rigidi. Rostrum, unguesque nigricant. Pedes colore plumbeo tinguntur. Habitat in *Capite Bonae Spei*, unde in *museum D. Aubry* allata est.

30. LE GOBE-MOUCHE HUPÉ DU BRÉSIL.

Muscicapa cristata, superne dilutè spadicea, infernè alba; capite nigro-viridescente; tectricibus alarum superioribus aureis; rectricibus dilutè spadiceis *MUSCICAPA BRASILIENSIS CRISTATA.*

Turdus cristatus. *Klein. Avi. pag. 70. N°. 31.*

Monedula. *Moehr. Avi. Gen. 11.*

Avis Paradisiaca, *Brasiliensis*, seu *Cuiriri Acamaku*, cristata. *Seb. Vol. II. pag. 93. hujus icon non satis accurata Tab. 87. Fig. 2.*

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur de-

Crassitie præcedentem paululum antecellit. Ipsius longitudo

gitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem circiter pollices explet. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; cauda verò tres pollices & quinq̃ue lineas. Alæ complicatæ ad tertiam circiter longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput & guttur vestiunt pennæ splendidissimè nigro-viridescentes. Quæ capitis verticem cooperiunt, cæteris multò longiores sunt & strictiores, elegantemque cristam efficiunt. Pars colli superior, dorsum, uropygium, scapulares pennæ & rectrices caudæ superiores sunt dilutè spadiceæ. Collum inferius, pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores albescent. Alarum rectrices superiores eleganti auro colore tinguntur. Remiges, sicut & rectrices, sunt dilutè spadiceæ. Binæ rectrices intermediae lateralium longitudinem nonnihil superant; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque brevior. Oculi igneo colore lucent. Supra nares & circa oris angulos longi rigent pili nigri, antrosum versi & setarum inf-

Tome II.

puis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; & sa queue trois pouces cinq lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, & la gorge sont d'un noir-vert fort brillant. Les plumes du sommet de la tête sont beaucoup plus longues que les autres, fort étroites, & forment une belle hupe. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un rouge-bay clair. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Celles du dessus des ailes sont d'une belle couleur d'or. Les plumes des ailes & celles de la queue sont d'un rouge-bay clair. Les deux du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont d'une couleur de feu. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils

G g g

noirs , tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec est rougeâtre. *Seba* se trompe peut-être , lorsqu'il dit qu'il vient du *Brésil* ; car il ressemble beaucoup à ceux que nous recevons d'*Afrique* & de *Madagascar*.

tar rigidi. Rostrum rubescit. Secundum *Sebam* habitat in *Brasilia* : forsan in errorem inducitur ; in multis enim convenit hæc species cum illis quæ ex *Africa* & *Madagascaria* ad nos perveniunt.

** 31. LE GOBE-MOUCHE HUPÉ DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Voyez Pl. XLI. Fig. 1.

Muscicapa cristata, superne dilutè spadicea, infernè alba ; pectore cinereo-albo ; capite & collo superiore nigro-viridescentibus ; rectricibus dilutè spadiceis MUSCICAPA CRISTATA CAPITIS BONÆ SPEI.

Il n'est guères plus gros que notre *Gobe-mouche*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces six lignes , & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long ; sa queue trois pouces neuf lignes ; son pied sept lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , a aussi sept lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a neuf pouces huit lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées ,

Craffitie *Muscicapam* nostratam non multum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex lineas æquat , & ad extremos ungues quinque pollices cum lineis binis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos undecim lineas longum est ; cauda tres pollices & novem lineas ; pes septem lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem quoque lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus cum anticorum extimo longitudine convenit. Ab extremo ad extremum alarum exten-

farum distantia est novem pollicum & octo linearum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tertiam longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, guttur & collum superius pennis vestiuntur splendide nigro-viridescentibus. Quædam ex istis quæ summum caput cooperiunt, longissimæ sunt & strictissimæ, elegantemque cristam efformant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, rectrices alarum superiores & pennæ caudam superne tegentes sunt dilute spadiceæ. Pars colli inferior & pectus ex cinereo albescent. Ventrem, latera & crura vestiunt pennæ albæ. Inferiores caudæ rectrices concolores. Pennæ alas subtus tegentes dilute spadiceæ, apicibus albis. Alarum remiges color tingit dilute spadiceus, attamen in latere interiore nonnihil saturatior. Prima remigum uno pollice & quinque lineis brevior est quàm quarta & quinta, quæ sunt omnium longissimæ. Caudam componunt duodecim rectrices dilute spadiceæ, scapis spadiceo dilutius tinctis præditæ. Binæ rectrices intermedia lateralis longitudinem paulu-

s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge & la partie supérieure du col sont d'un noir fort brillant & changeant en verd. Quelques-unes des plumes du sommet de la tête sont extrêmement longues & étroites, & forment une belle hupe. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un rouge-bay clair. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un gris-blanc. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Celles du dessous des aîles sont d'un rouge-bay clair, & terminées de blanc. Les plumes des aîles sont d'un rouge-bay clair; leur côté intérieur est un peu plus rembruni. La première est plus courte d'un pouce cinq lignes que la quatrième & la cinquième, qui sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un rouge-bay clair; leurs tiges sont d'une couleur encore plus claire. Les deux plumes du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant un peu & par degrés, jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Il y

a au - dessus des narines & vers les coins de la bouche de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec & les ongles sont noirâtres. Les pieds sont d'une couleur de plomb. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où il a été apporté à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

lùm excedunt; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque brevior. Supra nares & circa oris angulos longi sunt pili nigri, antrorsum versi & fetarum instar rigidi. Rostrum, unguisque nigricant. Pedes plumbeo colore tinguntur. Habitat in *Capite Bonæ Spei*, unde in *musæum D. Aubry* allata est.

** 32. LE GOBE-MOUCHE HUPÉ DE L'ISLE DE BOURBON.

Voyez le mâle Pl. XXXIX. Fig. 5.

Muscicapa cristata, superne dilutè spadicea, infernè cinerea; capite nigro-viridescente (*mas*) cinereo (*fœmina*); rectricibus dilutè spadiceis, fusco mixtis MUSCICAPA BORBONICA CRISTATA.

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces seulement. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes & demie de long; sa queue deux pouces sept lignes; son pied huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & quatuor lineas æquat, & ad extremos ungues quatuor tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & septem lineas; pes octo lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum

intimi longitudinem æquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum octo pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput vestiunt pennæ nigro-viridescentes & violaceo colore variantes pro vario quo lucis radii incidunt modo. Quæ guttur, collum, pectus, ventrem, latera & crura cooperiunt, sunt cinereæ; qui color ad anum fit dilutior. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alarumque rectrices superiores minores sunt dilutè spadiceæ. Rectrices caudæ superiores & inferiores & pennæ alas subtus cooperientes albæ: alarum verò rectrices superiores majores fuscæ, marginibus dilutè spadiceis. Remiges nigricant, orisque donantur exterioribus dilutè spadiceis, interioribus candidantibus. Caudam componunt duodecim rectrices dilutè spadiceæ, cum pauco fusco confusè mixto. Supra nares & circa oris angulos longi rigent pili nigri, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque fusci.

même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a huit pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête est d'un noir changeant en verd & même en violet, selon les différens jours auxquels on l'expose. La gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés & les jambes sont cendrées: cette couleur est plus claire vers l'anus qu'ailleurs. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un rouge-bay clair. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blanches: les grandes du dessus des aîles sont brunes & bordées d'un rouge-bay clair. Les plumes des aîles sont noirâtres; leur bord extérieur est d'un rouge-bay clair, & l'intérieur est blanchâtre. La queue est composée de douze plumes d'un rouge-bay clair, mêlé confusément d'un peu de brun. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a la tête cendrée.

On les trouve à *Madagascar* & à l'*Isle de Bourbon*, d'où ils ont été envoyés à *M. de Reaumur* par *M. de Lanux*.

Fœmina capite cinereo à *mare* discrepat.

Habitant in *Madagascaria* & *Borbonica Insula*, unde in *museum Realmurianum* missæ à *D. de Lanux*.

** 33. LE GOBE-MOUCHE HUPÉ DU SÉNÉGAL.

Voyez *Pl. XXXIX. fig. 2.*

Muscicapa cristata, superne castanea, infernè saturatè cinerea; capite & collo inferiore nigro-viridescentibus; rectricibus castaneo-purpureis *MUSCICAPA SENEGALENSIS CRISTATA.*

Il est à peu près de la grosseur de la *Bergeronette jaune*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue quatre pouces sept lignes; son pied sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Il a neuf pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'au tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge, &

Crassitie Motacillam flavam circiter æquat. *Ipsius* longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues quinque tantum pollices. *Rostrum* ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; *cauda* quatuor pollices cum septem lineis; *pes* septem lineas; & *trium digitorum anticorum medius* cum ungue sex lineas: *laterales* paulò sunt breviores; & *posticus* cum *anticorum* extimo longitudine convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est novem pollicum; *alæ* verò complicatæ ad tertiam circiter longitudi-

nis caudæ partem extenduntur. Caput, guttur & collum inferius sunt splendide nigro-viridescentia, idque secundum varios ad lucem objectus. Pennæ capitis verticem cooperientes reliquas paululum longitudine excedunt, & cristam efficiunt. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, & superiores caudæ rectrices eleganti castaneo tinguntur. Pectus, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores saturatissimo imbuuntur cinereo, qui tamen color, versum anum procedendo, sensim atque sensim fit dilutior. Alarum rectrices inferiores cinereo & castaneo variegatæ sunt: superiores minores eodem ac dorsum castaneo tinctæ; majores verò fuscæ, marginibus castaneis. Alarum remiges fuscæ, oris exterioribus castaneis, interioribus verò, sed minorum tantum, rufescentibus: minorum autem binæ corpori viciniores in utroque latere eleganti tinguntur castaneo; proximè sequens concolor, sed in latere exteriori tantum. Cauda duodecim constat rectricibus castaneo-purpureis: binæ intermediae lateralibus

la partie inférieure du col sont d'un noir brillant & changeant en verd selon qu'on les expose à différens jours. Les plumes du sommet de la tête sont un peu plus longues que les autres, & forment une huppe. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un beau marron. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré très-foncé, mais qui s'éclaircit un peu en approchant vers l'anus. Les couvertures du dessous des ailes sont variées de cendré & de marron: les petites du dessus sont du même marron que le dos; & les grandes sont brunes & bordées de marron. Les plumes des ailes sont brunes; leur bord extérieur est marron, & l'intérieur des moyennes est rouffâtre: de ces dernières les deux plus proches du corps sont des deux côtés d'un beau marron; & celle qui les suit immédiatement est de cette dernière couleur du côté extérieur seulement. La queue est composée de douze plumes d'un marron-pourpré: les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en dimi-

nuant par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est d'un cendré foncé. Les pieds & les ongles sont gris. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

sunt longiores; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Supra nares & circa oris angulos longi extant pili nigri, antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum saturatè cinereum. Pedes, unguisque grisei. Habitat in *Senegalenſi* regione, unde in *museum Reaumurianum* missa à *D. Adanson*.

** 34. LE GOBE-MOUCHE A LONGUE QUEUE
DE MADAGASCAR.

Voyez le mâle Pl. XL. Fig. 1.

Muscicapa cristata, macrourus, castanea; capite nigro-viridescente; rectricibus alarum inferioribus albis; rectricibus castaneis, binis intermediis longissimis
MUSCICAPA MADAGASCARIENSIS LONGICAUDA.

Les Habitans de Madagascar l'appellent SCHET-ALL.

Il est un peu plus gros que notre *Gobe-mouche*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces cinq lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue quatre pouces huit lignes; son pied sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle,

Muscicapam nostratem crassitie paululùm superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & quinque lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda quatuor pollices cum octo lineis; pes septem lineas; & trium digitorum anticorum

anticorum medius cum ungue sex lineas : laterales paulo sunt breviores ; & posticus anticorum extimi longitudinem ferè adæquat ; intimus autem omnium brevissimus. Alis expansis , extremitates majorum remigum novem pollicum & trium linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad sexdecim lineas ultra caudæ exortum protenduntur. Caput, pro vario quo lucis radii incidunt modo , ex nigro viridescit. Pennæ summum caput vestientes reliquis paulo sunt longiores , & cristam efformant. Guttur, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera & tectrices caudæ superiores & inferiores eleganti imbuuntur castaneo. Crura eodem colore tinguntur, attamen circa calcaneum albedine cinguntur. Alarum tectrices inferiores albent : superiores minores corpori finitimæ sunt dorso concolores ; minores à corpore remotiores nigro-viridescentes ; majores verò in exortu nigræ, apicibus albis, albo scilicet & nigro quamlibet pennam obliquè dividuntibus. Remiges majores nigræ, omnes, binis primo-

Tome II.

sex lignes ; les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est presque aussi long que l'extérieur de ceux de devant ; l'intérieur est le plus court de tous. Il a neuf pouces trois lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à seize lignes au-delà de l'origine de la queue. La tête est d'un noir changeant en verd selon les différens jours auxquels on l'expose. Les plumes de son sommet sont un peu plus longues que les autres, & forment une hupe. La gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un beau marron. Les jambes sont de la même couleur, excepté vers le talon, où elles sont entourées de blanc. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches : les petites du dessus les plus proches du corps sont du même marron que le dos ; les petites les plus éloignées du corps sont d'un noir changeant en verd ; & les grandes sont noires à leur origine & terminées de blanc ; ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume. Les grandes plumes des aîles sont noires, & toutes, excepté les deux premières, bordées de

H h h

blanc des deux côtés depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur : les moyennes sont pareillement noires & bordées de blanc des deux côtés, mais dans toute leur longueur : il faut cependant en excepter les trois plus proches du corps, qui sont du même marron que le dos, mêlé d'un peu de noirâtre tout le long de la tige de chaque plume. La queue est composée de douze plumes d'un beau marron : les deux du milieu sont plus longues d'un pouce huit lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté ; & les latérales vont toutes en diminuant un peu & par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est jaune : les paupières sont bleues. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

ribus exceptis, in utroque latere ab ipsarum exortu ad mediam circiter longitudinem usque marginibus candidis præditæ : minores similiter nigrae, oris exterioribus & interioribus per totam longitudinem albis donatæ, si tamen excipias tres corpori finitimas, eodem ac dorsum castaneo imbutas, cum paucis nigricante secundum cujuslibet pennæ scapi longitudinem admixto. Caudam componunt duodecim rectrices eleganter castaneæ, quarum binæ intermediae utrinque proximè sequentem unius pollicis & octo linearum longitudine superant ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Oculorum irides luteæ ; palpebræ cœruleæ. Supra nares & circa oris angulos longi rigent pili nigri, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Madagascaria*, unde in *museum Realmurianum* allata à *D. Poivre*.

** 35. LE GOBE-MOUCHE A LONGUE QUEUE BLANCHE
DE MADAGASCAR.

Voyez le mâle Pl. XL. Fig. 2.

Muscicapa cristata, macrouros, castanea; capite nigro-viridescente; rectricibus binis intermediis longissimis, albis, oris exterioribus primâ medietate & scapis nigris; latera- libus dilutè castaneis; extimâ exteriùs nigrâ, interiùs albâ, margine nigrâ MUSCICAPA MADAGASCARIENSIS
ALBICILLA LONGICAUDA.

Les Habitans de Madagascar l'appellent SCHET VOULOULOU.

Craffitie cum præcedente convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos unguis quinque pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum est; cauda septem pollices & lineam unam; pes sex cum semi lineas; & trium digitorum anticorum mediùs cum ungue eâdem mensurâ donatus: laterales paulò sunt breviores; posticus autem anticorum intimum longitudine adæquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est novem pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ ad sexdecim lineas ultra caudæ exortum pro-

Il est de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue sept pouces une ligne; son pied six lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi six lignes & demie de longueur: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a neuf pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à seize lignes au-delà de l'origine de la queue. La tête est d'un noir changeant en verd selon qu'elle

est exposée à différens jours. Les plumes de son sommet sont un peu plus longues que les autres, & forment une hupe. La gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un beau marron. Les petites du dessus les plus proches du corps sont de la même couleur; les petites les plus éloignées du corps sont d'un noir changeant en verd; & les grandes sont noires à leur origine & terminées de blanc, ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume. Les grandes plumes des ailes sont noires, & toutes, excepté les deux premières, sont bordées de blanc des deux côtés depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur: les moyennes sont pareillement noires & bordées de blanc des deux côtés, mais dans toute leur longueur: il faut cependant en excepter les trois plus proches du corps, qui sont du même marron que le dos. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont blanches & bordées extérieurement de noir depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; de plus

tendentur. Caput secundum varios ad lucem objectus ex nigro viridescit. Pennæ summum caput vestientes reliquas paululum longitudine superant, & cristam efficiunt. Guttur, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ superiores & inferiores & pennæ alas subtus cooperientes eleganti castaneo tinguntur. Alarum rectrices superiores minores corpori finitimæ concolores; minores à corpore remotiores sunt nigro-viridescentes; majores verò in exortu nigrae, albo terminatae, albedine & nigredine unamquamque pennam obliquè dividuntibus. Remiges majores nigrae, omnes, duabus prioribus exceptis, in utroque latere ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque marginibus albis præditæ: minores similiter nigrae, marginibus candidis in utroque latere, sed per totam longitudinem, donatae: tres tamen corpori viciniore sunt dorso concolores. Cauda duodecim constat rectricibus, quarum binæ intermediæ albæ, oris exterioribus ab exortu rectricis

ad mediam circiter longitudinem usque nigris; scapis quoque per totam fermè longitudinem nigris præditæ sunt : quatuor utrinque sequentes castaneo tinguntur diluto : utrinque tandem extrema est nigra , sed in latere interiore maximâ parte albet & margine nigrâ donatur. Rectrices binæ intermediae utrinque proximè sequentem quatuor pollicum & duarum linearum longitudine superant ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorē. Oculorum irides luteæ : palpebræ cœruleæ. Supra nares & circa oris angulos longiusculi rigent pili nigri , antrorsum versi & setarum instar rigidi. Rostrum , pedes , unguesque nigri. Habitat in *Madagascaria* , unde in *musæum Realmurianum* allata à *D. Poivre*.

leur tige est noire dans presque toute la longueur de la plume : les quatre qui les suivent de chaque côté sont d'un marron clair : & la plus extérieure de chaque côté est noire , ayant la plus grande partie de son côté intérieur blanche & bordée de noir. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues de quatre pouces deux lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté ; & les latérales vont toutes en diminuant un peu & par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté , qui est la plus courte. L'iris des yeux est jaune : les paupières sont bleues. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs , tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec , les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *Madagascar* , d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

** 36. LE GOBE-MOUCHE VARIÉ A LONGUE QUEUE
DE MADAGASCAR.

Voyez le mâle Pl. XL. Fig. 3.

Muscicapa cristata, macrouros, superne nigro-viridescens, apicibus pennarum albis, infernè alba; capite & collo nigro-viridescens; rectricibus binis intermediis longissimis, albis, oris exterioribus & scapis nigris; lateralibus exteriùs nigris, interiùs albis, margine nigrâ.... MUSCICAPA MADAGASCARIENSIS VARIA LONGICAUDA.

Les Habitans de Madagascar l'appellent SCHET.

Il est un peu plus gros que les deux précédens. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces sept lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue sept pouces sept lignes; son pied sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a neuf pouces huit lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à seize lignes au-delà de l'origine de la queue. La tête, la gorge & le col sont d'un noir brillant & changeant

Præcedentes binas crassitie paululùm antecellit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & septem lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem lineas longum est; cauda septem pollices cum totidem lineis; pes septem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus anticorum intimum longitudine adæquat. Alis expansis, extremitates majorum remigum novem pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sexdecim usque lineas ultra caudæ exortum

protenduntur. Caput, guttur & collum sunt splendide nigra, & pro vario ad lucem objectu ex nigro viridescunt. Pennæ summum caput vestientes reliquas longitudine paululum excedunt, & cristam efformant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alarumque teñtrices superiores minores albo & nigro viridescente variegantur, quâlibet scilicet pennâ in exortu nigrâ, albo terminatâ. Pectus, venter, latera, crura, teñtrices caudæ superiores & inferiores & pennæ alas subtus tegentes alben: quâlibet tamen penna in exortu nigricat, qui color nigricans, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, nullo modo apparet. Alarum teñtrices superiores majores sunt in exortu nigræ, albo terminatæ, albedine & nigredine unamquamque pennam obliquè dividuntibus. Remiges majores nigræ, omnes, tribus primoribus exceptis, in utroque latere ab exortu ad mediam circiter longitudinem usque marginibus albis præditæ: minores similiter nigræ, marginibus candidis in utroque latere, sed per totam longitudinem, donatæ. Caudam

en verd selon les différens jours auxquels on les expose. Les plumes du sommet de la tête sont un peu plus longues que les autres, & forment une hupe. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des ailes sont variées de blanc & de noir changeant en verd, chaque plume étant noire à son origine & terminée de blanc. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont blanches: chaque plume est cependant noirâtre à son origine, mais cette couleur ne paroît pas lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. Les grandes couvertures du dessus des ailes sont noires à leur origine & terminées de blanc, ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume. Les grandes plumes des ailes sont noires, & toutes, excepté les trois premières, sont bordées de blanc des deux côtés depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur: les moyennes sont pareillement noires & bordées de blanc des deux côtés, mais dans toute leur longueur. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont blan-

ches, & ont leur tige & leur bord extérieur noir jusque vers leur bout, qui est tout blanc : les latérales sont noires, ayant la plus grande partie de leur côté intérieur blanche & bordée de noir ; il y a aussi un peu de blanc du côté extérieur vers le bout de chaque plume. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus longues de quatre pouces trois lignes que celle qui les suit immédiatement de chaque côté ; & les latérales vont toutes en diminuant un peu & par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est jaune : les paupières sont bleues. Au-dessus des narines & vers les coins de la bouche sont de longs poils noirs, tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

componunt duodecim rectrices : binæ intermediæ albæ, oris exterioribus & scapis circiter ad apicem usque nigris, apice verò penitus candido : laterales nigræ, sed in latere interiore maximâ parte albæ & margine nigrâ præditæ ; in latere quoque exteriori, versùs uniuscujusque rectricis apicem, aliquid albi admiscetur. Rectrices binæ intermediæ utrinque proximè frequentem quatuor pollicum & trium linearum longitudine superant ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Oculorum irides luteæ : palpebræ cœruleæ. Supra nares & circa oris angulos longi extant pili nigri, antrorsum versi, setarum instar rigidi. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Madagascaria*, unde in *museum Reaumurianum* à *D. Poivre* allata est.

37. LE GOBE-MOUCHE ROUGE DE LA CAROLINE.

Muscicapa rubra ; remigibus, rectricibusque subtus cinereo-rubescens ; remigibus superne interiùs fuscis. (*Mas*).

Muscicapa in toto corpore fusco-lutea. (*Fœmina*)

MUSCICAPA CAROLINENSIS RUBRA.

Fringilla rubra. *Klein. Avi. pag. 97. N°. 9.*

Preneur de mouches rouge. *Catesb. Tom. I. pag. 56 ; avec une assez bonne figure Pl. 56.*

Oiseau

Oiseau rouge d'Été. *Edwards. Glanur. pag. 60. Chap. XXIX; avec une figure passable (excepté le bec) Pl. 239.*

Les Anglois l'appellent SUMMER RED-BIRD. Catesb. Edwards.

Craffitie Passerem domesticum paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & novem circiter lineas explet, & ad extremos ungues quinque pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum; cauda duos pollices cum decem lineis; pes novem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem cum anticorum intimo longitudine convenit. Alæ complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Per univsum corpus pennis vestitur splendide rubris. Alarum remiges sunt subtus cinereo-rubescences, superne verò in latere exteriori rubræ, in interiori fuscæ; majorum tamen remigum apicibus obscurè rubris. Caudam componunt duodecim rectrices superne rubræ, infernè cinereo-rubescences. Oculi magni sunt & nigri. Rostrum

Tome II.

Il est un peu plus gros que le *Moineau franc*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ six pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue deux pouces dix lignes; son pied neuf lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un rouge éclatant. Les plumes des aîles sont en-dessous d'un cendré-rougeâtre, & en-dessus elles sont rouges du côté extérieur & brunes du côté intérieur: le bout des grandes plumes est d'un rouge obscur. La queue est composée de douze plumes rouges en-dessus & d'un cendré-rougeâtre en-dessous. Les yeux sont grands &

Iii

noirs. Le bec est jaunâtre. Les pieds & les ongles sont d'un brun sombre.

La *femelle* diffère du *mâle* par sa couleur, qui est un brun mêlé d'une légère teinture de jaune.

On les trouve en été à la *Caroline* & à la *Virginie*.

flavicans. Pedes, unguisque obscurè fuscī.

Fœmina à *mare* discrepat colore in toto corpore fusco, cum pauco luteo admixto.

Habitant æstate in *Carolina* & *Virginia*.





1. Gobe-mouche à collier du Sénégal.
2. Gobe-mouche hupé de la Martinique.

3. Gobe-mouche du Cap de Bonne Espérance.
4. Gobe-mouche à collier du Cap de Bonne Espérance.

5. Tyrann du Brésil.



1. Grand Gobe-mouche cendré de Madagascar.
2. Gobe-mouche à poitrine rousse du Sénégal.

3. Gobe-mouche à poitrine noire du Sénégal.
4. Grand Gobe-mouche noir hupé de Madagascar.



1. Gobe-mouche brun de la Martinique.
2. Tyrann de S^t. Domingue.


3. Grand Gobe-mouche noir de Cayenne.
4. Gobe-mouche de Cayenne.



1. Gobe-mouche de l'Isle de Bourbon.
2 Gobe-mouche hupé du Sénégal.

3. Tyran à queue fourchue.
4. Gobe-mouche cendré de Canada.

5. Gobe-mouche hupé de l'Isle de Bourbon.




Designé et Gravé par Martinet

1. Gobe-Mouche à longue Queue de Madagascar.

2. Gobe-Mouche à longue Queue blanche de Madagascar.

3. Gobe-Mouche varié à longue Queue de Madagascar.



ORDO VI.

ORDRE VI.

AVES

LES OISEAUX

Digitis quatuor, membranis destitutis, tribus scilicet anticis, uno postico, omnibus circiter usque ad exortum discretis: cruribus ad calcaneum usque plumosis: & rostro recto; mandibulâ utraq̃ue integrâ donatæ.

Qui ont quatre doigts, dénués de membranes, trois devant, un derriere, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon: le bec droit; & les deux mandibules entieres.

OMNIUM hujus Ordinis Avium digitus trium anticorum medius ab exortu ad primum usque articulum cum extimo arctè cohæret (*vide Vol. I. Tab. I. Fig. 3*).

TOUS les Oiseaux de cet Ordre ont celui du milieu des trois doigts antérieurs étroitement uni avec l'extérieur depuis son origine jusqu'à la premiere articulation (*voyez Tom. I. Pl. I. Fig. 3*).

Aliæ rostro donantur subquadrangulâri, paululùm superne convexo, infernè anguloso: aliæ verò rostro convexo, apice obtuso; apicis latitudine crassitiem superante. In duas sectiones illas dividimus: in prima continentur eæ quæ rostrum habent subquadrangulare, paululùm superne convexum,

Les uns ont le bec presque quadrangulaire, un peu convexe en-dessus, & anguleux en-dessous: & les autres ont le bec convexe, son bout étant un peu plus large qu'épais & obtus. Ils sont divisés en deux sections: dans la premiere je comprends ceux dont le bec est presque quadrangulaire, un peu convexe en-dessus, & anguleux

en-deffous (*voyez Tom. I. Pl. VI. Fig. 4*), comme le *Pique-bœuf*: & dans la seconde ceux dont le bec est convexe, son bout étant un peu plus large qu'épais & obtus (*voyez Tom. I. Pl. VI. Fig. 5*), comme l'*E-tourneau*.

infernè angulosum (*vide Vol. I. Tab. VI. Fig. 4*), ut *Buphagus*: & in secunda illæ quæ rostro donantur convexo, apice obtuso; apicis latitudine crassitiem superante (*vide Vol. I. Tab. VI. Fig. 5*), ut *Sturnus*.

SECTION I.

SECTIO I.

Ceux dont le bec est presque quadrangulaire, un peu convexe en-deffus & anguleux en-deffous.

Eæ quæ rostro donantur sub-quadrangulari, paululùm superne convexo, infernè anguloso.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui du *Pique-bœuf*.

UNICO genere, *Buphagi* scilicet, conflatur hæc sectio.

XXV.

XXV.

Le genre du Pique-bœuf.

Genus Buphagi.

Son caractère est d'avoir Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Hujus character est Digi quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Le bec droit, presque quadrangulaire, un peu convexe en-deffus, & anguleux en-deffous:

Rostrum rectum, subquadrangulare, paululùm superne convexum, infernè angulosum:

Les deux mandibules entieres.

Mandibula utraque integra:

** I. LE PIQUE-BŒUF.

Voyez Pl. XLII. Fig. 2.

Buphagus superne griseo - fuscus, infernè fordidè flavicans ;
 rectricibus acutis, griseo-fuscis, lateralibus interiùs rufis.
 BUPHAGUS.

Alaudam cristatam crassitie non multùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum novem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est ; cauda tres pollices & septem lineas ; pes decem lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus anticorum intimi longitudinem æquat. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & trium linearum ; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Caput, guttur, collum & dorsum vestiunt pennæ griseo - fuscae. Scapulares concolores. Quæ pectus, ventrem, latera, crura & uropygium cooperiunt, sicut & tectrices cau-

Il n'est guères plus gros que l'*Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long ; sa queue trois pouces sept lignes ; son pied dix lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'intérieur de ceux de devant. Il a quatorze pouces trois lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, le croupion & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un jaunâtre sale & rembruni. Les couvertures du dessus &

du dessous des aîles sont brunes. Les quatre premières grandes plumes de l'aîle & les deux moyennes les plus proches du corps sont d'un gris-brun ; toutes les autres sont d'un brun plus foncé. La queue est composée de douze plumes fort pointues : les deux du milieu sont d'un gris-brun : toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & rouffes du côté intérieur. Les deux du milieu sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant un peu & par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est jaune à son origine, & rouge vers le bout. (Quelques Oiseaux de cette espèce ont le bec brun ; c'est peut-être ce qui distingue le mâle d'avec la femelle). Les pieds & les ongles sont bruns.

Cet Oiseau se pose sur le dos des *Bœufs*, & à coups de bec réitérés en fait sortir le sang, non pas pour s'en nourrir, mais pour tirer de dessous l'épiderme des vers, qui y vivent jusqu'au moment de leur métamorphose, & desquels il est très-friand : c'est ce qui lui a fait donner le nom de *Pique-bœuf*. On le trouve au *Sénégal*,

da superiores & inferiores, sunt sordide & obscure flavicantes. Teatrices alarum superiores & inferiores fusca. Primores quatuor remiges majores & minores binæ corpori viciniore griseofusca ; reliquæ omnes fusco saturatiore tinguntur. Caudam componunt duodecim rectrices acutissimæ, quarum binæ intermediæ griseofusca : laterales omnes in latere exteriori concolores, in interiori rufæ. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum in exortu flavum, versùs apicem rubrum. (Hujus speciei Aves quædam rostro donantur fusco ; hæc est forsan maris & fœminæ differentia). Pedes, unguisque fusci.

Dorso Boùm insidet hæc Avis, & iteratis rostri ictibus sanguinem mittit, non ut sanguine pro cibo utatur, sed ad extrahendos vermes, sub epidermate ad ipsorum metamorphosin usque latitantes, quibus maximè delectatur hæc Avis ; unde Buphagi nomen. Habitat in Senegalesi regione, unde in

SECTIO II.

SECTION II.

Eæ quæ rostro donantur convexo, apice obtuso; apicis latitudine crassitiem superante.

Ceux dont le bec est convexe, son bout étant un peu plus large qu'épais & obtus.

IN illa sectione unicum continetur genus, *Sturni* scilicet.

LE genre de l'*Etourneau* est le seul qui soit compris dans cette section.

XXVI.

XXVI.

Genus Sturni.

Le genre de l'Etourneau.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

Rostrum rectum, convexum, apice obtusum; apicis latitudine crassitiem superante:

Le bec droit, convexe; son bout un peu plus large qu'épais & obtus:

Mandibula utraque integra. Les deux mandibules entières.

** I. L'ETOURNEAU.

Sturnus nigricans, superne & in pectore purpureo & viridi, infernè viridi tantum colore varians; apicibus pennarum in corpore superiore rufescentibus, in inferiore albidis; rectricibus saturatè cinereo-fuscis, oris exterioribus rufescentibus . . . STURNUS.

Sturnus rostro flavescente , corpore nigro punctis albis. *Faun. Suec.* Linn. N°. 183.

Sturnus. *Gesn. Avi.* pag. 746. *hujus icon minimè accurata* pag. 747.

Gesn. icon. Avi. pag. 34 , *in qua eadem icon.*

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 631. *icones non satis accuratæ , maris* pag. 632 , *fæminæ* pag. 634 , & *junioris* pag. 635.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 351.

Jonst. Avi. pag. 76. *hujus duæ icones , una ab Olina mutuata , & altera ab Aldrovando Tab. 40 : & insuper eâdem Tab. junioris icon ab Aldrovando mutuata , sub titulo , Sturnus pullus.*

Charlet. Exer. pag. 90. N°. III.

Charlet. Onomazt. pag. 84. N°. III.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 295.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 74. *sp.* 1.

Moehr. Avi. Gen. 9.

Sturnus Aldrovandi. *Willugh. Ornith.* pag. 144. *hujus icon ab Olina mutuata Tab. XXXVII.*

Sturnus Aldrovandi & aliorum. *Raj. Syn. Avi.* pag. 67. N°. A. 1.

Sturnus Schwenckfeldii. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol.* pag. 421.

Sturnus vulgaris , rostro nigricante. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XV.* *sp.* 1.

Sturnus pratorum , vulgaris. *Klein. Avi.* pag. 64. N°. 1.

Sturnus pullus Jonstoni. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XV.* *sp.* 3. (*Junior*).

Sturnellus Nonnullis. *Klein.*

Storno. Olina. pag. 18 , *in qua hujus icon accurata.*

Estourneau. Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 321 , *dans laquelle il y a une figure passable.*

Estourneau ; Sanfonnet. Bel. Portr. d'Ois. pag. 81 a , *dans laquelle est la même figure.*

Etourneau. Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 159.

Alb. Tom. I. pag. 34 ; *avec une figure mal coloriée Pl. 40.*

Les Hébreux l'appellent SARSIR. Aldrov.

Les Arabes , ALZARAZIR. Gesn. Aldrov.

Les Grecs , Ψάρ ; Ψάρος. Bel. Aldrov. Schwenck. Jonst. Raj. Charlet. Ψήρ ;

Ψάρ. Aldrov. Βύτθα ; Βύτθος. Aldrov. Schwenck. Jonst. Charlet. Ψόλμις.

Schwenck. Charlet. Γολμύς. Aldrov. Jonst.

Les Espagnols , ESTORNINO. Aldrov.

Les Catalans , STORNELL. Barr.

Les Portugais , STURNINO. Gesn. STORNINO. Aldrov.

Les Italiens , STORNO. Bel. Gesn. Aldrov. Olina. Klein.

Les Vénitiens , STORNELLO. Bel. Gesn. Aldrov. Klein. STURNELLO. Bel. Gesn.

Les Allemands, STAAR. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. RINDER-STAAER. Gesn. Aldrov. Schwenck. STAHR. Rzac. STAER. Gesn. STOER ; STARN. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands aux environs de Francfort & de Strasbourg, SPREHE. *Gesn. Aldrov. SPRECHE. Schwenck.*

Les Flamands, SPREUWE. *Gesn. SPRAEUWE. Aldrov.*

Les Brabançons, SPRUE. *Gesn.*

Les Illyriens, SSPACZIEK ; SPATZEK. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, SSPACZIEK ; SPATZEK. *Gesn. Aldrov. SZPAK ; SKORZEK. Rzac.*

Les Suédois, STARE. *Linn.*

Les Anglois, STARE. *Gesn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Klein. STARLL. Gesn. Aldrov. Klein. STARLING. Gesn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.*

Merulæ paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quindecim lineas longum est; cauda duos pollices cum sex lineis; pes quatuordecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas: laterales multò sunt breviores; posticus autem lateralium longitudinem non nihil superat. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ultra tres quartas longitudinis caudæ partes

Il est un peu moins gros que le *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; son pied quatorze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes: les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a quatorze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col & le dos sont couverts de plumes d'un

noirâtre changeant en pourpre & en verd foncé, mais fort brillant, & terminées de rouffâtre. Celles qui couvrent les joues, la gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont de la même couleur, mais elles sont terminées de blanchâtre. Les plumes de la tête & du col sont longues & étroites. Le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue & les petites du dessus des ailes sont d'un noir changeant en verd foncé, fort brillant, chaque plume étant terminée de rouffâtre. Les grandes couvertures du dessus des ailes les plus proches du corps sont de la même couleur du côté extérieur, & sont de plus bordées de rouffâtre, mais leur côté intérieur est brun : les plus éloignées du corps sont brunes, & ont leur bord extérieur rouffâtre. Les plumes qui couvrent le ventre & les côtés, sont pareillement d'un noir changeant en verd foncé, mais brillant, & terminées de blanchâtre : il y a de plus un peu de bleu-violet sur les plumes des côtés. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un noirâtre mêlé d'une légère teinte de verd, & ont une assez large bordure de

extenduntur. Partes capitis & colli superiores & dorsum vestiunt pennæ nigricantes, purpureo & viridi saturato, sed splendidissimo, colore variantes, apicibus pennarum rufescentibus. Quæ genas, guttur, partem colli inferiorem & pectus cooperiunt, iisdem coloribus perlustrantur, sed apicibus albidis præditæ sunt. Pennæ caput & collum vestientes longiores sunt & strictiores. Quæ uropygium obtegunt, scapulares, caudam superne cooperientes & teatrices alarum superiores minores sunt nigrae, viridi saturato, sed splendenti, colore variantes, apicibus pennarum rufescentibus. Alarum teatrices superiores majores corpori finitimæ in latere exteriori concolores, marginibus insuper rufescentibus, in latere verò interiori fusca: majores autem à corpore remotiores fusca, oris exterioribus rufescentibus præditæ. Venter & latera pennis vestiuntur similiter nigris, viridi saturato, sed splendenti, colore variantibus, & apicibus albidis præditis : pennis latera cooperientibus aliquid insuper cœruleo-

violacei admixtum est. Tectrices caudæ inferiores nigricant cum aliqua viridis mixtura, & latis marginibus donantur albo-rufescentibus. Crura vestiunt pennæ cinereo-fuscae, dilutè rufescente terminatae. Quæ alas subtus obtegunt, eodem imbuuntur colore, sed marginibus donantur in tota pennæ circumferentia dilutè rufescentibus. Ala novemdecim conflatur remigibus, quarum prima brevissima est, secunda verò omnium longissima : decem primores ex cinereo fuscescunt, attamen versùs cujuslibet remigis margines exteriores, sicut & in tota apicis circumferentia, obscuriores fiunt & ferè nigricant ; omnes autem remiges istæ (prior tantum exceptâ) in latere exteriori margine donantur rufescente : novem reliquæ prioribus istis concolores, margine tamen rufescente uniuscujusque remigis apicem ambiente ; quælibet insuper in latere exteriori, versùs margines, taniâ longitudinali, saturatè viridi & splendenti prædita est. Caudam componunt duodecim rectrices saturatissimè cine-

blanc - rouffâtre. Les jambes sont couvertes de plumes d'un cendré - brun , terminées de rouffâtre clair. Les couvertures du dessous des aîles sont de la même couleur, mais le rouffâtre s'étend tout autour de chaque plume. L'aîle est composée de dix-neuf plumes, dont la première est extrêmement courte, & la seconde est la plus longue de toutes : les dix premières sont d'un cendré-brun, cette couleur étant plus obscure & presque noirâtre vers le bord extérieur de chaque plume, ainsi que tout autour de son bout ; chacune de ces plumes (excepté la première) est de plus bordée extérieurement de rouffâtre : les neuf autres sont de la même couleur que ces premières, mais la bordure rouffâtre s'étend tout autour du bout de chaque plume, & chacune a sur son côté extérieur, vers le bord, une bande longitudinale, d'un verd foncé & brillant. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-brun très-foncé, bordées de rouffâtre extérieurement & par le bout. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Le bec est jaunâtre à son origine & brun vers le bout. Les pieds sont d'une couleur

de chair; & les ongles noirâtres.

reofuscæ, oris exterioribus & circa apicem rufescentibus. Oculorum irides avelanæ. Rostrum in exortu flavicans, versùs apicem fuscum. Pedes colore carneo tinguntur; ungues verò nigricant.

La femelle diffère du mâle en ce que la couleur de son dos n'est pas si brillante, & que son bec est tout brun.

Les Etourneaux volent par troupes, & se nourrissent de *Vermisseaux*, de *Scarabés* & autres *Insectes*. Du cabinet de *M. de Reaumur*.

Fœmina à mare discrepat dorsi colore non ita splendenti, & rostro in tota longitudine fusco.

Sturni gregatim volant; *Vermiculis*, *Scarabæis* aliisque *Insectis* victitant. Ex museo *Realmuriano*.

A. L'ETOURNEAU BLANC.

Sturnus albus.

Sturnus albus. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 636*, in qua hujus icon pessima. *Willugh. Ornith. pag. 145*.

Sturnus totus albus. *Jonst. Avi. pag. 76*.

Sturnus candidus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 353*.

Les Allemands l'appellent GANTZ WEISSER STAAR. *Schwenck*.

Il diffère du précédent par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. Son bec est d'un jaune tirant sur le rouge. Ses pieds sont d'une couleur de chair pâle.

A præcedente discrepat colore in universo corpore albo. Rostrum ex luteo rubescit. Pedes dilutè carnei sunt.

B. L'ETOURNEAU BLANC ET NOIR.

Sturnus leucomelas.

Sturnus capite atro, reliquo corpore albo. *Willugh. Ornith. pag. 145*.

Sturnus, ut Pica, varius. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 353*.

Les Allemands l'appellent ELSTER STAAR. *Schwenck*.

Il est de la grandeur de l'Etourneau ordinaire; mais il en

Magnitudine *Sturnum vulgarem* æquat; ab illo autem

colore differt. Vertex capitis, collum, pennæ remiges, sicut & rectrices, sunt nigræ; reliquum corpus candidum. Rostrum ab exortu ad medietatem usque nigrum, in reliqua longitudine flavicans.

diffère par sa couleur. Le sommet de la tête, le col, les plumes des aîles & celles de la queue sont noires; tout le reste du corps est blanc. Le bec est noir depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur, & le reste est jaunâtre.

C. L'ETOURNEAU A TESTE BLANCHE.

Sturnus leucocephalus.

Sturnus capite albo. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 637, in qua hujus icon minimè accurata.

Sturnus capite albo Jonstoni. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XV. sp. 4.

Sturnus alter. Jonst. Avi. pag. 76. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 40, sub titulo, Sturnus capite albo.

Formâ & magnitudine præcedentes æmulatur; sed ab illis colore dissimilis est. Caput & collum alba sunt, nisi quod supra oculos, prope rostrum, maculæ binæ contiguæ sint nigræ. Pectus, venter, latera, crura & rectrices alarum, sicut & pennæ caudam subtus tegentes, pariter candidæ, maculis subcœruleis variæ. Remiges & rectrices ut in *Sturno vulgari* se habent, exceptis rectricibus binis extimis albis. Rostrum album. Pedes lutei; ungues verò nigri.

Il ressemble aux précédens par sa forme & sa grandeur; mais il en diffère par sa couleur. La tête & le col sont blancs, excepté qu'il y a deux taches noires, contiguës, placées au-dessus des yeux & assez près du bec. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures des aîles & celles du dessous de la queue sont d'un blanc varié de taches bleuâtres. Les plumes des aîles & celles de la queue sont de la même couleur que celles de l'*Etourneau ordinaire*, excepté cependant les deux plus extérieures des plumes de la queue,

qui sont blanches. Le bec est de cette dernière couleur. Les pieds sont jaunes; & les ongles noirs.

D. L'ÉTOURNEAU GRIS.

Sturnus cinereus.

Sturnus cinereus. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 638. hujus duæ icones minùs accuratæ pag. 638 & 639.

Charlet. Exer. pag. 90. N°. III.

Sturnus cinereus Jonstoni. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XV. sp. 2.

Sturnus tertius. Jonst. Avi. pag. 76. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 40, sub titulo, Sturnus cinereus.

Sa forme & sa grandeur sont les mêmes que celles des précédens ; mais sa couleur est différente. Tout le dessus du corps est d'un cendré-roussâtre ou plutôt jaunâtre ; & le dessous tire sur le jaune. La poitrine est variée de quelques petits points. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs.

A præcedentibus formâ & magnitudine non absimilis, sed colore discrepans. Totum corpus superius ex cinereo rufescit vel potius lutescit ; corpus verò inferius ad luteum vergit. Quædam sunt in pectore punctula. Rostrum, pedes, unguesque nigro colore tinguntur.

** 2. L'ÉTOURNEAU DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Voyez Pl. XLI. Fig. 3.

Sturnus superne nigricans, infernè fordidè albus ; capite & collo splendidè nigris, ad violaceum vergentibus ; maculâ in utraque gena rotundâ, albo-rufescente ; scapularium penarum marginibus exterioribus albis ; rectricibus nigricantibus . . . STURNUS CAPITIS BONÆ SPEI.

Il est à peu près de la grosseur de notre Étourneau. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces six lignes. Son bec de-

Sturnum nostratem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices & sex lineas. Rostrum ab

ipſius apice ad oris angulos ſexdecim lineas longum eſt; cauda duos pollices cum octo lineis; pes quindecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem menſurâ præditus eſt : laterales multò ſunt breviores; poſticus autem laterales nonnihil longitudine ſuperat. Alis expanſis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & ſex linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, guttur & collum ſunt ſplendidè nigra & paululùm ad violaceum vergentia. In utraque gena, infra oculos, majuscula eſt macula rotunda, albo - ruſcens, ex qua oritur exigua tænia concolor, verſus occipitium uſque protenſa. In utroque capitis latere, narum inter & oculum, exigua quoque adeſt macula albo - ruſcens. Pennæ ſummum caput veſtientes longiores ſunt & ſtrictiores. Dorſum & uropygium nigricant. Pennæ ſcapulares eodem tinguntur colore, ſed marginibus donantur exterioribus albis. Pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores

puis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a ſeize lignes de long; ſa queue deux pouces huit lignes; ſon pied quinze lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a auſſi quinze lignes : les latéraux ſont beaucoup plus courts; & celui de derrière eſt un peu plus long que ces derniers. Il a treize pouces ſix lignes du vol; & ſes aîles, lorsqu'elles ſont pliées, s'étendent environ juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge & le col ſont d'un noir brillant & tirant un peu ſur le violet. Sur chacune des joues & au - deſſous des yeux eſt une grande tache ronde, d'un blanc-rouſſâtre, de laquelle part une petite bande de la même couleur, qui s'étend juſque vers l'occiput. Il y a auſſi de chaque côté de la tête, entre la narine & l'œil, une petite tache d'un blanc-rouſſâtre. Les plumes du ſommet de la tête ſont longues & étroites. Le dos & le croupion ſont noirâtres. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur, & bordées extérieurement de blanc. La poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un blanc ſale. Les couvertures du deſſus de la queue, cel-

les du dessous des aîles & les petites du dessus sont blanches. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est de la même couleur. Les grandes couvertures du dessus de l'aîle sont noirâtres. Les plumes de l'aîle sont de la même couleur : la première est extrêmement courte ; la troisième & la quatrième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes noirâtres, toutes à peu près d'égale longueur. Le bec est jaunâtre à son origine & rougeâtre vers son bout. Les pieds sont jaunes ; & les ongles gris. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où il a été apporté à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

fordidè albert. Pennæ caudam superne tegentes, tectrices alarum inferiores & minores superiores candidæ. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, concolores. Tectrices alarum superiores majores nigricant. Remiges eodem imbuuntur colore : prior brevissima ; tertia & quarta omnium longissima. Cauda duodecim constat rectricibus nigricantibus, omnibus longitudine circiter æqualibus. Rostrum in exortu flavicat, versùs apicem rubescit. Pedes lutei sunt ; ungues verò grisei. Habitat in *Capite Bonæ Spei*, unde in *musæum D. Aubry* allatus est.

3. L'ETOURNEAU DE LA NOUVELLE ESPAGNE.

Sturnus in toto corpore niger ; capite fusco
STURNUS NOVÆ HISPANIÆ.

Tolocatzanatl, seu Sturnus Junceti. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 22. cap. XXXVI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 168. N°. 23.

Les Mexiquains l'appellent TOLOCATZANATL. Fern.

Il est un peu plus petit que notre *Etourneau* ; mais il lui ressemble par sa figure. Sa tête est brune. Tout le reste de son corps est couvert de plumes noires. Les plumes des aîles & celles

Sturno nostrati nonnihil magnitudine cedit ; cum ipso verò formâ convenit. Caput cooperiunt pennæ fuscae. In toto reliquo corpore pennis vestitur nigris. Remiges & rectrices

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre VI.* 449
 rectrices concolores. Habitat in *Nova Hispania*. de la queue font de la même couleur. On le trouve à la *Nouvelle Espagne*.

** 4. L'ETOURNEAU DE LA LOUISIANE.

Voyez Pl. XLII. Fig. 1.

Sturnus superne fusco & griseo-rufescente varius, inferne flavus; taniâ triplici in capite albâ; maculâ in collo inferiore griseo & nigricante variâ; rectricibus griseo-rufescentibus; taniis transversis, fuscis variis; quatuor utrinque extimis interiùs candidis. . . . STURNUS LUDOVICIANUS.

Crassitie Coturnicem circiter æquat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos sexdecim lineas longum est; cauda duos pollices cum novem lineis; pes octodecim lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus laterales longitudine nonnihil antecellit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quindecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Par-

Il est à peu près de la grosseur d'une *Caille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de seize lignes; sa queue de deux pouces neuf lignes; son pied de dix-huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de quatorze lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Il a quinze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le crou-

pion & les couvertures du dessus des aîles sont joliment variées de brun & de gris-roussâtre. Il y a par-dessus la tête trois bandes blanches, qui commencent à l'origine du bec & vont se terminer derrière la tête : deux de ces bandes passent par-dessus les yeux, sçavoir une de chaque côté, & la troisième sur le sommet de la tête. Les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine & le ventre sont d'un beau jaune. A la partie inférieure du col est une grande tache variée de noirâtre & de gris; c'est-à-dire que chaque plume est noirâtre & terminée de gris. Les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale, marqué de quelques taches brunes. Les couvertures du dessous de l'aîle sont d'un gris-blanc. Le bord de l'aîle, depuis le pli qui répond à celui du poignet jusqu'à l'aîle bâtarde, est jaune. Les plumes de l'aîle sont grises en-dessous, & en-dessus elles sont d'un gris-roussâtre, varié de bandes transversales, brunes du côté extérieur, & leur côté intérieur est d'un gris-brun. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont d'un gris-roussâtre, varié de bandes transversales, brunes : les quatre plus extérieu-

tes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, alarumque superiores rectrices fusco & griseo-rufescente sunt eleganter variegatae. Tres sunt in capite tæniæ albæ, ab exortu rostri ortæ, & ad partem capitis posteriorem productæ, quarum binæ supra oculos, utrinque scilicet una, & tertia per summum caput protenduntur. Genæ, guttur, colli pars inferior, pectus & venter eleganter flavent. Collum inferius majusculâ insignitur maculâ griseo & nigricante variâ, pennis scilicet nigricantibus, griseo terminatis, conflata. Latera, crura & rectrices caudæ inferiores sordidè al bent, & maculis quibusdam notantur fuscis. Pennæ alas subtus cooperientes sunt cinereo-albæ. Alarum margines, ab articulo carpo humano respondente ad alam notham usque, flavæ. Remiges infernè griseæ, superne verò in latere exteriori griseo-rufescentes, tæniis transversis, fuscis variæ, in latere autem interiori griseo-fuscæ. Duodecim rectricibus cauda constat : quatuor intermediæ griseo-rufescentes, tæniis transversis, fuscis variæ ;

quatuor utrinque extimæ in latere exteriori concolores, in interiori candidæ. Rostrum candicat, apice nonnihil ad fuscum inclinante. Pedes, unguisque grisei sunt. Habitat in *Ludovicia*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Comite de la Galissonniere*.

res de chaque côté sont de la même couleur du côté extérieur, & blanches du côté intérieur. Le bec est blanchâtre, & son bout est un peu rembruni. Les pieds & les ongles sont gris. On le trouve à *la Louisiane*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. le Comte de la Galissonniere*.






Dessiné et Gravé par Martinet
 1. Gobe-mouche hupé du Cap de bonne Espérance. 2. Gobe-mouche blanc hupé du cap de bonne Espérance. 3. Etourneau du Cap de bonne Espérance.



Martinet Del. et Sculp.

1. Etourneau de la Louisiane.

2. Pique-boeuf.



ORDO VII. ORDRE VII.

A V E S

LES OISEAUX

Digitis quatuor, membranis destitutis, tribus scilicet anticis, uno postico, omnibus circiter usque ad exortum discretis: cruribus ad calcaneum usque plumosis: & rostro gracili, parùm arcuato donatæ.

Qui ont quatre doigts, dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon: & le bec menu, & un peu courbé en arc.

OMNIUM hujus Ordinis Avium digitus trium anticorum medius ab exortu ad primum usque articulum cum extimo arctè cohæret (*vide Vol. I. Tab. I. Fig. 3*).

TOUS les Oiseaux de cet Ordre ont celui du milieu des trois doigts antérieurs étroitement uni avec l'extérieur depuis son origine jusqu'à la première articulation (*voyez Tom. I. Pl. I. Fig. 3*).

Aliæ capite donantur corollâ longitudinali, plumosâ, in duplici serie parallela divisâ, & plicatili ornato: aliæ capite simplici præditæ sunt. In duas sectiones dividuntur: prima continet eas quæ caput habent corollâ longitudinali, plumosâ, in duplici serie parallela divisâ, & plicatili ornatum (*vide*

Les uns ont la tête ornée d'une hupe longitudinale, composée d'un double rang de plumes, & que l'Oiseau peut plier à volonté: & les autres ont la tête simple. Je les divise en deux sections: dans la première sont ceux qui ont la tête ornée d'une hupe longitudinale, composée d'un double rang de plumes, & que l'Oiseau peut plier

à volonté (*voyez Tom. I. Pl. VI. Fig. 6*), comme la *Hupe* : & dans la seconde ceux qui ont la tête simple (*voyez Tom. I. Pl. VI. Fig. 7*), comme le *Promérops*.

Vol. I. Tab. VI. Fig. 6), ut *Upupa* : secunda eas quæ capite simplici donantur (*vide Vol. I. Tab. VI. Fig. 7*), ut *Promerops*.

SECTION I.

Ceux dont la tête est ornée d'une hupe longitudinale, composée d'un double rang de plumes, & que l'Oiseau peut plier à volonté.

IL n'y a dans cette section qu'un seul genre, sçavoir celui de la *Hupe*.

XXVII.

Le genre de la Hupe.

Son caractère est d'avoir Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine :

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec menu, & un peu courbé en arc :

La tête ornée d'une hupe longitudinale, composée d'un double rang de plumes, & que l'Oiseau peut plier à volonté.

SECTIO I.

Eæ quæ capite donantur corollâ longitudinali, plumosâ, in duplici serie parallela divisâ & plicatili ornato.

U^{PUPÆ} genere solo constituitur hæc sectio.

XXVII.

Genus Upupæ.

Hujus character est Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti :

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum gracile, parum arcuatum :

Caput ornatum corollâ longitudinali, plumosâ, in duplici serie parallela divisâ, & plicatili.

** I. LA HUPE OU PUPUT.

Voyez Pl. XLIII. Fig. 1.

Upupa superne fusco-nigricante & fordidè albo-rufescente varia, infernè albo-rufescens; dorso supremo griseo; pectore griseo-vinaceo; cristâ rufâ, apicibus pennarum nigris; rectricibus nigricantibus, taniâ transversâ, albâ in medio præditis UPUPA.

Upupa varia, cristâ rufâ, in summo nigrâ. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXI. sp. 1.

Upupa. Gesn. Avi. pag. 775. hujus icon non satis accurata pag. 776.

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 702. hujus icon non satis accurata pag. 704.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 368.

Jonst. Avi. pag. 85. hujus icon non satis accurata Tab. 27; & insuper altera icon non satis accurata Tab. 42.

Raj. Syn. Avi. pag. 48. N°. A. 6.

Charlet. Exer. pag. 98. N°. XV. hujus icon non satis accurata pag. 99.

Charlet. Onomazt. pag. 92. N°. XV. eadem icon pag. 93.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 297.

Frisch. hujus icon accurata Tab. 43.

Faun. Suec. Linn. N°. 85.

Moehr. Avi. Gen. 22.

Upupa simpliciter. Klein. Avi. pag. 110. N°. 14.

Upupa; Epops. Gesn. icon. Avi. pag. 31, in qua hujus icon non satis accurata.

Upupa Aldrovandi & Gesneri. Willugh. Ornith. pag. 100. hujus icon à Jonstono mutuata Tab. XXIV.

Upupa Plinii; Gallus lutosus; Gallinaceus stercorarius. Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 427.

Upupa, Hoope, or Hoopoe. Borl. Nat. Hist. of Cornwall. pag. 246. hujus icon minimè accurata Tab. XXIV. Fig. XIV.

Epops. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 45. sp. 1.

Bubbola. Olin. pag. 36, in qua hujus icon minimè accurata.

Huppe. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 293, dans laquelle il y a une très-mauvaise figure.

Hupe; Putput; Lupoge. Bel. Portr. d'Ois. pag. 72 a, dans laquelle est la même figure.

Hupe. Alb. Tom. II. pag. 28; avec une figure du mâle mal coloriée Pl. 42, & une figure passable de la femelle Pl. 43.

Les Hébreux l'appellent DUKIPHAT. *Aldrov.*

Les Egyptiens, CUCUFA ou CUCUPHA. *Aldrov.*

Les Grecs, ΕΨΟΨ. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Willugh. Raj. Charlet.*

Rzac. & quelques-uns, Σΐντη; Κυκίφα; Ἀλεκτρίονα γέλασος. *Jonst.*
 Ἀλεκτρυόν γέλασος. *Schwenck.*

Les Grecs modernes, Ἀγριοκόρος. *Aldrov. Ἀγριοκόκος. Schwenck. Jonst.*

Les Grecs de Candie, Ἀγριοπετινων. *Bel. Ἀγριοπετινον. Aldrov.*

Les Turcs, IBIK. *Gesn. Aldrov.*

Les Espagnols, ABUBILLA. *Gesn. Aldrov.*

Les Catalans, PAPUT; POPUT. *Barr.*

Les Portugais, POPA. *Gesn. Aldrov.*

Les Italiens, BUBBOLA. *Olina. BUBA; GALLETO DE MAGIO. Bel. Gesn.*
Aldrov. GALLETO DI MARZO. Aldrov.

Les Italiens aux environs de Belinzone, PUPULLA. *Gesn. Aldrov. PUPPULA.*
Gesn. PUBULA. Bel.

Les Vicentins, UPERGA. *Aldrov. UPEGA. Bel. Gesn.*

Les Vénitiens, GALLO DEL PARADISO. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Siciliens, CRISTELLA. *Gesn. Aldrov.*

Les Savoyards, ETPIE. *Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, WIDE-HOPF; WIDE-HOPFF. *Rzac. WIDE-HOPFFE;*
WID-HOPFF; KAT-HAN. Gesn. Aldrov. KAT-HAAN. Gesn. KOT-HAN;
WIEDE-HOPFFE. Schwenck. WIED-HOPF. Frisch.

Les Hauts Allemands, & aux environs de Cologne, WIDE-HUPPE. *Willugh.*

Les Bas Saxons aux environs de Rostock, WEDE-HOPPE. *Gesn. Aldrov.*

Les Cassubiens, HUPKA. *Rzac.*

Les Flamands, HUPETUP. *Gesn. Aldrov.*

Les Brabançons, HUHERON. *Gesn. Aldrov.*

Les Illyriens, DEDEK. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, DUDEK. *Gesn. Aldrov. Rzac.*

Les Suédois, HAER-FOGEL. *Linn.*

Les Habitans de la province de Skone, POPP. *Linn.*

Les Anglois, HOOP. *Willugh. Raj. Alb. HOOPE. Borl. HOOROE. Willugh.*
Raj. Alb. Borl. HOOPPOOP. Charlet.

On l'appelle aux environs de Montpellier, LUPEGE. *Gesn. Aldrov.*

Elle est à peu près de la longueur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bou-

Craffitie Merulam circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice

apice ad oris angulos usque duos pollices & totidem lineas longum ; cauda tres pollices cum novem lineis ; pes novem cum semi lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue eadem mensurâ donatus : laterales paulò sunt breviores ; & posticus cum anticorum medio longitudine convenit ; ungue enim longissimo & subrecto præditus est. Alis expansis , extremitates majorum remigum sexdecim pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ paulò ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. In capite gerit elegantissimam corollam longitudinalem , duos pollices & totidem lineas altam , duplici plumarum serie conflata , ab exortu mandibulæ superioris infra occipitium usque protensam , & per summum caput ductam ; quam corollam ad libitum explicat aut componit Avis. Plumæ autem , quibus corolla constat , sunt rufæ , apicibus nigris præditæ. Reliquum caput , guttur , collum & pectus griseo-vinacea. Pars dorsi suprema , alarumque tectrices superiores minimæ griseæ. Dorsum in-

Tome II.

che a deux pouces deux lignes de long ; sa queue trois pouces neuf lignes ; son pied neuf lignes & demie ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , a aussi neuf lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est de la même longueur que celui du milieu de ceux de devant ; car l'ongle en est très-long & presque droit. Elle a seize pouces six lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. Sa tête est ornée d'une très-belle hupe longitudinale , haute de deux pouces deux lignes , composée d'un double rang de plumes , qui s'étend depuis l'origine du demi - bec supérieur jusqu'au-dessous de l'occiput , en passant sur le sommet de la tête ; & que l'Oiseau peut étendre ou plier à volonté. Ces plumes sont rouffes & terminées de noir. Le reste de la tête , la gorge , le col & la poitrine sont d'un gris-vineux. La partie supérieure du dos & les plus petites couvertures du dessus des aîles sont grises. La partie inférieure du dos , les plumes scapulaires , les moyennes & les grandes couvertures du dessus des aîles sont variées de

M m m

larges bandes transversales , alternatiyement d'un brun - noirâtre & d'un blanc sale & roussâtre. Le croupion est blanc. Les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres. Le ventre , les côtés , les jambes , les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un blanc tirant un peu sur le roussâtre. L'aîle est composée de dix-neuf plumes , dont la première est très-courte , & la cinquième est la plus longue de toutes. Les dix-sept premières sont noirâtres : la seconde est marquée d'une grande tache blanche , placée sur le côté intérieur vers les deux tiers de sa longueur : les suivantes , sçavoir depuis la troisième jusqu'à la sixième inclusivement , ont vers les deux tiers de leur longueur une large bande transversale , blanche : la septième est marquée d'une grande tache de la même couleur sur le côté intérieur vers le bout : les trois suivantes , sçavoir depuis la huitième jusqu'à la dixième inclusivement , sont marquées de même , & dans le même endroit , d'une tache blanche , mais beaucoup plus petite : la onzième & la douzième sont variées de quatre bandes transversales , blanches , qui n'occupent que le

finum , pennæ scapulares ; teñtrices alarum superiores majores & mediæ latis variegantur taniis transversis , alternatim fusco-nigricantibus & sordidè albo-rufescentibus. Uropygium albet. Teñtrices caudæ superiores nigricant. Venter , latera , crura , teñtrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus tegentes ex albo nonnihil ad rufescentem inclinant colorem. Alarum componunt novemdecim remiges , quarum prima brevissima , quinta verò omnium longissima. Septemdecim primores sunt nigricantes : secunda majusculâ insignitur maculâ candidâ , in latere interiore , versùs duas tertias longitudinis partes , collocatâ : sequentes , à tertia scilicet ad sextam usque inclusivè , versùs duas tertias longitudinis partes latâ notantur taniâ transversâ , albâ : septimam variegat majuscula macula quoque candida , in latere interiore versùs apicem sita : tres sequentes , ab octava scilicet ad decimam usque inclusivè , eodem modo & in eodem loco maculâ insigniuntur candidâ , sed multò minore : undecimam , duodecimamque variegant qua-

tuor tæniæ transversæ, albæ, cujuslibet remigis latus interius tantum occupantes : tredecima similiter variegatur quatuor tæniis transversis, albis, sed quarum binæ exortui remigis viciniore ad utrumque latus protenduntur, dum binæ apici remigis finitimæ latus tantum interius occupant : decima-quarta quoque notatur quatuor tæniis transversis, albis, ad utrumque remigis latus protensis, exceptâ tamen tæniâ apici remigis viciniore, latus tantum interius occupante : tres sequentes, à decima-quinta scilicet ad decimam-septimam usque inclusivè, quatuor variegantur tæniis transversis, ex albo ad rufescentem colorem inclinantibus, & insuper margine albo-rufescente in apice donantur : decima-octava tandem & decima-nona sunt fuscæ, marginibus albo-rufescentibus præditæ ; tæniâ quoque notantur longitudinali, albo-rufescente, in latere interiore sitâ, & secundum scapi longitudinem protensâ. Caudam componunt decem rectrices nigricantes, quarum quælibet latâ notatur tæniâ transversâ, albâ, circa mediam ipsarum lon-

côté intérieur de chaque plume : la treizième est pareillement variée de quatre bandes transversales, blanches, mais dont les deux plus proches de l'origine de la plume s'étendent sur ses deux côtés, & les deux plus proches du bout ne s'étendent que sur le côté intérieur seulement : la quatorzième a aussi quatre bandes transversales, blanches, qui s'étendent sur les deux côtés de la plume, excepté celle qui est la plus proche du bout, qui n'occupe que le côté intérieur : les trois suivantes, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la dix-septième inclusivement, sont variées de quatre bandes transversales, d'un blanc tirant sur le rouffâtre, & leur bout est aussi bordé de blanc-rouffâtre : enfin la dix-huitième & la dix-neuvième sont brunes, & bordées d'un blanc-rouffâtre ; elles ont aussi une bande longitudinale, de la même couleur, placée sur leur côté intérieur, & qui s'étend selon la longueur de leur tige. La queue est composée de dix plumes noirâtres, qui ont chacune une large bande transversale, blanche, placée vers le milieu de leur longueur : cette bande est cependant d'autant plus éloignée de l'origine de la plume, que cette plume est

plus extérieure; de façon que, lorsque la queue est dépliée, ces bandes forment ensemble un arc de cercle ou un croissant, dont la convexité est tournée vers le corps, & la concavité vers le bout de la queue. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Le bec est noirâtre, excepté sa base, qui est d'une couleur de chair pâle. Les pieds & les ongles sont d'un brun-noirâtre. Elle se nourrit d'*Insectes*. Elle est commune en *Europe*. Du cabinet de *M. de Reaumur*.

gitudinem collocatâ; quæ tamen tania ab exortu rectricis eò remotior est, quò rectrix fit exterior; ità ut, dum caudam explicat Avis, taniæ istæ arcum sive lunulam simul efforment, cujus convexitas corpus, concavitas verò caudæ extremitatem spectat. Oculorum irides avellanæ. Rostrum nigricans, exceptâ basi colore pallidè carneo tinctâ. Pedes, unguisque fusco-nigricantes. *Insectis* victitat. In *Europa* frequens. Ex museo *Realmuriano*.

SECTION II.

Ceux qui ont la tête simple.

LEs Oiseaux de cette section ne forment qu'un seul genre, sçavoir celui du *Promérops*.

XXVIII.

Le genre du Promérops. (1).

Son caractère est d'avoir Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine :

(1) *Promérops*, nom que *M. de Reaumur* a donné à ce genre d'Oiseaux.

SECTIO II.

Eæ quæ capite simplici donantur.

UNico genere, *Promeropis* scilicet, constituitur hæc sectio.

XXVIII.

Genus Promeropis. (1).

Hujus character est Digi quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti :

(1) *Promerops*, nomen huic Avium generi ab illustr. *Realmurio* inditum.

Crura ad calcaneum usque plumosa :	Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :
Rostrum gracile, parùm arcuatum :	Le bec menu, & un peu courbé en arc :
Caput simplex.	La tête simple.

** I. LE PROMÉROPS.

Voyez Pl. XLIII. Fig. 2.

Promerops superne fuscus, infernè albus; pectore rufescente; uropygio & tectricibus caudæ superioribus viridi-olivaceis, inferioribus luteis; rectricibus fuscis, sex intermediis longissimis PROMEROPS.

Alaudam crassitie non multùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & quinque pollices æquat, & ad extremos ungues sex pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda duodecim pollices cum tribus lineis; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem laterales longitudine superat. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad unius pollicis & no-

Il n'est guères plus gros qu'une *Alouette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue douze pouces trois lignes; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est plus long que ces derniers. Il a treize pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à un pouce neuf lignes au-delà de l'origine de la queue. Les plumes qui couvrent le synciput sont longues & étroites, bru-

nes dans leur milieu & d'un gris-rouffâtre vers leurs bords. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, les couvertures du dessus des aîles & les plumes scapulaires sont brunes. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd - d'olive. Celles du dessous de la queue sont d'un beau jaune. La gorge est blanche, & a de chaque côté une petite bande étroite, longitudinale, brune. La partie inférieure du col & la poitrine sont rouffâtres. Le ventre est blanc. Les jambes sont brunes. Les plumes des côtés sont de la même couleur dans leur milieu, & blanches vers leurs bords. Les plumes des aîles sont brunes. La queue est composée de douze plumes de la même couleur, dont les six du milieu sont les plus longues : les trois latérales de chaque côté sont beaucoup plus courtes ; la plus extérieure n'a que deux pouces de long ; la suivante en a trois ; & la troisième quatre pouces trois lignes. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Cap de Bonne Espérance*, d'où il a été envoyé à *M. le Comte de Bentinck* qui en a fait présent à *M. de Reaumur*.

næ Spei, unde missus ad *D. Comitem de Bentinck*, qui *D. de Reaumur* dono dedit.

vem linearum distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Synciput cooperiunt pennæ longiores & strictiores, in medio fuscæ, versùs margines griseo-rufescentes. Quæ partes capitis & colli superiores & dorsum vestiunt, fuscæ sunt. Alarum tectrices superiores & scapulares pennæ concolores. Uropygium & tectrices caudæ superiores viridi-olivaceo tinguntur. Quæ caudam subtus obtegunt, sunt eleganter luteæ. Guttur albet, & in utroque latere exiguâ donatur taniâ strictâ, longitudinali, fuscâ. Collum inferius & pectus rufescunt. Venter albus est. Crura fusca. Pennæ latera vestientes in medio quoque fuscæ, versùs margines candidæ. Alarum remiges fuscæ. Caudam componunt duodecim rectrices concolores, quarum sex intermediae longissimæ : tres utrinque laterales multò breviores ; extrema enim duorum tantum pollicum longitudinem obtinet ; proximè sequens tres pollices longa est ; tertia tandem quatuor pollices cum tribus lineis. Rostrum, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Capite Bonæ Spei*.

2. LE PROMÉROPS DU MEXIQUE.

Promerops obscurè griseus, colore thalassino & purpureo-rubente varians; ventre dilutè flavo; remigibus majoribus dilutè cœruleis; rectricibus griseo-nigricantibus, saturatè viridi & purpureo mixtis, quatuor intermediis longissimis.

. . . . PROMEROPS MEXICANUS.

Avis, Ani, Mexicana, caudâ longissimâ. *Seb. Vol. I. pag. 73. hujus icon accurata Tab. XLV. Fig. 3.*

Falcinellus Mexicanus; Avis, Ani, Mexicana caudâ longissimâ. *Klein. Avi. pag. 107. No. III. 4.*

Curruca. *Moehr. Avi. Gen. 18.*

Craffitie *Turdum minorem* circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octodecim pollices & novem circiter lineas explet, & ad extremos unguis octo pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & octo lineas longum est; cauda duodecim pollices & tres lineas; pes octo cum semi lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue novem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem laterales nonnihil longitudine superat. Alæ complicatæ ad quindecim circiter linearum distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Caput, guttur, collum, pectus, dorsum & uropygium vestiunt pennæ

Il est à peu près de la grosseur de la *petite Grive*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix-huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce huit lignes de long; sa queue douze pouces trois lignes; son pied huit lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent à environ quinze lignes au-delà de l'origine de la queue. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus

des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un gris obscur, changeant en verd de mer & en rouge-pourpré. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un jaune clair. Au-dessus de chacun des yeux est une tache de la même couleur. Les grandes plumes des aîles sont d'un bleu clair : les moyennes sont de la même couleur que le dos. Celles de la queue sont d'un gris tirant sur le noir, mêlé en quelques endroits de verd foncé & de pourpre : les quatre du milieu sont beaucoup plus longues que les autres. Le bec est noirâtre, excepté vers les côtés, où il est d'un jaune clair. On le trouve au *Mexique*.

obscurè griseæ, colore thalassino & purpureo-rubente variantes. Pennæ scapulares, quæ alas superne obtegunt, & caudæ rectrices superiores concolores. Venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores sunt dilutè luteæ. Supra utrumque oculum macula extat concolor. Remiges alarum majores sunt dilutè cœruleæ : minores eodem ac dorsum colore tinguntur. Rectrices sunt griseo-nigricantes, quibusdam in locis viridi saturato & purpureo mixtæ : quatuor intermediae reliquas longitudine multum excedunt. Rostrum nigricat ; attamen ad latera dilutè flavet. Habitat in *Mexico*.

3. LE PROMÉROPS HUPÉ DES INDES.

Promerops cristatus, superne dilutè spadiceus, infernè dilutè cinereus ; cristâ, capite & collo nigris ; rectricibus dilutè spadiceis, binis intermediis longissimis **PROMEROPS INDICUS CRISTATUS.**

Upupa Manucodiata. Klein. Avi. pag. 110. No. 15.

Avis Paradisiaca, Manucodiata, cristata, Orientalis rarissima. Seb.

Vol. I. pag. 48. hujus icon accurata Tab. XXX. Fig. 5.

Curruca. Moehr. Avi. Gen. 18.

Il est à peu près de la grosseur d'un *Etourneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est

Sturnum crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & septem

tem circiter pollices explet , & ad extremos ungues sex pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos tredecim lineas longum est ; cauda quatuordecim pollices cum tribus lineis ; pes novem lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus laterales paululùm longitudine excedit. Alæ complicatæ ad unius circiter pollicis distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Caput , guttur & collum sunt splendide nigra. In capitis vertice longiores sunt plumæ concolores , quarum quædam duorum pollicum longitudinem obtinent , elegantemque cristam efficiunt. Dorsum , uropygium , pennæ scapulares , quæ alas superne coöperiunt , superioresque caudæ rectrices sunt dilutè spadiceæ. Pectus , venter , latera , crura & rectrices caudæ inferiores dilutè cinereæ. Alarum remiges , sicut & rectrices , dorso concolores. Rectrices binæ intermediae lateralium longitudinem multùm excedunt ; laterales enim tres pollices longitudine non multùm superant. Ros-

Tome II.

d'environ un pied sept pouces , & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long ; sa queue quatorze pouces trois lignes ; son pied neuf lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , huit lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est un peu plus long que ces derniers. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères qu'à un pouce au - delà de l'origine de la queue. La tête , la gorge & le col sont d'un très - beau noir. Sur le sommet de la tête sont de longues plumes de la même couleur , dont quelques - unes ont jusqu'à deux pouces de longueur , & qui forment une belle hupe. Le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un rouge - bay clair. La poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré clair. Les plumes des aîles & celles de la queue sont de la même couleur que le dos. Les deux du milieu de la queue sont beaucoup plus longues que les latérales , qui n'ont guères plus de trois pouces de lon-

N n n

gueur. Le bec, les pieds & les ongles sont d'une couleur de plomb. On le trouve aux *Indes Orientales*. *trum, pedes, unguisque plumbeo tinguntur colore. Habitat in India Orientali.*

4. LE PROMÉROPS DES BARBADES.

Promerops flavo-aurantius; capite & collo aureis; remigibus majoribus & rectricibus ex aurantio ad rubrum vergentibus.
 PROMEROPS BARBADENSIS.

Rhyndace. Moehr. Avi. Gen. 19.

Avis Paradisiaca, Americana, elegantissima. Seb. Vol. I. pag. 102. hujus icon satis accurata Tab. LXVI. Fig. 3.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue trois pouces neuf lignes; son pied dix lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête & le col sont d'une couleur d'or. La base du bec est entourée de quelques petites plumes rouges. Tout le reste du corps,

Præcedentem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices cum novem lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda tres pollices & novem lineas; pes decem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas : laterales paulò sunt breviores; posticus autem laterales nonnihil longitudine excedit. Alæ complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput & collum aureo colore refulgent. Plumulæ quædam rubicundæ basim rostri ambiunt. In

toto reliquo corpore, dorso scilicet, uropygio, pectore, ventre, lateribus, cruribus, scapularibus pennis, rectricibus alarum superioribus & pennis caudam superne & infernè cooperientibus, est flavo-aurantius. Remiges alarum majores ex aurantio ad rubrum vergunt: minores eodem ac dorsum colore imbuuntur. Caudam componunt rectrices longitudine æquales, remigibus majoribus concolores. Rostrum acutissimum est, aureoque colore perlustratur. Pedes sunt lutei. Habitat in *Barbadosibus Insulis.*

sçavoir le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus & du dessous de la queue, est d'un jaune-orangé. Les grandes plumes des aîles sont d'un orangé tirant sur le rouge : les moyennes sont de la même couleur que le dos. La queue est composée de plumes d'égale longueur & de la même couleur que les grandes plumes des aîles. Le bec est d'une couleur d'or & très-pointu. Les pieds sont jaunes. On le trouve aux *Isles Barbades.*

5. LE PROMÉROPS JAUNE DU MEXIQUE.

Promerops luteus; capite, collo & alis promiscuè cinereis ac nigris; rectricibus luteis PROMEROPS MEXICANUS LUTEUS.

Cochitototl, seu Avis florida. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 46. cap. CLXI. Raj. Syn. Avi. pag. 168. N°. 20.*
Les Mexiquains l'appellent COCHITOTOTL. Fern. Raj.

Magnitudine *Sturnum* circiter æquat. Caput, guttur & collum pennis vestiuntur promiscuè cinereis & nigris. Alæ iisdem coloribus variegantur. In reliquo corpore lutea est hæc Avis. Rectrices quoque luteæ. Oculi atrifunt; ipsorum irides pallidæ.

Il est à peu près de la grandeur d'un *Etourneau*. La tête, la gorge & le col sont couverts de plumes mêlées confusément & sans ordre de cendré & de noir. Les aîles sont variées des mêmes couleurs. Tout le reste du corps est jaune. Les plumes de la queue sont de cette der-

niere couleur. Les yeux sont d'un beau noir ; leur iris est d'un jaune pâle. Le bec & les ongles sont noirs ; & les pieds sont cendrés. Il se nourrit de vermisses & de graines. On le trouve au *Mexique* , sur-tout dans ses plus chaudes contrées.

Rostrum nigrum. Pedes cinerei ; ungues verò nigri. Vermiculis victitat, sicut & seminibus. Habitat in *Mexico* , cujus calidas regiones frequentat.





Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6. pouces.

Dessiné et Gravé par Martinet

1. Hupe ou Puput.

2. Promerops.



ORDO VIII. ORDRE VIII.

A V E S

LES OISEAUX

Digitis quatuor, membranis destitutis, tribus scilicet anticis, uno postico, omnibus circiter usque ad exortum discretis: cruribus ad calcaneum usque plumosis: rostro minimo, basi horizontaliter compresso, apice adunco; & oris rictu capite ampliori donatae.

Qui ont quatre doigts, dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jusqu'à leur origine: les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon: le bec très-petit, comprimé horizontalement à sa base, & crochu à son bout; & l'ouverture du bec plus large que la tête.

HUJUS Ordinis Aves duo genera constituunt. Aliae enim caudam habent simplicem, ut *Caprimulgus*: aliae caudam bifurcam, ut *Hirundo*.

LES Oiseaux de cet Ordre forment deux genres. Les uns ont la queue simple, comme le *Tette-chèvre*: & les autres ont la queue fourchue, comme l'*Hirondelle*.

XXIX.

Genus Caprimulgi.

XXIX.

Le genre du Tette-chèvre.

Hujus character est .
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon :

Le bec très-petit, comprimé horizontalement à sa base, & crochu à son bout :

L'ouverture du bec plus large que la tête :

La queue simple.

Crura ad calcaneum usque plumosa :

Rostrum minimum, basi horizontaliter compressum, apice aduncum.

Oris rictus capite amplior :

Cauda simplex.

Tous les Oiseaux de ce genre ont les trois doigts antérieurs joints ensemble par une petite membrane, qui s'étend depuis leur origine jusqu'à la première articulation : l'ongle du doigt du milieu est dentelé comme une scie du côté intérieur.

Omnium hujus generis Avium digiti tres antichi inter se connectuntur membranulâ, ab ipforum exortu ad primum usque articulum extensâ : unguis autem medii digiti in latere interiore serræ instar dentatus est.

** I. LE TETTE-CHÉVRE, OU CRAPAUD-VOLANT.

Voyez Pl. XLIV.

Caprimulgus superne griseo & nigricante transversim & undatim varius, quâlibet pennâ taniâ longitudinali nigrâ notatâ, infernè albo-rufescens, fusco saturato transversim striatus; remigibus tribus primoribus interiùs albâ maculâ notatis; rectricibus duabus utrinque extimis albo terminatis.
 CAPRIMULGUS.

Caprimulgus griseus, maculis castaneis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. VII. sp. 1.*

Caprimulgus. *Gesn. Avi. pag. 241. hujus icon non satis accurata pag. 242. Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 567. hujus icon minimè accurata pag. 568; & insuper altera icon à Gesnero mutuata pag. 569.*

Schwenck. Avi. Sil. pag. 232.

Jonst. Avi. pag. 34. hujus duæ icones, Tab. XX, una à Gesnero mutuata, & altera ab Aldrovando.

Charlet. Exer. pag. 78. N°. 8.

Charlet. Onomast. pag. 71. N°. 8.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 273.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 84. sp. 5.

Caprimulgus, Aegothelas. *Gesn. icon. Avi. pag. 130, in qua hujus icon non satis accurata.*

Caprimulgus nostras vulgaris, & Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag. 26. N°. A. 1.*

Caprimulgus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 70. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XIV.*

Caprimulgus Aldrovandi; Fur nocturnus Plinii; Connilus nocturnus. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 369.*

Nycticorax; Caprimulgus; Ægithalus. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 101.*

Hirundo caudâ integrâ, ore fetis ciliato. *Faun. Suec. Linn. N°. 248.*

Hirundo Caprimulga. *Klein. Avi. pag. 81. N°. 1, in qua hujus icon non satis accurata.*

Hirundo. *Moehr. Avi. Gen. 38.*

Pfaff Eberi & Peuceri. *Schwenck.*

Rare Bird. *Borl. Nat. Hist. of Cornwall. pag. 245. hujus icon non satis accurata Tab. XXIV. Fig. XIII.*

Tete-chèvre ou grand Merle. *Alb. Tom. I. pag. 11; avec une figure mal coloriée Pl. 10.*

Effraye; Frezaye. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 28 a, dans laquelle il y a une mauvaise figure.*

Les Grecs l'appellent Αἰγोधήλας. *Bel. Αἰγोधήλας. Aldrov. Schwenck. Jonst. Charlet.*

Les Catalans, ENGANYA PASTUS; XUCLACABRES; MUNYACABRES. *Barr. Les Boulonnois, CALCABOTTO. Aldrov.*

Les Allemands, WILCH-SUGER; GEISZ-MELCHER. *Gesn. GEISZ MELCKER; NACHT-RAEBLEIN. Rzac. NACHT-RAEBLIN; NACHT-VOGEL. Schwenck. NACHT-RABE; NACHT-SCHWALBE. Frisch.*

Les Silésiens, NACHT-SCHADE; TAGE-SCHLAEFFER. *Schwenck. JAG-SCHLAEFFER. Frisch.*

Les Polonois, KOZODOY. *Rzac.*

Les Russiens, LELECK. *Klein.*

Les Suédois, NATT-SKRAEFWA; NATT-SKIAERRA. *Linn.*

Les Ostrobotniens, KIAERRGYLTA. *Linn.*

Les Anglois, GOAT-SUCKER. *Willugh. Raj. Alb. GOAT-SUCKING-OWL; NIGHT-JARR. Charlet.*

Les Habitans de la Province d'Yorck, CHURN-OWL. *Willugh. Raj. Alb. Borl.*

Les Habitans de la Comté de Shrops, FERN-OWL. *Willugh. Raj.*

Merulam crassitie paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pol-

Il est un peu plus gros qu'un Merle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six li-

gnes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue cinq pouces une ligne; son pied sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes : les latéraux sont beaucoup plus courts; & celui de derrière est encore plus court. Les trois doigts antérieurs sont joints ensemble par une petite membrane, qui s'étend depuis leur origine jusqu'à la première articulation : l'ongle du doigt du milieu est dentelé comme une scie du côté intérieur, comme on le voit dans les *Hérons*. Il a un pied neuf pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos sont très-joliment variées de petites lignes transversales & en zigzags, alternativement grises & noirâtres, chaque plume ayant une bande noire, qui s'étend selon la longueur de la tige : ces bandes sont fort larges sur quelques-unes des plumes du sommet de la tête & très-étroites sur toutes les autres. Il y a aussi un peu de roussâtre mêlé à la partie supérieure

lices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est; cauda quinque pollices cum linea una; pes septem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas; laterales multò sunt breviores; posticus omnium brevissimus. Digi-
 titi tres antici inter se connectuntur membranulâ, ab ipsorum exortu ad primum usque articulum protensâ : unguis autem medii digiti in latere interiore ferræ instar dentatus est, eodem modo quo in *Ardeis* se habet. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis novem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsum supremum, elegantissimè variegant lineolæ transversæ & undatæ, alternatim griseæ & nigricantes; quælibet insuper penna tæniâ notatur nigrâ, secundùm scapi longitudinem protensâ; quæ tæniæ in quibusdam pen-
 nis summum caput vestientibus latiores sunt, & in reliquis

reliquis omnibus strictiores. Pars colli superior aliquid insuper rufescentis admixtum habet. Dorsum inferius, uropygium & tectrices caudæ superiores lineolis variegantur alternatim griseis & nigricantibus, undatis, & in omnem sensum productis. Pennæ scapulares iisdem ac dorsum supremum coloribus ornantur, & insuper rufescentibus & majusculis quibusdam nigris variegantur maculis. In utroque capitis latere, secundum mandibulæ inferioris longitudinem tænia extenditur alba, circiter ad occipitum usque protensa. Genæ, sicut & guttur, lineolis transversis, alternatim rufescentibus & nigricantibus sunt striatæ. Collum inferius & pectus tæniis similiter transversis & nonnihil undatis, alternatim griseis & nigricantibus sunt striatæ, & quibusdam insuper maculis albo-rufescentibus variegata. Venter, latera, crura, alarumque tectrices inferiores albo-rufescentes, fusco saturato transversim striatæ. Pennæ caudam subtus cooperientes dilutè rufescentes, simili modo saturatè fusco transversim striatæ. Alarum tectrices superiores

du col. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont variées de petites lignes alternativement grises & noirâtres, formées en zigzags, & qui suivent toutes sortes de directions. Les plumes scapulaires sont colorées comme celles de la partie supérieure du dos, & de plus variées de taches roussâtres & de quelques grandes taches noires. De chaque côté de la tête, tout le long de la mâchoire inférieure, est une bande blanche, qui s'étend jusque vers l'occiput. Les joues & la gorge sont rayées de petites lignes transversales, alternativement roussâtres & noirâtres. La partie inférieure du col & la poitrine sont aussi rayées transversalement & un peu en zigzags de bandes alternativement grises & noirâtres, & variées de quelques taches d'un blanc-roussâtre. Le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de l'aile sont d'un blanc-roussâtre, rayé transversalement d'un brun foncé. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un roussâtre clair, rayé de même transversalement de brun foncé. Celles du dessus des ailes sont noirâtres, & variées de taches, les unes rousses, & les autres d'un

rouffâtre clair : les plus grandes sont rayées transversalement & en zigzags de gris & de noirâtre, mais vers le bout seulement. (*Voyez la Figure* : elle fera mieux voir cette variété, qu'il n'est possible de l'exprimer par la description). Les plumes des aîles sont d'un brun-noirâtre, & variées des deux côtés de taches rouffâtres, avec un peu de gris mêlé vers le bout : les trois premières ont une grande tache blanche du côté intérieur vers les deux tiers de leur longueur : cette tache s'étend quelquefois sur le côté extérieur de la seconde & de la troisième plume. La seconde est la plus longue de toutes. La queue est composée de dix plumes : les deux du milieu sont grises & variées de bandes transversales, noirâtres ; mais les espaces gris, contenus entre ces bandes, sont eux-mêmes variés de petites lignes noirâtres, formées en zigzags : les latérales sont noirâtres, & rayées transversalement de bandes variées de gris & de noirâtre : les deux plus extérieures de chaque côté sont de plus terminées de blanc. Les bords de la mâchoire supérieure sont garnis de gros poils noirâtres, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec & les ongles sont noirâtres ;

nigricant, & maculis, aliis rufis, aliis dilutè rufescentibus variegantur : istarum rectricum majores griseo & nigricante transversim & undatim sunt striatæ, sed versùs apicem tantùm. (*Iconem consule* : varietas ista magis ab iconis inspectu quàm accuratissimâ descriptione patebit). Remiges ex fusco nigricant, maculis rufescentibus in utroque latere variegantur, & aliquid insuper grisei versùs apicem admixtum habent : tres primores majusculâ notantur maculâ albâ, in latere interiore versùs duas tertias longitudinis partes collocatâ : quæ macula in latere exteriori secundæ remigis, sicut & tertiæ, quandoque protenditur. Remix secunda reliquas omnes longitudine superat. Decem rectricibus cauda constat : binæ intermediæ griseæ, tæniis transversis, nigricantibus variæ ; intervalla autem grisea, tænias inter istas contenta, lineolæ nigricantes & undatæ variegant : laterales nigricantes, tæniis griseo & nigricante variis transversim striatæ : binæ utrinque extremæ albo insuper terminantur. Mandibulæ superioris margines pilis crassis, nigri-

cantibus, antrorsum versis & les pieds sont bruns. Il se
& setarum instar rigidis obli- nourrit d'*Insectes* & de graines
tæ sunt. Rostrum, unguet- de plantes. *Du cabinet de M. de*
que nigricantes; pedes verò *Reaumur.*
fusci. *Insectis* & plantarum
feminibus victitat. *Ex museo*
Realmuriano.

2. LE TETTE-CHÉVRE DE LA CAROLINE.

Caprimulgus superne griseo & nigricante transversim & unda-
tim varius, infernè griseo-rufescens, lineolis longitudina-
libus, nigricantibus variegatus; remigibus exterius maculis
flavicantibus, tribus primoribus interiùs albâ maculâ nota-
tis CAPRIMULGUS CAROLINENSIS.

Caprimulgus Americanus, eleganter variegatus. *Barr. Ornith. Class. III.*
Gen. VII. sp. 2.

Hirundo major subfusca miscella, maculâ albâ sphœricâ in utrâque alâ.
Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 467.

Strix varia minor. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 148.*

Tette-chèvre de la Caroline. *Catesb. Tom. I. pag. 8; avec une figure exacte*
Pl. 8.

Les Anglois l'appellent GOAT-SUCKER OF CAROLINA. *Catesb. RAIN-BIRD.*
Browne.

Les Anglois de la Caroline & de la Virginie, EAST INDIA BAT. *Catesb.*

Les Indiens de la Guiane, COPORAL. *Barr.*

Caprimulgum nostratem
crassitie circiter æmulatur.
Ipsius longitudo ab apice
rostri ad caudam extremam
undecim pollices & tres cir-
citer lineas æquat, & ad ex-
tremos ungues novem pol-
lices. Rostrum ab ipsius api-
ce ad oris angulos unum
pollicem & septem lineas
longum est; cauda quatuor
pollices; pes octo lineas; &

Il est à peu près de la gros-
seur du nôtre. Sa longueur de-
puis le bout du bec jusqu'à ce-
lui de la queue est d'environ
onze pouces trois lignes, &
jusqu'à celui des ongles de neuf
pouces. Son bec depuis son
bout jusqu'aux coins de la bou-
che a un pouce sept lignes de
long; sa queue quatre pouces;
son pied huit lignes; & celui
du milieu des trois doigts an-

térieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes : les lateraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est le plus court de tous. Les trois doigts antérieurs sont joints ensemble par une petite membrane, qui s'étend depuis leur origine jusqu'à la premiere articulation : l'ongle du doigt du milieu est dentelé comme une scie du côté intérieur. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont joliment variées de petites lignes transversales & en zig-zags, alternativement grises & noirâtres. La partie supérieure de la tête est de plus marquée d'assez grandes taches de cette dernière couleur. Les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris-rouffâtre, varié de très-petites lignes longitudinales, noirâtres. Tout le long de la mâchoire inférieure est une bande blanche, qui s'étend jusqu'aux coins de la bouche ; au-dessus desquels sont quelques taches jaunâtres. Les couvertures du dessus des aîles sont

trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus adhuc brevior. Digiti tres antichi inter se connectuntur membranulâ, ab ipforum exortu ad primum usque articulum protensâ ; unguis autem mediî digiti ad latus interius serræ instar dentatus est. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Superiores capitis & colli partes, dorsum, uropygium & pennæ caudam superne tegentes lineolis transversis & undatis, alternatim griseis & nigricantibus eleganter variegantur. Partem capitis superiorem majusculæ insuper maculæ nigricantes variegant. Genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura & tectrices caudæ inferiores sunt griseo-rufescentes, minutissimis lineolis longitudinalibus, nigricantibus variegatæ. Secundum mandibulæ inferioris longitudinem tænia extenditur candida, ad oris angulos usque protensâ ; & supra oris angulos quædam extant maculæ flavicantes. Tectrices alarum superiores iisdem ac dorsum coloribus ornan-

tur, & maculis insuper longitudinalibus, nigricantibus, sicut & quibusdam rotundis, flavicantibus, variegantur. Alarum remiges sunt griseo & nigricante transversim & undatim variegatæ; & maculis flavicantibus exterius tantum notatæ: tres primores majusculâ notantur maculâ albâ in latere interiore versùs duas tertias longitudinis partes collocatâ. Remix secunda reliquarum omnium longitudinem excedit. Rectrices griseæ, lineolis variæ transversis, nigricantibus & undatis, quarum quædam reliquas latitudine antecellunt. Mandibulæ superioris margines longis pilis nigris, antrorsum versis, setarum instar rigidis obsitæ sunt. Rostrum, unguisque nigricantes; pedes verò fusci. *Insectis* vivit. Habitat in *Virginia* & *Carolina*.

de la même couleur que le dos, & variées en outre de taches longitudinales; noirâtres, & de quelques taches rondes & jaunâtres. Les plumes des ailes sont variées transversalement & en zigzags de gris & de noirâtre, & marquées de taches jaunâtres sur le côté extérieur seulement: les trois premières ont une grande tache blanche du côté intérieur vers les deux tiers de leur longueur. La seconde plume est la plus longue de toutes. Les plumes de la queue sont grises & variées de petites lignes transversales, noirâtres, formées en zigzags, & dont quelques-unes sont plus larges que les autres. Les bords de la mâchoire supérieure sont garnis de longs poils noirs, tournés en - devant & roides comme des foyes. Le bec & les ongles sont noirâtres; & les pieds sont bruns. Il se nourrit d'*Insectes*. On le trouve à la *Virginie* & à la *Caroline*.

3. LE TETTE-CHÉVRE DE VIRGINIE.

Caprimulgus superne obscure fuscus, fusco-rufescente transversim & sparsim varius, cinereo admixto, inferne alba-aurantius, nigricante transversim striatus; remigibus quinque primoribus taniâ transversâ albâ; rectricibus duabus utrinque extimis maculâ albâ notatis . . . CAPRIMULGUS VIRGINIANUS.

Caprimulgus minor Americanus. *Catesb. append. pag. 16; avec une figure pas assez exacte Pl. 16.*

Whip-poor-Will, ou petit Tette-chèvre. *Edwards. Tom. II. pag. LXIII; avec une figure exacte Pl. 63.*

On l'appelle en Virginie WHIP-POOR-WILL. *Edwards. Catesb.*

Il est d'un tiers plus petit que le nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes & demie de long; sa queue trois pouces trois lignes; son pied cinq lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Les trois doigts antérieurs sont joints ensemble par une petite membrane, qui s'étend depuis leur origine jusqu'à la première articulation: l'ongle du doigt du milieu est dentelé comme une scie du côté intérieur. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont d'un brun obscur, rayé transversalement & parsemé de brun - roussâtre, avec un petit mélange de cendré fort irrégulier. De chaque

Quoad crassitiem *Caprimulgo nostrati* tertiâ parte cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices æquat, & ad extremos ungues sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem cum semi lineas longum est; cauda tres pollices & totidem lineas; pes quinque lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus omnium brevissimus. Digiti tres antichi inter se connectuntur membranulâ, ab ipsorum exortu ad primum usque articulum protensâ: unguis autem medii digiti in latere interiore ferræ instar dentatus est. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ obscure fusæ, fusco-rufescente transversim & sparsim variæ, cum aliqua cinerei mixtura inordinatim posita. Tectrices caudæ superiores & scapulares pennæ concolores. In utroque ca-

pititis latere quædam extant maculæ splendide aurantiæ, quarum series supra oculos, & inde supra collum ducitur. Genæ ex dilutè fusco ad cinereum inclinant. Infra guttur macula adest candida, lunulata, cujus convexitas deorsum vertitur; quæ macula pauco aurantio, præsertim in infima parte, variegatur. Collum inferius, pectus, venter, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & pennæ alas subtus cooperientes sunt albo aurantiæ, nigricante transversim striatæ. Rectrices alarum superiores iisdem ac dorsum coloribus ornantur, & quibusdam insuper maculis griseo-rufescentibus variegantur. Alarum remiges majores nigricant; quinque primores versùs ipsarum mediam longitudinem latâ notantur taniâ transversâ, albâ, in utroque cujuslibet remigis latere protensâ, exceptâ tamen primâ remige, cujus tania alba latus tantùm interiorius occupat: remigès minores sunt dorso concolores. Caudam componunt decem rectrices iisdem coloribus variæ, quarum binæ utrinque extremæ maculâ albâ versùs apicem insigniuntur. Man-

côté de la tête, en passant par-dessus les yeux & descendant sur le col, sont quelques taches d'un orangé vif. Les joues sont d'un brun clair, tirant sur le cendré. Sous la gorge est une tache blanche, en forme de croissant, dont la convexité est tournée en en-bas, & variée d'un peu d'orangé, sur-tout à sa partie inférieure. Le dessous du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte d'orangé & rayé transversalement de noirâtre. Les couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos, & variées en outre de quelques taches d'un gris-roussâtre. Les grandes plumes des ailes sont noirâtres; les cinq premières sont marquées vers le milieu de leur longueur d'une large bande transversale, blanche, qui s'étend sur les deux côtés de chaque plume, excepté la première, dont cette bande blanche n'occupe que le côté intérieur: les moyennes sont variées des mêmes couleurs que le dos. La queue est composée de dix plumes colorées de même, & dont les deux plus extérieures de chaque côté sont marquées d'une tache blanche

vers le bout. Les bords de la mâchoire supérieure sont garnis de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont d'une couleur de chair. On le trouve en *Virginie*, dont il fréquente principalement la partie occidentale & les montagnes.

dibulæ superioris margines longis pilis nigris, antrorsum versis & setarum instar rigidis obsitæ sunt. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque carneo colore tincti. Habitat in *Virginia*, in cujus parte occidentali & montibus præcipuè versatur.

4. LE TETTE-CHÉVRE DE LA JAMAÏQUE.

Caprimulgus in toto corpore griseo, nigro & xerampelino variegatus; remigibus, rectricibusque dilutioribus; naribus cylindræis CAPRIMULGUS JAMAÏCENSIS.

Caprimulgus. *Moehr. Avi. Gen.* 40.

Caprimulgus, seu Noctua sylvatica Jamaycensis minor. *Raj. Syn. Avi.* pag. 180. N°. 4.

Hirundo Jamaicensis, naribus conspicilia mentientibus. *Klein. Avi.* pag. 81. N°. 2.

Noctua minor ex pallido & fusco varia. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 296. N°. IV. *hujus icon minimè accurata Tab.* 255. *Fig.* 1.

Ulula Americana, ex pallido & fusco varia. *Barr Ornith. Class. III. Gen. V. sp.* 5.

Strix capite levi, plumis griseo-albidis labiorum pilosis. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag.* 473.

Strix sylvatica, major, pulla. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 147.

Les Anglois l'appellent SMALL WOOD-OWL. *Sloane. Raj. SCREECH-OWL. Browne.*

Les François de la Guiane, HALEUR. *Barr.*

Il est à peu près de la grosseur de notre Tette-chèvre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a environ un pouce de

Caprimulgum nostratem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices explet, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum circiter pollicem

cem longum est ; cauda quatuor pollices ; pes octo lineas ; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue decem lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ultra caudæ exortum non multum protrahuntur. Per universum corpus pennis vestitur griseo, nigro & xerampelino variis. Alarum remiges, sicut & rectrices, iisdem variegantur coloribus, sed nonnihil dilutioribus. Mandibulæ superioris margines longis pilis nigris, antrorsum versis & setarum instar rigidis obsitæ sunt. Rostrum nigrum. Nares tubulorum cylindraceorum, duarum cum semi linearum altitudine supra rostri superficiem prominentium, æmulæ. Pedes, unguesque fusci. Habitat in *Jamaica & Guiana.*

long ; sa queue quatre pouces ; son pied huit lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Il a dix pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. Tout son corps est couvert de plumes variées de gris, de noir & de couleur de *Feuille-morte*. Les plumes des aîles & celles de la queue sont de la même couleur, mais un peu plus claire. Les bords de la mâchoire supérieure sont garnis de longs poils noirs, tournés en-devant & roides comme des foyes. Le bec est noir. Les narines ressemblent à de petits tuyaux cylindriques, qui s'élèvent de la hauteur de deux lignes & demie au-dessus de la surface du bec. Les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve à *la Jamaïque & dans la Guiane.*

5. LE TETTE-CHÉVRE DU BRÉSIL.

Caprimulgus in toto corpore cinereo-fuscus, maculis obscure flavis & albicantibus variegatus ; torque obscure aureo ; rectricibus binis intermediis longioribus . . . CAPRIMULGUS BRASILIENSIS.

Hirundo, Caprimulgi species. *Klein. Avi. pag. 82. N°. 3.*

Strix rufescens, miscella, coloribus quasi undulatis, capite levi, iride croceo. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 473.*

Guira-querea. *Pison. Hist. Nat. pag. 94, in qua hujus icon minimè accurata.*

Guira-querea Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 202, in qua hujus icon minimè accurata.*

Jonst. Avi. pag. 138. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 58.

Guira-querea Marcgravii. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 295. N°. III.*

Guira-querea Marcgravii, Caprimulgi species. *Raj. Syn. Avi. pag. 180. N°. 3.*

Guira-querea Brasiliensis ad Caprimulgum accedens Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 71. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XIV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 27. N°. 3.

Les Anglois l'appellent WOOD-OWL, ou GOAT-SUCKER. *Sloane. Raj. MOUNTAIN-OWL, Browne.*

Les Brasiliens, GUIRA-QUEREA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Il paroît beaucoup plus grand que l'*Alouette ordinaire*, quoique dans le fond il ne soit réellement pas plus gros ; car ses aîles sont très-longues, & sa queue l'est encore davantage : elle a jusqu'à huit pouces de long. Sa tête est large, aplatie & assez grosse. Tout son corps est couvert de plumes d'un cendré-brun, variées de taches d'un jaune obscur & de taches blanchâtres. Il a cependant tout autour du col un anneau d'une couleur d'or obscure, placé au-dessous de la tête, & qui lui forme un collier. Les plumes des aîles & celles de la queue sont de la même couleur que le reste du corps. Les deux plumes du milieu de la queue sont beaucoup plus longues que les latérales. Les trois doigts

Alaudâ vulgari multò major videtur, etiamsi reverà illam crassitie non antecellat ; longas enim habet alas & caudam multò longiorem, octo scilicet pollices æquantem. Caput latum est, compressum ac satis magnum. Universum corpus vestiunt pennæ cinereo-fuscæ, maculis obscurè flavis & albicantibus variegatæ. Circa totum collum tamen, ponè caput, annulum habet obscurè aureum, torquem efficientem. Remiges & rectrices sunt reliquo corpori concolores. Rectrices autem binæ intermediæ lateralibus multò sunt longiores. Dignities tres antichi inter se connectuntur membranulâ, ab exortu digitorum ad primum

usque articulum extensâ. Unguis autem digiti trium anticorum medii in latere interiore ferræ instar dentatus est. Oculi magni sunt & nigricantes. Circa mandibulæ superioris margines pili rigent longiusculi, nigricantes, antrorsum & ad latera versi & setarum instar rigidi. Pedes sunt cinereo-fusci; ungues verò nigri. Habitat in *Brasilia*. antérieurs sont joints ensemble par une petite membrane, qui s'étend depuis leur origine jusqu'à la première articulation : & l'ongle du doigt du milieu des trois antérieurs est dentelé comme une scie du côté intérieur. Les yeux sont grands & noirâtres. Les bords de la mandibule supérieure sont garnis de longs poils noirâtres, tournés en-devant & vers les côtés & roides comme des foyes. Les pieds sont d'un cendré-brun ; & les ongles noirs. On le trouve au *Brésil*.

6. LE TETTE-CHÉVRE TACHETÉ DU BRÉSIL.

Caprimulgus superne nigricans, albo punctulatus, flavedine albedini admixtâ, infernè albo & nigro varius; oculorum ambitu ex albo flavescente; pedibus albis.... CAPRIMULGUS BRASILIENSIS NÆVIUS.

Caprimulgus Americanus. *Willugh. Ornith. pag. 70. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XIV, sub titulo, Ibijau, sive Noitibo minor Marcgravii.*

Raj. Syn. Avi. pag. 27. N^o. 2.

Hirundo Brasiliensibus Ibijau, Lusitanis Noitiba dicta. *Petiv. Gaz. Nat. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIX. Fig. 1.*

Ibijau Brasiliensibus; Noitibo Lusitanis. *Marcgr. Hist. Br. pag. 195, in qua hujus icon minùs accurata.*

Jonst. Avi. pag. 133. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 57.

Nycticorax. *Moehr. Avi. Gen. 110.*

Les Portugais l'appellent, NOITIBO. *Marcgr. Jonst. Petiv. Willugh. Raj.*

Les Brasiliens, IBIJAU. *Marcgr. Jonst. Petiv. Willugh. Raj.*

Magnitudine *Hirundinem* non antecellit. Caput habet latum & compressum; pedes, secundum corporis mo-

Il n'est pas plus grand qu'une *Hirondelle*. Sa tête est large & aplatie. Ses pieds sont fort petits, à proportion de la grosseur

de son corps, & ont à peine un demi-pouce de long. Sa queue, qu'il peut étendre à volonté, est fort jolie & longue de deux pouces. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres, tachetées de petits points blancs, auxquels est mêlé aussi un peu de jaune. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, celles du dessus de la queue, les plumes des aîles & celles de la queue sont de la même couleur. Tout le dessous du corps, sçavoir la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont variées de noir & de blanc. Le tour des yeux est d'un blanc-jaunâtre; leur prunelle est d'un beau noir; & leur iris est noirâtre. Le bec & les ongles sont de cette dernière couleur; & les pieds sont blancs. L'ongle du doigt du milieu des trois antérieurs est dentelé comme une scie du côté intérieur. On le trouve au *Brésil*.

lem, parvulos, vix semi-digitum longos; caudam elegantem, quam in latum potest explicare, duos pollices longam. Alæ complicatæ caudæ extremitatem attingunt. Caput, collum superius, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigricantes, albo punctulatæ, quæ nonnihil quoque flavedinis albedini admixtum habent. Pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superiores caudæ tectrices, remiges & rectrices concolores. Totum corpus inferius, guttur scilicet, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crura, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus vestientes, ex albo & nigro variegatur. Oculos ambit circulus ex albo flavescens; ipsorum pupilla atra; irides nigricantes. Rostrum quoque nigricans. Pedes albi; ungues verò nigricantes. Unguis autem digitorum anticorum medii versus interiora ferræ instar dentatus est. Habitat in *Brasilia*.



et Gravé par Martinet

Martinet Del. et Sculp.

Tette-chèvre ou Crapaud volant.

7. LE GRAND TETTE-CHÉVRE TACHETÉ DU BRÉSIL.

Caprimulgus superne nigricans, albo punctulatus, flavedine albedini admixtâ, infernè albo & nigro varius; oculorum ambitu ex albo flavescente; pedibus albis; ore aperto pugnum humanum admittente CAPRIMULGUS BRASILIENSIS MAJOR NÆVIUS.

Ibijau Species magnitudine Noctuæ. *Marcgr. Hist. Br. pag. 196. hujus icon minimè accurata pag. 195.*

Jonst. Avi. pag. 134. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 58.

Willugh. Ornith. pag. 70. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XIV, sub titulo, Ibijau, sive Noitibo major Marcgravii.

Raj. Syn. Avi. pag. 27. N°. 2.

Les Portugais l'appellent NOITIBO. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Les Brasiiliens, IBIJAU. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Colore & conformatione cum præcedente convenit; ab illo autem discrepat magnitudine, quâ eum multum antecellit; *Noctuam* enim adæquat. Os quando aperit, pugnum humanum facile admittit. Habitat in *Brasilia*.

Il ressemble parfaitement au précédent par sa forme & sa couleur; mais il en diffère par sa grandeur, qui est beaucoup plus considérable, & qui égale celle d'une *Chouette*. Sa bouche est si grande, que, lorsqu'elle est ouverte, on y peut aisément placer le poing. On le trouve au *Brésil*.

X X X.

X X X.

Genus Hirundinis.

Le genre de l'Hirondelle.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus; omnes circiter usque ad exortum discreti:

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière; tous séparés environ jusqu'à leur origine:

Crura ad calcaneum usque plumosa:

Les jambes couvertes de plumes jusqu'au talon:

P p p iij

Le bec très-petit, comprimé
horizontalement à sa base,
& crochu à son bout :

L'ouverture du bec plus large
que la tête :

La queue fourchue.

Rostrum minimum, basi ho-
rizontaliter compressum,
apice aduncum :

Oris rictus capite amplior :

Cauda bifurca.

Tous les Oiseaux de ce genre ont celui du milieu des trois doigts antérieurs étroitement uni avec l'extérieur depuis son origine jusqu'à la première articulation (voyez *Tom. I. Pl. I. Fig. 5*).

Omnium hujus generis Avium digitus trium anteriorum medius ab exortu ad primum usque articulum cum extimo arctè cohæret (vide *Vol. I. Tab. I. Fig. 5*).

** I. L'HIRONDELLE DE CHEMINÉE.

Hirundo superne nigro-cœrulescens, infernè albida, cum aliqua castanei mixtura; syncipite & gutture castaneis; rectricibus lateralibus interiùs albâ maculâ notatis . . .
HIRUNDO DOMESTICA.

Hirundo rectricibus, excepto pari intimo, albâ maculâ notatis. Faun. Suec. Linn. N°. 244.

Hirundo subtus alba, superne ex nigro cœrulescens, mento rufo. Barr. Ornith. Class. III. Gen. VIII. sp. I.

Hirundo. Gesn. icon. Avi. pag. 51, in qua hujus icon non satis accurata. Jonst. Avi. pag. 83. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 42.

Charlet. Exer. pag. 95. N°. IV.

Charlet. Onomast. pag. 89. N°. IV.

Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 384.

Moehr. Avi. Gen. 38.

Hirundo domestica. Gesn. Avi. pag. 548, in qua hujus icon non satis accurata.

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 658. hujus icon pessima pag. 662.

Willugh. Ornith. pag. 155. hujus duæ icones non satis accuratæ Tab. XXXIX.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.

Raj. Syn. Avi. pag. 71. N°. A. I.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 283.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 84. sp. I.

Hirundo prima. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 286.*

Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 385.

Hirundo rustica. *Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 18.*

Hirundo rustica *Frischii. Klein. Avi. pag. 82. N°. 2.*

Hirundo peregrina. *Prosp. Alp. Ægypt. Vol. 1. pag. 198.*

Hirondelle domestique. *Alb. Tom. I. pag. 40 ; avec une figure mal coloriée Pl. 45.*

Petite Hirondelle. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 378 ; avec une mauvaise figure pag. 379.*

Harondelle ; Hirondelle. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 99 b, dans laquelle est la même figure.*

Les Grecs l'appellent *Χελιδών. Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Raj.*

Charlet. Χελιδὼν. Schwenck. Χελιδὼ ; Κοτιλλη ; Κωτιλλος ; Κερρόπισ ; Α'ττικόρα ; Α'δωνίς ; Κρίες ; Ο'λολυγονα. Jonst. Ils appellent le jeune Χελιδονίδες. Aldrov.

Les Grecs modernes , *Χελιδον ou Χελιδονι. Aldrov.*

Les Espagnols , *GELONDRINA ; ANDORINHA. Gesn. Aldrov.*

Les Catalans , *ORONETA ; AURENDOLA. Barr.*

Les Italiens , *RONDINA. Gesn. RENDENA. Bel. Gesn. RONDENA ; RONDINE ; RONDINELLA ; CESILA ; ZISILA. Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands , *SCHWALB. Gesn. Aldrov. SCHWALBE. Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. Frisch. HAUS - SCHWALBE ; GEUBEL - SCHWALBE. Schwenck. RAUCH-SCHWALBE. Rzac. HUSS-SCHWALM. Gesn.*

Les Saxons , *SWALE. Gesn. Aldrov.*

Les Suisses , *SCHWALM. Gesn. Aldrov. Schwenck. HAUSS-SCHWALM. Gesn. Aldrov.*

Les Hollandois , *SWALEM. Aldrov.*

Les Flamands , *SWALWE. Gesn. Aldrov.*

Les Brabançons , *ARUNDE. Gesn. ARONDE. Aldrov.*

Les Illyriens , *WLASTOWIGE. Gesn. Aldrov.*

Les Polonois , *JASKOLKA. Rzac.*

Les Suédois , *LADU-SWALA. Linn.*

Les Anglois , *SWALLOW. Aldrov. Charlet. HOUSE-SWALLOW. Willugh. Alb. COMMON SWALLOW. Willugh. Raj. COMMON HOUSE-SWALLOW. Sibbald. CHIMNEY-SWALLOW. Raj.*

Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & duas lineas æquat , & ad extremos ungues quatuor pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos septem lineas longum est ;

Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces deux lignes , & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long ; sa queue deux pouces

onze lignes ; son pied cinq lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , six lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est de la même longueur que ces derniers. Elle a onze pouces dix lignes de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à quatre lignes de distance du bout de la queue. Le synciput & la gorge sont d'une belle couleur de marron. La tête , le col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un noir-bleu fort éclatant. La poitrine , le ventre , les côtés , les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanchâtre mêlé d'une légère teinte de marron. Les couvertures du dessous des aîles sont de la même couleur , mais plus rembrunie. Les plumes des aîles sont noirâtres en - dessous , en - dessus elles sont de la même couleur du côté intérieur , & leur côté extérieur est d'un noir brillant d'un lustre de bleu & de verd. La premiere est la plus longue de toutes : les moyennes sont échancrées en cœur par le bout. La queue est composée de douze plumes noirâtres en-des-

cauda duos pollices cum undecim lineis ; pes quinque lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas : laterales paulò sunt breviores ; & posticus laterales longitudine æmuletur. Alis expansis , extremitates majorum remigum undecim pollicum & decem linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam extremam , exceptâ tamen quatuor linearum distantia , pertingunt. Synciput & guttur colore tinguntur eleganter castaneo. Caput , collum , dorsum , uropygium , scapulares pennæ , quæ alas superne cooperiunt , & teatrices caudæ superiores sunt splendidissimè nigro-cœrulescentes. Pectus , venter , latera , crura & teatrices caudæ inferiores albidæ , & aliquid castanei admixtum habent. Alarum teatrices inferiores eodem imbuuntur colore , sed obscuriore. Remiges subtus nigricantes , superne in latere interiore concolores , in exteriori verò nigra , quæ nigredo cœruleo & viridi refulget. Remix prima reliquas omnes longitudine superat : minores sunt apice cordatim emarginatæ. Caudam componunt duodecim

cim rectrices subtus nigricantes ; superne verò binæ intermediæ ex nigricante ad viride vergunt ; laterales in latere exteriori concolores , in interiori autem nigricant , & versùs apicem albâ maculâ notantur. Caudam habet hæc Avis maximè bifurcam ; rectrix enim utrinque extrema binas intermedias quindecim circiter linearum longitudine antecellit , & rectricem ipsi finitimam novem tantùm linearum distantia excedit. Oculorum irides avellaneæ. Palatum & oris anguli lutei. Rostrum nigrum. Pedes , unguisque nigricantes. *Muscis* , aliisque *Insectis* victitat. In caminis nidificat. *Ex museo Reaumuriano.*

sous ; en-dessus les deux du milieu sont d'un noirâtre tirant sur le verd ; les latérales sont de la même couleur du côté extérieur , mais leur côté intérieur est noirâtre & marqué vers le bout d'une tache blanche. La queue est très - fourchue ; car sa plume la plus extérieure de chaque côté est plus longue que les deux du milieu d'environ quinze lignes , & de neuf lignes seulement plus que celle qui en est la plus voisine. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Le palais & les coins de la bouche sont jaunes. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont noirâtres. Elle se nourrit de *Mouches* & autres *Insectes* ; & fait son nid dans les cheminées. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

A. L'HIRONDELLE BLANCHE.

Hirundo alba.

Hirundo alba. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 663 , in qua hujus icon non satis accurata.

Hirundo candida. Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 385.

Hirundo prorsus candida. Willugh. Ornith. pag. 155.

A præcedente differt colore in universo corpore candido.

Elle diffère de la précédente par sa couleur , qui est blanche par tout le corps.

** 2. LA PETITE HIRONDELLE, OU LE MARTINET A CUL BLANC.

Hirundo superne nigro-coerulescens, infernè nivea; uropygio candido; rectricibus nigro-coerulescentibus, lateralibus interioribus nigricantibus; pedibus ad ungues usque lanuginosis.

. . . . *HIRUNDO MINOR SIVE RUSTICA.*

Hirundo dorso nigro coerulescente, rectricibus immaculatis. Faun. Suec. Linn. N°. 245.

Hirundo media minor fusca, pectore albicante. Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 467.

Hirundo Uropygio albo. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 662, in qua hujus icon non satis accurata.

Hirundo subtus fulva, superne nigra. Barr. Ornith. Class. III. Gen. VIII. sp. 2.

Hirundo sylvestris. Gesn. Avi. pag. 564, in qua hujus icon non satis accurata.

Hirundo rustica, vel agrestis, vel sylvestris. Gesn. icon. Avi. pag. 52, in qua eadem icon.

Hirundo rustica, sive agrestis Plinii. Raj. Syn. Avi. pag. 71. N°. A. 2.

Hirundo rustica. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 84. sp. 2.

Hirundo agrestis, sive rustica Plinio dicta. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 693, in qua hujus icon pessima.

Hirundo agrestis Plinii, sive rustica. Willugh. Ornith. pag. 155. hujus icon minimè accurata Tab. XXXIX.

Hirundo agrestis, sive rustica. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 283.

Hirundo agrestis, rustica. Charlet. Exer. pag. 96. N°. 4.

Charlet. Onomazt. pag. 90. N°. 1.

Hirundo agrestis. Jonst. Avi. pag. 84. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 42.

Hirundo secunda. Schwenck. Avi. Sil. pag. 288.

Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 385.

Hirundo urbica. Frisch. hujus icon accurata Tab. 17.

Hirundo domestica. Klein. Avi. pag. 82. N°. 1.

Hirundo Apos minor. Charlet. Exer. pag. 96. N°. 4.

Charlet. Onomazt. pag. 90. N°. 4.

Hirundo faxatilis, seu Speluncaria. Charlet.

Ἀκάνδυλις Arist. Schwenck.

Martinet. Alb. Tom. II. pag. 36; avec une figure mal coloriée Pl. 56. Fig. a.

Martinet, Espece d'Hirondelle. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 380; avec une mauvaise figure pag. 381.

Martinet petit, ou simplement Martinet. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 100 a*, dans laquelle est la même figure.

Hirondelle. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 150.*

Les Catalans l'appellent AURENDOLA ROQUERA. *Barr.*

Les Italiens, RONDONE SELVATICO. *Bel.*

Les Allemands, LEIM-SCHWALBE. *Rzac.* HAUS-SCHWALBE. *Frisch.* FENSTER-SCHWALBE; LEIM-SCHWALBEN; LAUBEN-SCHWALBEN; DACH-SCHWALBEN; KIRCH-SCHWALBEN. *Schwenck.* KIRCH-SCHWALB; MUR-SCHWALB; BERG-SCHWALB; MUR-SPYR; MUNSTER-SPYR. *Gesn. Aldrov.* WYSSER-SPYR. *Gesn.*

Les Suédois, HUS-SWALA. *Linn.*

Les Anglois, MARTIN. *Willugh. Raj. Alb.* MARTLET. *Willugh. Raj. Charlet. Alb.* ROUGH-FOOTED SWALLOW. *Charlet.*

Les Anglois de la Jamaïque, HOUSE-SWALLOW. *Browne.*

Præcedenti crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & totidem lineas explet, & ad extremos ungues quatuor pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex lineas longum est; cauda duos pollices; pes quinque cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus reliquis omnibus longitudine cedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, partem colli superiorem & dor-

Elle n'est pas si grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces cinq lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six lignes de long; sa queue deux pouces; son pied cinq lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Elle a dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un noir-bleu éclatant. Toutes les plumes, excepté les scapulai-

res, sont cependant blanches à leur origine, mais cette couleur ne paroît pas lorsque les plumes sont couchées les unes sur les autres. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les jambes, le croupion & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc de neige, excepté les plus grandes couvertures du dessus de la queue, qui sont d'un noir-bleu éclatant. Les côtés sont d'un blanc tirant sur le cendré. Les couvertures du dessous de l'aîle sont cendrées, excepté les plus petites, vers le bord de l'aîle, qui sont brunes & terminées de blanc. Celles du dessus de l'aîle sont d'un noirâtre mêlé d'un lustre de noir-bleu. Les plumes des aîles sont tout-à-fait noirâtres : les moyennes sont échancrées en cœur par le bout. La queue est composée de douze plumes pareillement noirâtres ; mais cette couleur brille d'un lustre de noir-bleu sur les deux côtés des deux plumes du milieu, & sur le côté extérieur seulement des latérales. La queue est peu fourchue, sa plume la plus extérieure de chaque côté n'excédant les deux du milieu que de la longueur de six lignes. L'iris des yeux est d'une couleur de noisette. Le dedans de la bou-

sum vestiunt pennæ splendide nigro-cœrulescentes. Scapulares concolores. Quæ tamen omnes pennæ, scapularibus tantum exceptis, sunt in exortu albæ ; albedo autem, dum pennæ aliæ aliis incumbunt, nullo modo apparet. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, crura, uropygium & rectrices caudæ superiores & inferiores niveo imbuuntur colore ; at tamen excipiendæ sunt superiores caudæ rectrices maximæ, splendide nigro-cœrulescentes. Latera ex albo ad cinereum inclinant. Pennæ alas subtus cooperientes sunt cineræ, exceptis tamen minimis, versùs alarum margines sitis, quæ fuscæ sunt ; alboque terminatæ. Rectrices alarum superiores nigricantes, cum aliqua nigro-cœrulescentis mixtura. Remiges penitus nigricantes : minores sunt apice cordatim emarginatæ. Cauda duodecim constat rectricibus similiter nigricantibus ; qui tamen color nigricans in utroque latere duarum rectricum intermediarum, & in latere exteriori tantum lateralium nigro-cœrulescente refulget. Cauda est parum bifurca ; rectrix enim utrin-

que extima binas intermedias sex tantum linearum longitudine superat. Oculorum irides avellaneæ. Os intus flavet. Rostrum nigrum est. Pedes albi, & ad exortum usque unguium lanugine nivis instar candidâ obfiti. Ungues quoque albescent. Ut præcedens, *Muscis*, aliisque *Insectis* victitat. Sub fenestris & tectorum subgrundiis nidum construit; qui nidus est superne tectus, rotundo tantum ad latus foramine relicto, per quod ipsa intrat & exit. *Ex museo Realmuriano.*

che est jaune. Le bec est noir. Les pieds sont blancs, & couverts jusqu'à l'origine des ongles d'un duvet blanc comme de la neige. Les ongles sont blancs. Elle se nourrit, comme la précédente, de *Mouches* & autres *Insectes*. Elle fait son nid sous les fenêtres & les entablemens des toits. Ce nid est couvert par-dessus; elle y laisse seulement sur le côté un trou rond, qui lui en permet l'entrée & la sortie. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 3. L'HIRONDELLE DE S. DOMINGUE.

Hirundo ex nigro ad chalybis politi colorem vergens; ventre albo; rectricibus nigricantibus.... *HIRUNDO DOMINICENSIS.*

Hirundo cantu Alaudam referens. *Klein. Avi. pag. 83. N°. 5.*

Hirondelle ou Hirundo cantu Alaudam referens. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag. 267. (ed. 1725).*

Crassitie *Hirundinem domesticam* circiter adæquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices explet, & ad extremos ungues quinque pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo lineas longum est; cauda duos pollices & novem lineas; pes

Elle est à peu près de la grosseur de l'*Hirondelle de cheminée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long; sa queue deux pouces neuf lignes; son pied six lignes; &

celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, huit lignes & demie : les latéraux sont beaucoup plus courts ; & celui de derrière est de la même longueur que l'extérieur de ceux de devant. Elle a quatorze pouces deux lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue, les petites couvertures du dessus & du dessous des aîles, la poitrine, les côtés & les jambes sont d'un noir, qui tire sur la couleur d'acier poli. Le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les grandes couvertures du dessus & du dessous des aîles, & les plumes des aîles sont noirâtres. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Elle n'est pas beaucoup fourchue ; car sa plume la plus extérieure de chaque côté n'est plus longue que les deux du milieu que de neuf lignes. Le bec, les pieds & les ongles sont bruns. Le *P. Feuillée* dit qu'elle imite le chant de l'*Alouette*. On la trouve à *S. Domingue*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

sex lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue octo cum semi lineas : laterales multò sunt breviores ; posticus autem cum anticorum extimo longitudine convenit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & duarum linearum ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput , guttur , collum , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , quæ caudam superne obtegunt , minores alarum rectrices superiores & inferiores , pectus , latera & crura ex nigro ad chalybis politi colorem vergunt. Venter & rectrices caudæ inferiores albescent. Majores alarum rectrices superiores & inferiores , sicut & remiges , nigricant. Caudam componunt duodecim rectrices concolores. Cauda parùm est bifurca ; rectrix enim utrinque extrema binas intermedias novem tantùm linearum longitudine excedit. Rostrum , pedes , unguesque fusci. Secundùm *P. Feuillée* cantu *Alaudam* æmulatur. Habitat in *Dominicensi Insula* , unde in museum *Realmurianum* missa à *D. Chervain*.

* * 4. L'HIRONDELLE DE CAYENNE.

Voyez Pl. XLVI. fig. 1.

*Hirundo superne ex nigro ad chalybis polito colore vergens ;
infernè griseo-fusca ; rectricibus nigris HIRUNDO
CAYANENSIS.*

*Hirundo Americana aterrima corpore subrotundo. Barr. Ornith. Class.
III. Gen. VIII. sp. 5.*

Hirundo vulgaris. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 134.

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices æquat, & ad extremos ungues quatuor pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos novem cum semi lineas longum est ; cauda duos pollices cum sex lineis ; pes quinque lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Alis expansis , extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tres circiter lineas ultra caudam extremam protenduntur. In toto corpore superiore , partibus scilicet capitis & colli superioribus , dorso , uropygio , tectricibus alarum superio-

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes & demie de long ; sa queue deux pouces six lignes ; son pied cinq lignes ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , sept lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Elle a quatorze pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , passent le bout de la queue d'environ trois lignes. Tout le dessus du corps , sçavoir les parties supérieures de la tête & du col , le dos , le croupion , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue , est d'un noir qui tire sur la couleur d'acier poli. Tout

le dessus du corps, sçavoir la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de l'aile & celles du dessous de la queue, est d'un gris-brun. Les plumes des ailes sont noires. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Elle est peu fourchue, sa plume la plus extérieure de chaque côté n'étant plus longue que les deux du milieu que de six lignes. Le bec, les pieds & les ongles sont bruns. On la trouve à *Cayenne*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Veron*.

Cayana, unde in *museum Reaumurianum* missa à *D. Veron*.

* * 5. L'HIRONDELLE DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XLV. Fig. 1.

Hirundo superne splendide nigra, ad chalybis politi colorem vergens, inferne rufa; collo & uropygio rufis; rectricibus nigris *HIRUNDO SENEGALENSIS*.

Elle est un peu plus grosse que notre *Hirondelle de cheminée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bou-

ribus & pennis caudam superne tegentibus, ex nigro ad chalybis politi colorem vergit. Per universum corpus inferius, guttur scilicet, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crura, rectrices alarum inferiores & pennas caudam subtus cooperientes, ex griseo fuscescit. Alarum remiges nigrae sunt. Duodecim rectricibus concoloribus cauda constat. Non multum autem est bifurca; rectrix enim utrinque extrema sex tantum lineis duarum intermediarum longitudinem antecellit. Rostrum, pedes, unguesque fusi. Habitat in

Crassitie *Hirundinem domesticam nostratem* paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas aequat, & ad extremos ungues, sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad

ad oris angulos octo lineas longum est; cauda quatuor pollices; pes octo lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet: laterales paulò sunt breviores; posticus autem lateralium longitudinem excedit. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Capitis superior pars, dorsum, pennæ scapulares, alarumque rectrices superiores sunt splendide nigræ, ad chalybis politum colorem vergentes. Collum, pectus, venter, latera, crura, uropygium & rectrices caudæ superiores & inferiores rufæ. Guttur & pennæ alas subtus tegentes ex albo ad rufum inclinant. Alarum remiges nigræ. Caudam componunt duodecim rectrices concolores. Caudam autem habet hæc Avis maximè bifurcam; rectrix enim utrinque extima binas intermedias duorum pollicum & totidem linearum longitudine antecellit. Rostrum, pedes, unguisque nigri. Habitat in

Tome II.

che a huit lignes de long; sa queue quatre pouces; son pied huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, est de la même longueur: les latéraux sont un peu plus courts: & celui de derrière est un peu plus long que ces derniers. Elle a quinze pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête, le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un noir brillant & changeant en couleur d'acier poli. Le col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, le croupion & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont rousses. La gorge & les couvertures du dessous de l'aîle sont d'un blanc tirant sur le roux. Les plumes des aîles sont noires. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Elle est très-fourchue, sa plume la plus extérieure de chaque côté étant plus longue de deux pouces deux lignes que les deux du milieu. Le bec, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de*

R r r

Reaumur par M. Adanson.

*Senegalensi regione, unde in
museum Realmurianum missa
à D. Adanson.*

6. L'HIRONDELLE DU PÉROU.

Hirundo superne splendide nigra, infernè cinerea; rectricibus
obscurè cinereis, marginibus griseo-flavicantibus . . .
HIRUNDO PERUVIANA.

Hirondelle ou Hirundo minima Peruviana, caudâ bicorni. *Feuillée
Journ. des Obs. phys. pag. 33. (ed. 1725.)*

Elle est beaucoup plus petite
que *nos Hirondelles d'Europe*;
& a le bec extrêmement court.
La tête, la partie supérieure du
col, le dos, le croupion, les
plumes scapulaires, les couver-
tures du dessus des aîles & cel-
les du dessus de la queue sont
d'un noir brillant. La gorge, la
partie inférieure du col, la poi-
trine, le ventre, les côtés, les
jambes, les couvertures du des-
sous de la queue & celles du
dessous des aîles sont cen-
drées. Les plumes des aîles &
celles de la queue sont d'un
cendré obscur, & bordées de
gris-jaunâtre. Les yeux sont
noirs & entourés d'un cercle
brun. On la trouve au *Pérou*.

Craffitie *Hirundinibus
Europæis* multò cedit; &
rostro donatur brevissimo.
Caput, partem colli supe-
riorem, dorsum & uropy-
gium vestiunt pennæ splen-
didè nigrae. Scapulares, quæ
alas superne cooperiunt, &
tectrices caudæ superiores
eodem imbuuntur colore.
Guttur, pars colli inferior,
pectus, venter, latera, cru-
ra, tectrices caudæ inferio-
res & pennæ alas subtus te-
gentes sunt cinerae. Alarum
remiges, sicut & rectrices,
obscurè cinerae, marginibus
griseo-flavicantibus præditæ.
Oculos nigros fuscus ambit
circulus. Habitat in *Peruvio*.

7. LA GRANDE HIRONDELLE DU PÉROU.

Hirundo superne nigra, infernè nivea; capite & collo dilutè
griseis; taniâ transversâ in medio ventre dilutè cinereâ; rec-
tricibus dilutè cinereis, marginibus griseo-flavicantibus.
. . . . HIRUNDO PERUVIANA MAJOR.

Autre Hirondelle ou *Hirundo maxima Peruviana*, *Avis prædatoris calcaribus instructa. Feuillée Journ. des Obs. phys. pag. 33. (ed. 1725).*

Præcedentem crassitie multum antecellit. Rostro donatur & pedibus brevissimis. Caput, guttur & collum pennis vestiuntur dilutè griseis. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & rectrices caudæ superiores sunt nigræ. Pectus, venter, latera, crura, & rectrices caudæ inferiores niveo imbuuntur colore; attamen in medio ventre tænia extat transversa, dilutè cinerea. Rectrices alarum superiores sunt quoque dilutè cinereæ. Remiges superne concolores, infernè griseo-viridescens, omnes marginibus griseo-flavicantibus præditæ. Rectrices eodem tinguntur cinereo diluto, & marginibus pariter donantur griseo-flavicantibus. Rostrium, unguisque nigri. Habitat in *Peruvio*.

Elle est beaucoup plus grande que la précédente. Son bec & ses pieds sont extrêmement courts. La tête, la gorge & le col sont d'un gris clair. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont noires. La poitrine, le ventre, les côtes, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc de neige; il y a cependant sur le milieu du ventre une bande transversale, d'un cendré clair. Les couvertures du dessus des ailes sont de cette dernière couleur. Les plumes des ailes sont d'un cendré clair en-dessus, d'un gris-verdâtre en-dessous, & toutes sont bordées d'un gris-jaunâtre. Les plumes de la queue sont du même cendré clair, bordées pareillement de gris-jaunâtre. Le bec & les ongles sont noirs. On la trouve au *Pérou*.

* * 8. L'HIRONDELLE DE LA MARTINIQUE.

Voyez Pl. XLV. Fig. 2.

Hirundo superne nigra, infernè obscurè fusca; gutture griseo-fusco; rectricibus nigris, mucronatis . . . HIRUNDO MARTINICANA.

Regulum crassitie non superat. Ipsius longitudo ab

Elle n'est pas plus grosse qu'un *Roitelet*. Sa longueur de
R r i j

puis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de quatre lignes; sa queue d'un pouce huit lignes; son pied de quatre lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de quatre lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de tous. Elle a huit pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à huit lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures des aîles sont noires. La gorge est d'un gris-brun. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un brun obscur. Les plumes des aîles sont noires. La queue est composée de douze plumes de la même couleur, & qui sont toutes terminées par une petite pointe très-déliée. Le bec est noir. Les pieds sont bruns; & les ongles blanchâtres. On la trouve à la *Martini-que* d'où elle a été envoyée à M.

apice rostri ad caudam extremam tres pollices & octo lineas aequat, & ad extremos ungues duos pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuor lineas longum est; cauda unum pollicem & octo lineas; pes quatuor lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Alis expansis, extremitates majorum remigum octo pollicum & totidem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad octo linearum distantiam ultra caudæ extremitatem protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alarumque rectrices sunt nigræ. Guttur ex griseo fuscescit. Collum inferius, pectus, venter, latera & crura pennis vestiuntur obscurè fuscis. Rectrices caudæ superiores & inferiores eodem imbuuntur colore. Alarum remiges nigræ. Caudam componunt duodecim rectrices concolores, omnes exiguo mucrone gracillimo terminatæ. Rostrum nigrum. Pedes fusc.

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre VIII.* 501
 ci; unguēs verò candicantes. *de Reaumur par M. Thibault de*
Habitat in Martinica, unde Chanvalon.
in musæum Realmurianum
missa à D. Thibault de Chan-
valon.

9. L'HIRONDELLE DE LA CAROLINE.

Hirundo fusca, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; gutture
albicante; rectricibus fuscis, mucronatis HIRUNDO
CAROLINENSIS.

Hirundo caudâ vel sexies divisâ. Klein. Avi. pag. 84. N° 6.

Hirondelle d'Amérique. Catesb. Append. pag. 8; avec une figure assez
exacte Pl. 8.

Hirundini vulgari crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & tres circiter lineas æquat, & ad extremos unguēs tres pollices & decem lineas. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque quinque lineas longum est; cauda unum pollicem cum sex lineis; pes quinque lineas; & trium digitorum anticorum mediùs cum ungue sex lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus omnium brevissimùs. Alæ complicatæ ad trium linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt,

Elle est plus petite que l'*Hirondelle ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quatre pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq lignes de long; sa queue un pouce six lignes; son pied cinq lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des

aîles & celles du dessus de la queue sont brunes. Tout le dessous du corps, sçavoir la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles, est de la même couleur, mais plus claire. La gorge est blanchâtre. Les plumes des aîles sont brunes. Celles de la queue sont d'un brun plus clair, & toutes terminées par une pointe très-déliée. Le bec, les pieds & les ongles sont bruns. Elle fait son nid dans les cheminées. On la trouve pendant l'été en *Virginie*, & à la *Caroline*.

& superiores caudæ rectrices sunt fuscae. Per universum corpus inferius, partem scilicet colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crura, rectrices caudæ inferiores & penas alas subtus obtegentes, eodem imbuuntur colore, sed dilutius. Guttur candicat. Remiges fuscae sunt. Rectrices fusco dilutius tinguntur, omnesque in mucronem gracillimum desinunt. Rostrum, pedes, unguesque fusci. In caminis nidum construit. Habitat æstate in *Virginia* & *Carolina*.

* * 10. L'HIRONDELLE D'AMÉRIQUE.

Voyez Pl. XLV. Fig. 3.

Hirundo superne fusca, infernè griseo-fusca; ventre albo; rectricibus fusco-nigricantibus . . . *HIRUNDO AMERICANA*.

Hirundo Americana, Brasiliensibus Tapera dicta. Sloane. Voy. of Jamaica. pag. 312. N°. LI.

Raj. Syn. Avi. pag. 72. N°. 5.

Hirundo Americana, Brasiliensibus Tapera dicta, Andorinha Lusitanis Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 157.

Hirundo Americana Tapera dicta, Raji. Klein. Avi. pag. 83. N°. IV. 1.

Tapera Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 205.

Jonst. Avi. pag. 140.

Tapera Brasiliensibus Marcgravii. Raj. Syn. Avi. pag. 185. N°. 32.

Héronnelle. Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 259.

Les Portugais l'appellent ANDORINHA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Les Anglois de la Jamaïque, SWALLOW. Sloane.

Les Brasiliens, TAPERA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Sloane.

Hirundinem domesticam nostratam crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & novem lineas æquat, & ad extremos unguis quatuor pollices cum octo lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo lineas longum est; cauda duos pollices & tres lineas; pes sex lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus adhuc brevior. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra caudæ extremitatem protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium & rectrices alarum fuscæ sunt. Guttur, collum inferius, pectus, latera & crura penis vestiuntur griseo-fuscis. Venter, inferioresque caudæ rectrices albent. Remiges majores sunt fusco-nigricantes: minores verò fuscæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus majoribus concolores. Cauda autem est minimè bifurca; rectrix enim utrinque extima

Elle est à peu près de la grosseur de notre *Hirondelle de cheminée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long; sa queue deux pouces trois lignes; son pied six lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Elle a douze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, & les couvertures des aîles sont brunes. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, les côtés & les jambes sont d'un gris-brun. Le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les grandes plumes des aîles sont d'un brun-noirâtre: les moyennes sont brunes. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les grandes de l'aîle. Elle est très-peu fourchue; car sa plume la plus extérieure de chaque côté n'excède

la longueur des deux du milieu que de trois ou quatre lignes. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. On la trouve en *Amérique*. Elle a été envoyée de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

binas intermedias trium quatuorve linearum tantum longitudine superat. Rostrum nigrum. Pedes, unguisque fuscii. Habitat in *America*. A *Cayana* in museum *Reaumurianum* missa est à *D. Artur*.

II. LA GRANDE HIRONDELLE D'ESPAGNE.

*Hirundo superne obscurè fusca, internè alba; lateribus fuscis maculis variegatis; torque fusco, nigris maculis vario; re-
trixibus superne obscurè fuscis, internè cinereo-fuscis; pe-
dibus ad digitos usque lanuginosis . . . HIRUNDO MAJOR
HISPANICA.*

*Hirundo maxima Freti Herculei. Klein. Avi. pag. 83. N°. IV. 2.
Grand Martin, ou Hironnelle. Edwards. Tom. I. pag. XXVII; avec
une figure exacte Pl. 27.*

Elle est deux fois plus grosse que *notre Martinet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes & demie de long; sa queue deux pouces huit lignes; son pied six lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, sept lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quatorze lignes au-

Hirundinem Apodem nostratam doublâ magnitude vincit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & novem circiter lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo cum semi lineas longum est; cauda duos pollices cum octo lineis; pes sex lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue septem cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus reliquis omnibus longitudine cedit. Alæ complicatæ ad quatuordecim

quatuordecim linearum distantiam ultra caudæ exortum protenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, scapulares, superiores alarum rectrices & caudam superne tegentes pennæ fusco tinguntur obscuro, in dorso tamen & uropygio nonnihil dilutior. Guttur, partem colli inferiorem, pectus & ventrem supremum vestiunt pennæ albæ. Latera quoque candida, maculis fuscis variegata; quædam enim ex pennis illa cooperientibus fusco terminantur. Supra pectus tænia extat transversa, fusca, maculis nigris varia, torquem quodammodo efficiens. Venter imus, crura, inferioresque caudæ rectrices ex sordidè albo ad fuscum inclinant. Alas subtus cooperientes pennæ ex cinereo fuscescunt. Remiges omnes sunt infernè cinereo-fuscæ, superne verò minores eodem ac dorsum colore tinguntur, & majores colore imbuuntur nonnihil saturatior. Rectrices superne obscurè fuscæ, infernè cinereo-fuscæ. Cauda est parùm bifurca; rectrix enim utrinque extrema binas intermedias non nisi septem cum semi lineas.

delà de l'origine de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun sombre, un peu plus clair cependant sur le dos & le croupion. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine & le haut du ventre sont blancs. Les côtés sont de la même couleur & variés de taches brunes, quelques-unes des plumes étant terminées de cette couleur. Au-dessus de la poitrine est une bande transversale, brune, variée de taches noires, & qui forme une espèce de collier. Le bas-ventre, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale & tirant sur le brun. Celles du dessous des aîles sont d'un cendré-brun. Toutes les plumes des aîles sont en-dessous de cette dernière couleur, & en-dessus les moyennes sont de la même couleur que le dos, & les grandes sont d'une couleur un peu plus foncée. Les plumes de la queue sont en-dessus d'un brun obscur, & en-dessous d'un cendré-brun. La queue est peu fourchue, sa plume la plus extérieure de chaque côté n'excédant les deux du milieu que de sept lignes & demie. Le bec est

noir. Les pieds sont couverts jusqu'à l'origine des doigts d'un duvet gris-brun : les doigts & les ongles sont noirs. On la trouve en *Espagne*, & sur-tout aux environs de *Gibraltar*.

rum longitudine antecellit. Rostrum nigrum. Pedes griseo-fuscâ lanugine ad exortum usque digitorum obsiti sunt : digiti, unguesque nigri. Habitat in *Hispania*, præsertim circa *Gibraltariam*.

** 12. L'HIRONDELLE DE RIVAGE.

Hirundo superne cinereo-fusca, infernè alba; pectore cinereo-fusco; rectricibus fuscis; pedibus posticè ad digitos usque lanuginosis HIRUNDO RIPARIA; SIVE DREPANIS.

Hirundo cinerea, gulâ abdomineque albis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 247.

Hirundo brevicauda, nigricans, uropygio albo. *Barr. Ornith. Class. III.*

Gen. VIII. sp. 3.

Hirundo silvestris, vel *riparia*; *Ripariola*; *Drepanis*. *Gesn. icon. Avi. pag.* 97, in qua hujus icon non satis accurata.

Hirundo riparia; *Drepanis*. *Gesn. Avi. pag.* 565, in qua eadem icon.

Hirundo riparia; *Drepanis*; *Facula*. *Charlet. Exer. pag.* 96. *N°.* 2.

Charlet. Onomast. pag. 90. *N°.* 2.

Hirundo riparia. *Jonst. Avi. pag.* 84. hujus icon à *Gesnero mutuata Tab.* 42.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.

Frisch. hujus icon accurata Tab. 18.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 84. *sp.* 4.

Hirundo riparia, sive *tertia*. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 288.

Hirundo riparia Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 156. hujus icon ab *Aldrovando mutuata Tab. XXXIX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 71. *N°.* A. 3.

Hirundo riparia Schwenckfeldii, *Aldrovandi*. *Klein. Avi. pag.* 83. *N°.* 3.

Hirundo riparia; *Ripariola*; *Hirundo minima*. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 283.

Hirundo tertia. *Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag.* 385.

Drepanis, sive *Riparia*. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 694. *maris & fæminæ icones pessimæ pag.* 695.

Espece d'Hirondelle de rivage. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag.* 379.

Martinet de rivage. *Alb. Tom. II. pag.* 36; avec une figure mal coloriée *Pl.* 56. *Fig. b.*

Les Grecs l'appellent *Δρεπανίς*. *Bel. Aldrov. Schwenck. Χελιδων θαλαττία. Schwenck.*

Les Catalans, FALSILLA. Barr.

Les Oïseleurs & les Paysans de Valence en Espagne, PAPILION DI MONTAGNA. Willugh.

Les Boulonnois, DARDANELLO. Aldrov.

Les Allemands, FEEL-SCHWALM; RYN-SCHWALME. *Gesn.* WASSER-SCHWALME. *Gesn.* Schwenck. RYN-SCHWALBE; WASSER-SCHWALBE. Aldrov. REIN-SCHWALBE. Schwenck. UBER-SCHWALBE. *Gesn.* Aldrov. UFER-SCHWALBE. Schwenck. Frisch. SAND-SCHWALBE. Rzac. ERD-SCHWALBE. Frisch.

Les Allemands aux environs de Strasbourg, RHYN-VOEGELE. *Gesn.* Aldrov.

Les Polonois, GRZÉBIÉLUCHA. Rzac.

Les Suédois, STRAND-SWALA; BACK-SWALA. Linn.

Les Anglois, SAND-MARTIN. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb. BANCK-MARTIN. Willugh. Alb. BANCK-MARTEN, ou WESTERN. Charlet. SHORE-BIRD. Willugh. Raj. Sibbald.

Hirundini rusticæ crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuor pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues tres pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quinque lineas longum; cauda duos pollices cum tribus lineis; pes quinque lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex cum semi lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus omnium brevissimus. Alis expansis, extremitates majorum remigum undecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad quinque linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uro-

Elle n'est pas si grosse que la *petite Hironnelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq lignes de longueur; sa queue deux pouces trois lignes; son pied cinq lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes & demie: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de tous. Elle a onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à cinq lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus

des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un cendré-brun. La poitrine est de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, le ventre, les côtés, les jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Celles du dessous des aîles sont d'un cendré plus clair que celles du dessus. Les plumes des aîles sont brunes : les moyennes sont échancrées en cœur par le bout. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles des aîles : la plus extérieure de chaque côté est plus longue de huit lignes que les deux du milieu. Le bec est noirâtre. Les pieds & les ongles sont gris-bruns. La partie postérieure du pied est couverte depuis le talon jusqu'à l'origine des doigts d'un duvet de la même couleur. Elle fait son nid dans les trous qui se trouvent sur les bords de la mer & des rivières. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

pygium, scapulares, superiores alarum rectrices & caudam superne tegentes pennæ sunt cinereo-fuscæ. Pectus eodem imbuitur colore. Guttur, pars colli inferior, venter, latera, crura & rectrices caudæ inferiores albescent. Pennæ alas subtus cooperientes cinereo tinguntur dilutius quàm superiores alarum rectrices. Remiges sunt fuscæ : minores apice cordatim emarginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores : rectrix autem utrinque extrema binas intermedias octo linearum longitudine excedit. Rostrum nigricans. Pedes, unguesque griseo-fusci. Pedes autem posticè, à calcaneo ad exortum usque digitorum, concolore lanugine obsiti sunt. In foraminibus ad ripas maris & fluminum apertis nidificat. *Ex museo Kealmuriano.*

* * 13. L'HIRONDELLE DE RIVAGE DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. XLV. Fig. 4.

Hirundo in toto corpore cinereo-fusca ; summo capite colore saturatiore tincto ; remigibus majoribus saturatè cinereo-fuscis ; rectricibus cinereo-fuscis HIRUNDO RIPARIA SENEGALENSIS.

Hirundo marina indigena. *Seb. Vol. I. pag. 102. hujus icon minimè accurata Tab. LXVI. Fig. 4.*

Regulo crassitie cedit, aut saltem eum non antecellit. Ipsi-
us longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem quinque pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues tres pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos sex lineas longum est; cauda duos pollices cum decem lineis; pes tres lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus reliquis omnibus longitudine cedit. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum & duarum linearum; alæ verò complicatæ ad quatuor linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Universum corpus vestiunt pennæ griseo-fusco imbutæ colore, in summo tamen capite saturatiore. Alarum remiges majores griseo-fusco saturato quoque tinguntur: minores sunt dorso concolores. Duodecim rectricibus similiter griseo-fuscis cauda constat. Hæc est autem maximè bifurca; rectrix enim utrinque extima binas intermedias

Elle est tout au plus aussi grosse qu'un *Roitelet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de six lignes; sa queue de deux pouces dix lignes; son pied de trois lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de quatre lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière l'est encore davantage. Elle a onze pouces deux lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quatre lignes au-delà du bout de la queue. Elle est par tout le corps d'un gris-brun plus foncé par-dessus la tête qu'ailleurs. Les grandes plumes des aîles sont aussi de ce gris-brun foncé: les moyennes sont de la même couleur que le dos. La queue est composée de douze plumes, qui sont pareillement d'un gris-brun. Elle est très-fourchue, sa plume la plus extérieure de chaque côté étant plus longue de dix-huit lignes que les deux du milieu. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. *Seba* dit qu'elle a

une forte odeur d'Ambre : je ne m'en suis pas apperçu. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

octodecim linearum longitudine superat. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque fusci. Secundum *Sebam* *Ambra* griseam maximè redollet : in ea nunquam mihi in-

notuit hic odor. Habitat in *Senegalesi* regione, unde in *musæum Reaumurianum* missa à *D. Adanson*.

114. L'HIRONDELLE DE RIVAGE DE LA COCHINCHINE.

Voyez Pl. XLVI. Fig. 2. A.

Hirundo superne nigricans, internè albida; rectricibus nigricantibus, apice albis *HIRUNDO RIPARIA COCHINSINENSIS*.

Hirundo nido eduli. Bont. Ind. Ori. pag. 66.

Hirundo Sinensis; nido eduli Bontii. Willugh. Ornith. pag. 157.

Raj. Syn. Avi. pag. 72. N°. 6.

Hirundo Sinensis, nido eduli Bontii, Raji. Klein. Avi. pag. 84. N°. 7.

Je n'ai jamais vu cette espèce. Je l'ai décrite & fait graver avec son nid d'après un dessin fait dans le pays sur l'Animal vivant par *M. Poivre*. Elle est beaucoup plus petite que *notre Roitelet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pouces seulement. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux lignes & demie de long; sa queue dix lignes; son pied deux lignes & demie; & celui du milieu des trois doigts anté-

Speciem istam nondum novi. Ex icone à *D. Poivre* ad vivum depicta eam descripsi; & simul cum nido æri insculptam esse curavi. *Regulo nostri* multum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pollices & tres circiter lineas explet, & ad extremos ungues duos tantum pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duas cum semi lineas longum est; cauda decem lineas; pes duas cum semi lineas; & trium digitorum anticorum medius

cum ungue tres lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Alæ complicatæ ad quartam tantum longitudinis caudæ partem extenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, & superiores caudæ rectrices nigricant. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera & crura penis vestiuntur albidis. Inferiores caudæ rectrices concolores. Alarum remiges idem ac dorsum tingit color. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, in apicem album desinentes. Cauda autem non est parùm bifurca; rectrix enim utrinque extrema tribus lineis duarum intermediarum longitudinem excedit. Oculorum irides flavæ. Rostrum nigrum. Pedes, unguisque fusci. In scopulis ad littora maris nidificat. Ex spuma maris, basim scopulorum alluentis, quamdam colligit materiam, substantiâ *ichthyocollam* referentem, ex qua nidum construit. *Sinæ* hos nidos in summas habent delicias, eosque avidè devorant, & of-

rieurs, joint avec l'ongle, trois lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent que jusqu'au quart de la longueur de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont noirâtres. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, les jambes, & les couvertures du dessous de la queue sont blanchâtres. Les plumes des aîles sont de la même couleur que le dos. La queue est composée de douze plumes noirâtres & terminées de blanc. Elle est assez fourchue, sa plume la plus extérieure de chaque côté étant plus longue de trois lignes que les deux du milieu. L'iris des yeux est jaune. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont bruns. Elle fait son nid sur les rochers des bords de la mer. Ce nid est composé d'une espece d'écume de mer, qu'elle ramasse au pied des rochers, que la mer arrose, & qui ressemble beaucoup à de la *Colle de Poisson*. Les *Chinois* sont très-friands de ces sortes de nids; & ils les préfèrent dans leurs ra-

gouts aux huitres , aux champignons & autres assaisonnemens. treis , fungis & cæteris gulæ irritamentis longè antepo-
On la trouve à la *Cochinchine*. nunt. Habitat in *Cochinsina*.

* * 15. LE MARTINET.

Hirundo nigricans ; gutture albicante ; rectricibus superne nigricantibus , infernè saturatè cinereis *HIRUNDO APOS*.

Hirundo nigra tota , gulâ albicante. *Faun. Suec. Linn. N°.* 246.

Hirundo nigra media , collario albo. *Browne. Nat. Hist. of Jamaica. pag.* 467.

Hirundo tota cœrulescens minima. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. VIII. sp.* 4.

Hirundo quarta. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 289.

Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 385.

Hirundo Apus. *Willugh. Ornith. pag.* 156. *hujus icon satis accurata Tab. XIV ; & insuper altera icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXIX. Raj. Syn. Avi. pag.* 72. *N°.* A. 4.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 17.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 84. sp. 3.

Hirundo Apos major. *Charlet. Exer. pag.* 96. *N°.* 3.

Charlet. Onomazt. pag. 90. *N°.* 3.

Hirundo muraria , seu *saxatilis* ; *Apus*. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 283.

Hirundo muraria , *saxatilis* , sive *speluncaris* *Schwenckfeldii*. *Klein. Avi. pag.* 83. *N°.* 4.

Cypselus ; *Apus*. *Gesn. icon. Avi. pag.* 51 , *in qua hujus icon non satis accurata.*

Cypselus , sive *Apus* ; *Turnero* *Hirundo templorum*. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 279.

Apus. *Gesn. Avi. pag.* 166 , *in qua hujus icon non satis accurata.*

Frisch. hujus icon accuratissima Tab. 17.

Apos. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 698. *hujus icon pessima pag.* 699.

Jonst. Avi. pag. 84. *hujus icon à Gesnero mutuata Tab.* 42.

Martinet. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag.* 150.

Martinet noir. *Alb. Tom. II. pag.* 35 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 55.

Martinet grand ; *Hirondelle grande* ; *Martelet* ; *Moutardier*. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 99 a , *dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Grande Hirondelle ; *Moutardier* ; *Grand Martinet*. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag.* 376 ; *avec la même figure pag.* 377.

Les Grecs l'appellent *Αἴψος*. *Bel. Aldrov. Αἴψος*. *Bel. Schwenck. Κυψέλλος*. *Bel. Κυψέλλος*. *Schwenck. Κυψέλλος*. *Charlet. Κυψέλλον*. *Aldrov.*

Les

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre VIII.*

513

Les Espagnols, VENCÉIO. *Gesn. Aldrov.* ARREXAQUO. *Gesn.* ARREAQUO. *Aldrov.*

Les Catalans, PASSERA SOLITARIA ; PAVIOTA. *Barr.*

Les Italiens, DARDANO. *Bel. Gesn. Aldrov.* DINI. *Bel.* BIVI. *Gesn.*

Les Boulonnois, RONDONE. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Genoïs, BARBAROTTE. *Aldrov.*

Les Allemands, SPYR-SCHWALB. *Gesn. Aldrov.* SPYR-SCHWALBE ; MAVER-SCHWALBE. *Schwenck.* CHAWER-SCHWALBE ; KIRCHEN-SCHWALBE. *Rzac.* GROSTE-SCHWALBE. *Frisch.*

Les Suisses, SPYR ; MUR-SPYR ; GER-SCHWALB ; GEYR-SCHWALB. *Gesn. Aldrov.* GEYER-SCHWALBE. *Schwenck.*

Les Hollandois, STEEN-SWALEM. *Aldrov.*

Les Illyriens, RORAYG ou ROREICK. *Gesn.*

Les Polonois, JÉRZYK. *Rzac.*

Les Suédois, RING-SWALA. *Linn.*

Les Anglois, SWIFT. *Willugh. Raj. Charlet. Alb.* BLACK-MARTIN. *Willugh. Raj. Sibbald.* HORSE-MARTEN. *Charlet.* GREAT-SWALLOW. *Aldrov.*

Les Anglois de la Jamaïque, MARTIN-SWALLOW. *Browne.*

Les Mariniers du Cap de Bonne Espérance, HIRONDELLE DE MER. *Kolbe.*

Crassitie Hirundinem domesticam paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & decem lineas æquat, & ad extremos ungues quinque pollices cum lineis binis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos octo lineas longum est ; cauda duos pollices & decem lineas ; pes quatuor cum semi lineas ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex cum semi lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus omnium brevissimus. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuordecim pollicum & sex

Tome II.

Il est un peu plus gros que l'*Hirondelle de cheminée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit lignes de long ; sa queue deux pouces dix lignes ; son pied quatre lignes & demie ; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, six lignes & demie : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Il a quatorze pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à

T t t

neuf lignes au-delà du bout de la queue. Tout son corps est couvert de plumes noirâtres, excepté les couvertures du dessous de la queue, qui sont d'une couleur plus claire, & la gorge, qui est blanchâtre. Les plumes des aîles sont noirâtres en-dessus, & d'un cendré foncé en-dessous. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Elle est assez fourchue; car sa plume la plus extérieure de chaque côté est plus longue que les deux du milieu de treize lignes. Les yeux sont grands; leur iris est d'une couleur de noisette. Le bec est noir. Les narines sont longues, placées obliquement, obtuses vers la tête & pointues vers le bout du bec. Les pieds & les ongles sont noirâtres. Il se nourrit d'*Insectes*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad novem linearum distantiam ultra caudam extremam protrahuntur. Per universum corpus pennis vestitur nigricantibus, si tamen excipias inferiores caudæ tectrices colore dilutioribus imbutas, & guttur, quod candicat. Alarum remiges sunt superne nigricantes, infernè saturatè cinereæ. Duodecim rectricibus concoloribus cauda constat. Hæc autem non est parùm bifurca; rectrix enim utrinque extrema binas intermedias tredecim linearum longitudine superat. Oculi grandes; ipsorum irides avellaneæ. Rostrum nigrum. Nares longæ, obliquè positæ, versùs caput obtusæ, versùs apicem rostri acutæ. Pedes, unguesque nigricantes. *Insectis* victitat. *Ex museo Reaumuriano.*

** 16. LE MARTINET DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. XLVI. Fig. 3.

Hirundo in toto corpore nigricans; rectricibus superne & infernè nigricantibus HIRUNDO APOS DOMINICENSIS.

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pou-

Præcedenti nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & de-

cem lineas explet, & ad extremos ungues quatuor pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos sex lineas longum est; cauda duos pollices cum sex lineis; pes quinque lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue sex lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus adhuc brevior. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quindecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad quatuordecim linearum distantiam ultra caudæ extremitatem protenduntur. In universo corpore nigricat. Rostrum, pedes, unguesque concolores. Cauda est non multum bifurca; rectrix enim utrinque extima sex tantum lineis duarum intermediarum longitudinem excedit. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *musæum Reaumurianum* missa est à *D. Chervain*.

ces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche est long de six lignes; sa queue de deux pouces six lignes; son pied de cinq lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Il a quinze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quatorze lignes au-delà du bout de la queue. Il est noirâtre par tout le corps. Le bec, les pieds & les ongles sont de la même couleur. La queue est peu forchue, sa plume la plus extérieure de chaque côté n'étant plus longue que les deux du milieu que de six lignes. On le trouve à *S. Dominique*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

17. LE MARTINET DE LA CAROLINE.

Hirundo in toto corpore saturatè violacea; remigibus, rectricibusque saturatiùs violaceis HIRUNDO APOS CAROLINENSIS.

Martinet couleur de pourpre. *Catesb. Tom. I. pag. 51; avec une figure exacte Pl. 51.*

Les Anglois l'appellent PURPLE-MARTIN. *Catesb.*

Il est un peu plus gros que notre *Martinet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; son pied huit lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Tout son corps est couvert de plumes d'un violet foncé & brillant. Les plumes des aîles & celles de la queue sont de la même couleur, mais plus foncée. La queue est assez fourchue, sa plume la plus extérieure de chaque côté étant plus longue de quatorze lignes que les deux du milieu. Le bec est noir. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve en *Virginie* & à la *Caroline*, d'où il se retire ordinairement aux approches de l'hiver.

Crassitie Hirundinem Apodem nostratem paululum superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & octo circiter lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; cauda duos pollices cum octo lineis; pes octo lineas; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue decem lineas: laterales paulò sunt breviores; & posticus reliquis omnibus longitudine cedit. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt. In toto corpore pennis vestitur saturatè violaceis & splendentibus. Alarum remiges, sicut & rectrices, eodem imbuuntur colore, sed saturatiore. Cauda est non parùm bifurca; rectrix enim utrinque extrema binas intermedias quatuordecim linearum longitudine antecellit. Rostrum nigrum. Pedes, unguesque nigricantes. Habitat in *Virginia* & *Carolina*, è quibus, appropinquante hieme, discedit.

Fin du Tome Second.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Martinet del. et Sculp.

1. Hirondelle du Sénégal.

2. Hirondelle de la Martinique.

3. Hirondelle d'Amérique.

4. Hirondelle de rivage du Sénégal.



Martinet del. et Sculp.

1. Hironnelle de Cayenne. 2. Hironnelle de rivage de la Cochinchine. 3. Martinet de S. Domingue.

INDEX

TABLE

*Avium in secundo volumine
contentarum, secundum
ordinem in quo dispo-
nuntur.*

*Des Oiseaux contenus dans
le second volume, selon
l'ordre dans lequel ils
sont rangés.*

ORDO IV.

SECTIO I.

XIII. Genus *Coraciæ*.

1. **C**oracia.
2. *Coracia cristata*.

XIV. Genus *Corvinum*.

1. *Corvus*.
A. *Corvus varius*.
B. *Corvus candidus*.
2. *Cornix*.
A. *Cornix varia*.
B. *Cornix candida*.
3. *Cornix frugilega*.
4. *Cornix cinerea*.
5. *Cornix Jamaicensis*.
6. *Monedula*.
A. *Monedula torquata*.
B. *Monedula candida*.
7. *Monedula nigra*.
8. *Pyrrhocorax*.
9. *Monedula Philippensis*.
10. *Monedula Capitis Bonæ
Spei*.

XV. Genus *Picæ*.

1. *Pica*.
A. *Pica candida*.

ORDRE IV.

SECTION I.

XIII. Genre du *Coracias*.

1. **L**E Coracias.
2. Le *Coracias hupé*.

XIV. Genre du *Corbeau*.

1. Le *Corbeau*.
A. *Le Corbeau varié*.
B. *Le Corbeau blanc*.
2. La *Corneille*.
A. *La Corneille variée*.
B. *La Corneille blanche*.
3. La *Corneille moissonneuse*.
4. La *Corneille mantelée*.
5. La *Corneille de la Jamaï-
que*.
6. Le *Choucas*.
A. *Le Choucas à collier*.
B. *Le Choucas blanc*.
7. Le *Choucas noir*.
8. Le *Choucas des Alpes*.
9. Le *Choucas des Philippines*.
10. Le *Choucas du Cap de Bon-
ne Espérance*.

XV. Genre de la *Pie*.

1. La *Pie*.
A. *La Pie blanche*.

2. La Pie du Sénégal.
3. La Pie de la Jamaïque.
4. La grande Pie du Mexique.
5. La petite Pie du Mexique.
6. La Pie de l'Isle Papoe.

2. *Pica Senegalensis.*
3. *Pica Jamaicensis.*
4. *Pica Mexicana major.*
5. *Pica Mexicana minor.*
6. *Pica Papoensis.*

XVI. *Genre du Geay.*

1. Le Geay.
A. *Le Geay blanc.*
2. Le Geay de Cayenne.
3. Le Geay brun de Canada.
4. Le Geay bleu de Canada.

XVI. *Genus Garruli.*

1. Garrulus.
A. *Garrulus albus.*
2. *Garrulus Cayanensis.*
3. *Garrulus Canadensis fuscus.*
4. *Garrulus Canadensis coerulesus.*

XVII. *Genre du Casse-noix.*

1. Le Casse-noix.

XVII. *Genus Nucifragæ.*

1. Nucifraga.

SECTION II.

SECTIO II.

XVIII. *Genre du Rollier.*

1. Le Rollier.
2. Le Rollier de Mindanao.
3. Le Rollier d'Angola.
4. Le Rollier des Indes.
5. Le Rollier de la Chine.
6. Le Rollier des Antilles.
7. Le Rollier de la Nouvelle Espagne.
8. Le Rollier du Mexique.
9. Le Rollier jaune du Mexique.
10. Le Rollier hupé du Mexique.

XVIII. *Genus Galguli.*

1. Galgulus.
2. *Galgulus Mindanensis.*
3. *Galgulus Angolensis.*
4. *Galgulus Indicus.*
5. *Galgulus Sinensis.*
6. *Galgulus Antillarum.*
7. *Galgulus Novæ Hispaniæ.*
8. *Galgulus Mexicanus.*
9. *Galgulus Mexicanus luteus.*
10. *Galgulus Mexicanus cristatus.*

XIX. *Genre du Troupiale.*

1. Le Troupiale.
2. Le Troupiale du Mexique.
3. Le Troupiale à queue annelée.
4. Le Troupiale de Madraff.
5. Le Troupiale tacheté de Madraff.
6. Le Troupiale fauve de Madraff.

XIX. *Genus Icteri.*

1. Icterus.
2. *Icterus Mexicanus.*
3. *Icterus caudâ annulatâ.*
4. *Icterus Maderaspatanus.*
5. *Icterus Maderaspatanus nœvius.*
6. *Icterus Maderaspatanus fulvus.*

7. *Icterus Maderaspatanus cristatus.*
8. *Icterus Brasiliensis.*
9. *Icterus Bengalis.*
10. *Icterus Novæ Hispaniæ.*

11. *Icterus cinereus Novæ Hispaniæ.*

12. *Icterus pterophœniceus.*

13. *Cassicus ruber.*

14. *Cassicus luteus.*

15. *Icterus niger.*

16. *Icterus caudâ bifidâ.*

17. *Icterus fuscus Novæ Hispaniæ.*

18. *Icterus Guianensis.*

19. *Icterus minor.*

20. *Icterus minor spurius.*

21. *Icterus minor viridis.*

22. *Xanthornus.*

23. *Xanthornus Mexicanus.*

24. *Xanthornus Brasiliensis.*

25. *Xanthornus Dominicanensis.*

26. *Xanthornus Cayanensis.*

27. *Xanthornus icterocephalus Cayanensis.*

28. *Xanthornus cœruleus.*

29. *Xanthornus nævius.*

30. *Xanthornus Capitis Bonæ Spei.*

XX. *Genus Manucodiata.*

1. *Manucodiata.*

2. *Manucodiata minor.*

7. Le Troupiale loupé de Madras.

8. Le Troupiale du Brésil.

9. Le Troupiale de Bengale.

10. Le Troupiale de la Nouvelle Espagne.

11. Le Troupiale gris de la Nouvelle Espagne.

12. Le Troupiale à ailes rouges.

13. Le Cassique rouge.

14. Le Cassique jaune.

15. Le Troupiale noir.

16. Le Troupiale à queue fourchue.

17. Le Troupiale brun de la Nouvelle Espagne.

18. Le Troupiale de la Guiane.

19. Le Baltimore.

20. Le Baltimore bâtard.

21. Le Baltimore verd.

22. Le Carouge.

23. Le Carouge du Mexique.

24. Le Carouge du Brésil.

25. Le Carouge de S. Domingue.

26. Le Carouge de Cayenne.

27. Le Carouge à tête jaune de Cayenne.

28. Le Carouge bleu.

29. Le Carouge tacheté.

30. Le Carouge du Cap de Bonne Espérance.

XX. *Genre de l'Oiseau-de-Paradis.*

1. L'Oiseau-de-Paradis.

2. Le petit Oiseau-de-Paradis.

ORDO V.

SECTIO I.

XXI. *Genus Lanii.*

1. *Lanius cinereus.*

A. *Lanius albus.*

2. *Lanius cinereus major.*

ORDRE V.

SECTION I.

XXI. *Genre de la Pie-grièche.*

1. La Pie-grièche grise.

A. *La Pie-grièche blanche.*

2. La grande Pie-grièche grise.

- | | |
|---|---|
| 3. La Pie-grièche rousse. | 3. <i>Lanius rufus.</i> |
| 4. L'Ecorcheur. | 4. <i>Collurio.</i> |
| 5. L'Ecorcheur varié. | 5. <i>Collurio varius.</i> |
| 6. La Pie-grièche grise de Cayenne. | 6. <i>Lanius Cayanensis cinereus.</i> |
| 7. La Pie-grièche tachetée de Cayenne. | 7. <i>Lanius Cayanensis nævius.</i> |
| 8. La Pie-grièche de la Louisiane. | 8. <i>Lanius Ludovicianus.</i> |
| 9. La petite Pie-grièche de Madagascar. | 9. <i>Lanius Madagascariensis minor.</i> |
| 10. La Pie-grièche grise du Sénégal. | 10. <i>Lanius Senegalensis cinereus.</i> |
| 11. La Pie-grièche de Luçon. | 11. <i>Lanius Lucionensis.</i> |
| 12. La Pie-grièche de Canada. | 12. <i>Lanius Canadensis.</i> |
| 13. La Pie-grièche rousse de Bengale. | 13. <i>Lanius Bengalenfis rufus.</i> |
| 14. La Pie-grièche brune de Bengale. | 14. <i>Lanius Bengalenfis fuscus.</i> |
| 15. La Pie-grièche jaune de Cayenne. | 15. <i>Lanius Cayanensis luteus.</i> |
| 16. La Pie-grièche rousse de Madagascar. | 16. <i>Lanius Madagascariensis rufus.</i> |
| 17. La Pie-grièche de Manille. | 17. <i>Lanius Manillensis.</i> |
| 18. La Pie-grièche du Cap de Bonne Espérance. | 18. <i>Lanius Capitis Bonæ Spei.</i> |
| 19. La Pie-grièche noire de Bengale. | 19. <i>Lanius Bengalenfis niger.</i> |
| 20. La Pie-grièche rouge du Sénégal. | 20. <i>Lanius Senegalensis ruber.</i> |
| 21. La Pie-grièche rayée de Cayenne. | 21. <i>Lanius Cayanensis striatus.</i> |
| 22. La Pie-grièche à queue fourchue de Bengale. | 22. <i>Lanius Bengalenfis caudâ bifidâ.</i> |
| 23. L'Ecorcheur de Madagascar. | 23. <i>Collurio Madagascariensis.</i> |
| 24. La grande Pie-grièche verte de Madagascar. | 24. <i>Lanius Madagascariensis major viridis.</i> |
| 25. La petite Pie-grièche verte de Madagascar. | 25. <i>Lanius Madagascariensis minor viridis.</i> |
| 26. La Pie-grièche bleue de Madagascar. | 26. <i>Lanius Madagascariensis caeruleus.</i> |
| XXII. Genre de la Grive. | XXII. Genus <i>Turdinum.</i> |
| 1. La grosse Grive. | 1. <i>Turdus major.</i> |

DES OISEAUX.

Y

- A. *Turdus candidus*.
2. *Turdus minor*.
A. *Turdus minor leucocephalus*.
B. *Turdus minor cristatus*.
3. *Turdus Iliacus*.
4. *Turdus Iliacus Carolinensis*.
5. *Turdus Pilaris* sive *Turdela*.
A. *Turdus Pilaris leucocephalus*.
B. *Turdus Pilaris naevius*.
6. *Turdus arundinaceus*.
7. *Turdus Sinensis*.
8. *Turdus Carolinensis*.
9. *Turdus Canadensis*.
10. *Merula*.
A. *Merula leucocephalos*.
B. *Merula varia*.
C. *Merula candida*.
11. *Merula montana*.
12. *Merula torquata*.
13. *Merula faxatilis*.
14. *Merula faxatilis minor*.
15. *Merula Americana torquata*.
16. *Merula Amboinensis*.
17. *Merula Canadensis*.
18. *Merula Madagascariensis aurea*.
19. *Merula Indica*.
20. *Merula rosea*.
21. *Merula Sinensis cristata*.
22. *Merula Sinensis cristata minor*.
23. *Merula cristata Capitis Bonæ Spei*.
24. *Merula fusca Capitis Bonæ Spei*.
25. *Merula Bengalenfis*.
26. *Merula Senegalenfis*.
27. *Mimus*.
28. *Mimus varius*.

- A. *La Grive blanche*.
2. *La petite Grive*.
A. *La petite Grive à tête blanche*.
B. *La petite Grive hupée*.
3. *Le Mauvis*.
4. *Le Mauvis de la Caroline*.
5. *La Litorne ou Tourdelle*.
A. *La Litorne à tête blanche*.
B. *La Litorne tachetée*.
6. *La Rousserolle ou Rouche-rolle*.
7. *La Grive de la Chine*.
8. *La Grive de la Caroline*.
9. *La Grive de Canada*.
10. *Le Merle*.
A. *Le Merle à tête blanche*.
B. *Le Merle varié*.
C. *Le Merle blanc*.
11. *Le Merle de montagne*.
12. *Le Merle à collier*.
13. *Le Merle de Roche*.
14. *Le petit Merle de Roche*.
15. *Le Merle à collier d'Amérique*.
16. *Le Merle d'Amboine*.
17. *Le Merle de Canada*.
18. *Le Merle doré de Madagascar*.
19. *Le Merle des Indes*.
20. *Le Merle couleur de rose*.
21. *Le Merle hupé de la Chine*.
22. *Le petit Merle hupé de la Chine*.
23. *Le Merle hupé du Cap de Bonne Espérance*.
24. *Le Merle brun du Cap de Bonne Espérance*.
25. *Le Merle de Bengale*.
26. *Le Merle du Sénégal*.
27. *Le Moqueur*.
28. *Le Moqueur varié*.

- | | |
|---|---|
| 29. Le grand Moqueur. | 29. <i>Mimus major</i> . |
| 30. Le Solitaire. | 30. <i>Merula solitaria</i> . |
| 31. Le Solitaire de Manille. | 31. <i>Merula solitaria Manillensis</i> . |
| 32. Le Solitaire des Philippines. | 32. <i>Merula solitaria Philippensis</i> . |
| 33. Le Merle de Madagascar. | 33. <i>Merula Madagascariensis</i> . |
| 34. Le Merle de la Jamaïque. | 34. <i>Merula Jamaicensis</i> . |
| 35. Le Merle des Philippines. | 35. <i>Merula Philippensis</i> . |
| 36. Le Merle chauve des Philippines. | 36. <i>Merula calva Philippensis</i> . |
| 37. Le Merle bleu. | 37. <i>Merula coerulea</i> . |
| 38. Le Merle de S. Domingue. | 38. <i>Merula Dominicensis</i> . |
| 39. Le Merle cendré des Indes. | 39. <i>Merula Indica cinerea</i> . |
| 40. Le Merle cendré d'Amérique. | 40. <i>Merula Americana cinerea</i> . |
| 41. Le Merle cendré de Madagascar. | 41. <i>Merula Madagascariensis cinerea</i> . |
| 42. Le Merle de l'Isle de Bourbon. | 42. <i>Merula Borbonica</i> . |
| 43. Le Merle olive du Cap de Bonne Espérance. | 43. <i>Merula olivacea Capitis Bonæ Spei</i> . |
| 44. Le Merle olive de S. Domingue. | 44. <i>Merula olivacea Dominicensis</i> . |
| 45. Le Merle olive des Indes. | 45. <i>Merula olivacea Indica</i> . |
| 46. Le Merle à collier du Cap de Bonne Espérance. | 46. <i>Merula torquata Capitis Bonæ Spei</i> . |
| 47. Le Palmiste. | 47. <i>Merula Palmarum</i> . |
| 48. Le Palmiste à tête noire. | 48. <i>Merula Palmarum atricapilla</i> . |
| 49. Le Mainate. | 49. <i>Mainatus</i> . |
| 50. Le grand Mainate. | 50. <i>Mainatus major</i> . |
| 51. Le Merle d'Amérique. | 51. <i>Merula Americana</i> . |
| 52. Le Merle du Cap de Bonne Espérance. | 52. <i>Merula Capitis Bonæ Spei</i> . |
| 53. Le Merle verd d'Angola. | 53. <i>Merula viridis Angolensis</i> . |
| 54. Le Merle verd à longue queue du Sénégal. | 54. <i>Merula viridis longicauda Senegalensis</i> . |
| 55. Le Merle verd de la Caroline. | 55. <i>Merula viridis Carolinensis</i> . |
| 56. Le Merle verd des Moluques. | 56. <i>Merula viridis Moluccensis</i> . |
| 57. Le Merle verd à tête noire des Moluques. | 57. <i>Merula viridis atricapilla Moluccensis</i> . |
| 58. Le Lorient. | 58. <i>Oriolus</i> . |
| 59. Le Lorient de la Cochinchine. | 59. <i>Oriolus Cochinchinensis</i> . |

- 60. Oriolus Indicus.
- 61. Oriolus Bengalenfis.
- 62. Oriolus capite striato.
- 63. Bombycilla Bohemica.
- 64. Bombycilla Carolinenfis.

- 60. Le Lorient des Indes.
- 61. Le Lorient de Bengale.
- 62. Le Lorient à tête rayée.
- 63. Le Jaseur de Bohême.
- 64. Le Jaseur de la Caroline.

XXIII. Genus Cotingæ.

XXIII. Genre du Cotinga.

- 1. Cotinga.
- 2. Cotinga Maynanenfis.
- 3. Cotinga Cayanenfis.
- 4. Cotinga Mexicana.
- 5. Cotinga purpurea.
- 6. Cotinga cinereo-purpurea.
- 7. Cotinga rubra.
- 8. Cotinga cinerea.
- 9. Cotinga nævia.
- 10. Cotinga alba.

- 1. Le Cotinga.
- 2. Le Cotinga des Maynas.
- 3. Le Cotinga de Cayenne.
- 4. Le Cotinga du Mexique.
- 5. Le Cotinga pourpre.
- 6. Le Cotinga gris-pourpre.
- 7. Le Cotinga rouge.
- 8. Le Cotinga gris.
- 9. Le Cotinga tacheté.
- 10. Le Cotinga blanc.

SECTION II.

SECTION II.

XXIV. Genus Muscicapæ.

XXIV. Genre du Gobe-mouche.

- 1. Muscicapa.
- 2. Muscicapa Borbonica.
- 3. Muscicapa Martinicana cristata.
- 4. Muscicapa Martinicana fusca.
- 5. Muscicapa Virginiana fusca.
- 6. Muscicapa Carolinenfis fusca.
- 7. Muscicapa Carolinenfis cinerea.
- 8. Muscicapa Senegalensis torquata.
- 9. Muscicapa Capitis Bonæ Spei.
- 10. Muscicapa Senegalensis pectore rufo.
- 11. Muscicapa Senegalensis pectore nigro.
- 12. Muscicapa torquata Capitis Bonæ Spei.

- 1. Le Gobe-mouche.
- 2. Le Gobe-mouche de l'Isle de Bourbon.
- 3. Le Gobe-mouche hupé de la Martinique.
- 4. Le Gobe-mouche brun de la Martinique.
- 5. Le Gobe-mouche brun de Virginie.
- 6. Le Gobe-mouche brun de la Caroline.
- 7. Le Gobe-mouche cendré de la Caroline.
- 8. Le Gobe-mouche à collier du Sénégal.
- 9. Le Gobe-mouche du Cap de Bonne Espérance.
- 10. Le Gobe-mouche à poitrine rousse du Sénégal.
- 11. Le Gobe-mouche à poitrine noire du Sénégal.
- 12. Le Gobe-mouche à collier du Cap de Bonne Espérance.

- | | |
|--|---|
| 13. Le Gobe-mouche noir. | 13. <i>Muscicapa nigra.</i> |
| 14. Le Gobe-mouche d'Amérique. | 14. <i>Muscicapa Americana.</i> |
| 15. Le grand Gobe-mouche noir de Cayenne. | 15. <i>Muscicapa Cayanensis nigra major.</i> |
| 16. Le grand Gobe-mouche noir hupé de Madagascar. | 16. <i>Muscicapa Madagascariensis nigra major cristata.</i> |
| 17. Le grand Gobe-mouche cendré de Madagascar. | 17. <i>Muscicapa Madagascariensis cinerea major.</i> |
| 18. Le Tyran. | 18. <i>Tyrannus.</i> |
| 19. Le Tyran de S. Domingue. | 19. <i>Tyrannus Dominicensis.</i> |
| 20. Le Tyran à queue fourchue. | 20. <i>Tyrannus caudâ bifurcâ.</i> |
| 21. Le Tyran de Cayenne. | 21. <i>Tyrannus Cayanensis.</i> |
| 22. Le petit Tyran de Cayenne. | 22. <i>Tyrannus Cayanensis minor.</i> |
| 23. Le Tyran du Brésil. | 23. <i>Tyrannus Brasiliensis.</i> |
| 24. Le Gobe-mouche de Cayenne. | 24. <i>Muscicapa Cayanensis.</i> |
| 25. Le Gobe-mouche cendré de Canada. | 25. <i>Muscicapa Canadensis cinerea.</i> |
| 26. Le Gobe-mouche olive de Canada. | 26. <i>Muscicapa Canadensis olivacea.</i> |
| 27. Le Gobe-mouche de la Jamaïque. | 27. <i>Muscicapa Jamaicensis.</i> |
| 28. Le Gobe-mouche hupé de Virginie. | 28. <i>Muscicapa Virginiana cristata.</i> |
| 29. Le Gobe-mouche blanc hupé du Cap de Bonne Espérance. | 29. <i>Muscicapa cristata alba Capitis Bonæ Spei.</i> |
| 30. Le Gobe-mouche hupé du Brésil. | 30. <i>Muscicapa Brasiliensis cristata.</i> |
| 31. Le Gobe-mouche hupé du Cap de Bonne Espérance. | 31. <i>Muscicapa cristata Capitis Bonæ Spei.</i> |
| 32. Le Gobe-mouche hupé de l'Isle de Bourbon. | 32. <i>Muscicapa Borbonica cristata.</i> |
| 33. Le Gobe-mouche hupé du Sénégal. | 33. <i>Muscicapa Senegalensis cristata.</i> |
| 34. Le Gobe-mouche à longue queue de Madagascar. | 34. <i>Muscicapa Madagascariensis longicauda.</i> |
| 35. Le Gobe-mouche à longue queue blanche de Madagascar. | 35. <i>Muscicapa Madagascariensis albicilla longicauda.</i> |
| 36. Le Gobe-mouche varié à longue queue de Madagascar. | 36. <i>Muscicapa Madagascariensis varia longicauda.</i> |

37. *Muscicapa*

37. *Muscicapa Carolinensis rubra.*

37. Le Gobe-mouche rouge de la Caroline.

ORDO VI.

SECTIO I.

XXV. *Genus Buphagi.*

1. *Buphagus.*

SECTIO II.

XXVI. *Genus Sturni.*

1. *Sturnus.*

A. *Sturnus albus.*

B. *Sturnus leucomelas.*

C. *Sturnus leucocephalus.*

D. *Sturnus cinereus.*

2. *Sturnus Capitis Bonæ Spei.*

3. *Sturnus Novæ Hispaniæ.*

4. *Sturnus Ludovicianus.*

ORDO VII.

SECTIO I.

XXVII. *Genus Upupe.*

1. *Upupa.*

SECTIO II.

XXVIII. *Genus Promeropsis.*

1. *Promerops.*

2. *Promerops Mexicanus.*

3. *Promerops Indicus cristatus.*

ORDRE VI.

SECTION I.

XXV. *Genre du Pique-bœuf.*

1. Le Pique-bœuf.

SECTION II.

XXVI. *Genre de l'Etourneau.*

1. L'Etourneau.

A. L'Etourneau blanc.

B. L'Etourneau blanc & noir.

C. L'Etourneau à tête blanche.

D. L'Etourneau gris.

2. L'Etourneau du Cap de Bonne Espérance.

3. L'Etourneau de la Nouvelle Espagne.

4. L'Etourneau de la Louisiane.

ORDRE VII.

SECTION I.

XXVII. *Genre de la Hupe.*

1. La Hupe ou Puput.

SECTION II.

XXVIII. *Genre du Promérops.*

1. Le Promérops.

2. Le Promérops du Mexique.

3. Le Promérops hupé des Indes.

4. Le Promérops des Barba-
des.
5. Le Promérops jaune du Me-
xique.

4. Promerops Barbadenfis.
5. Promerops Mexicanus lu-
teus.

O R D R E V I I I.

XXIX. *Genre du Tette-chèvre.*

1. Le Tette - chèvre ou Cra-
paud-volant.
2. Le Tette-chèvre de la Ca-
roline.
3. Le Tette - chèvre de Virgi-
nie.
4. Le Tette-chèvre de la Ja-
maïque.
5. Le Tette-chèvre du Brésil.
6. Le Tette-chèvre tacheté du
Brésil.
7. Le grand Tette - chèvre ta-
cheté du Brésil.

XXX. *Genre de l'Hirondelle.*

1. L'Hirondelle de cheminée.
A. *L'Hirondelle blanche.*
2. La petite Hirondelle ou le
Martinet à cul blanc.
3. L'Hirondelle de S. Domin-
gue.
4. L'Hirondelle de Cayenne.
5. L'Hirondelle du Sénégal.
6. L'Hirondelle du Pérou.
7. La grande Hirondelle du
Pérou.
8. L'Hirondelle de la Marti-
nique.
9. L'Hirondelle de la Caro-
line.
10. L'Hirondelle d'Amérique.
11. La grande Hirondelle d'Es-
pagne.

O R D O V I I I.

XXIX. *Genus Caprimulgi.*

1. Caprimulgus.
2. Caprimulgus Carolinensis.
3. Caprimulgus Virginianus.
4. Caprimulgus Jamaicensis.
5. Caprimulgus Brasiliensis.
6. Caprimulgus Brasiliensis næ-
vius.
7. Caprimulgus Brasiliensis ma-
jor nævius.

XXX. *Genus Hirundinis.*

1. Hirundo domestica.
A. *Hirundo alba.*
2. Hirundo minor sive rustica.
3. Hirundo Dominicanensis.
4. Hirundo Cayanensis.
5. Hirundo Senegalensis.
6. Hirundo Peruviana.
7. Hirundo Peruviana major.
8. Hirundo Martinicana.
9. Hirundo Carolinensis.
10. Hirundo Americana.
11. Hirundo major Hispanica.


DES OISEAUX.

xj.

- 12. *Hirundo riparia*, sive *Drepanis*.
- 13. *Hirundo riparia Senegalensis*.
- 14. *Hirundo riparia Cochinsinensis*.
- 15. *Hirundo Apos*.
- 16. *Hirundo Apos Dominicanensis*.
- 17. *Hirundo Apos Carolinensis*.

- 12. L'Hirondelle de rivage.
- 13. L'Hirondelle de rivage du Sénégal.
- 14. L'Hirondelle de rivage de la Cochinchine.
- 15. Le Martinet.
- 16. Le Martinet de S. Domingue.
- 17. Le Martinet de la Caroline.





T A B L E I N D E X

Des Genres.

Generum.

XIII	Genre . . .	page	3	XIII	Genus . . .	pagina	3
XIV	Genre . . .		7	XIV	Genus . . .		7
XV	Genre . . .		35	XV	Genus . . .		35
XVI	Genre . . .		46	XVI	Genus . . .		46
XVII	Genre . . .		58	XVII	Genus . . .		58
XVIII	Genre . . .		63	XVIII	Genus . . .		63
XIX	Genre . . .		85	XIX	Genus . . .		85
XX	Genre . . .		130	XX	Genus . . .		130
XXI	Genre . . .		140	XXI	Genus . . .		140
XXII	Genre . . .		200	XXII	Genus . . .		200
XXIII	Genre . . .		339	XXIII	Genus . . .		339
XXIV	Genre . . .		357	XXIV	Genus . . .		357
XXV	Genre . . .		436	XXV	Genus . . .		436
XXVI	Genre . . .		439	XXVI	Genus . . .		439
XXVII	Genre . . .		454	XXVII	Genus . . .		454
XXVIII	Genre . . .		460	XXVIII	Genus . . .		460
XXIX	Genre . . .		469	XXIX	Genus . . .		469
XXX	Genre . . .		485	XXX	Genus . . .		485



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS FRANÇOIS.

La lettre G indique le genre : la lettre V, la variété ;
& la lettre E, l'espece.

A.

	G.	E.		G.	V.	E.
A GACE ,	15	1	Carouge du Mexique ,	19	23	
Agasse ,	15	1	— tacheté ,	19	29	
Alouette d'Amérique ,			Casse-noix ,	17		
(Schomburger, forte d')	19	29	—	17	1	
— (Grande)	22	15	Cassique ,	19	13	
Autre Espece de Merle ,	22	40	— jaune ,	19	14	
— Espece de Merle de			— rouge ,	19	13	
l'Isle de S. Thomas ,	19	26	Chat-Oiseau ,	24	5	
— Hirondelle ,	30	7	Choquar ,	13	1	
			—	14	6	
			Chouca ,	14	1	
			— rouge ,	13	6	

B.

	G.	E.		G.	V.	E.
B Altimore ,	19	19	Choucas ,	14	6	
— bâtard ,	19	20	— à collier ,	14	A. 6	
— (Oiseau-)	19	19	— aux pieds & bec rouge ,	13	1	
— verd ,	19	21	— blanc ,	14	B. 6	
Baniahbou de Bengale ,	22	25	— couleur de pourpre ,	15	3	
Bonana minor , (Oiseau)	19	23	— de Cornouaille ,	13	1	
			— des Alpes ,	14	8	
			— des Philippines ,	14	9	
			— du Cap de Bonne Espérance ,	14	10	
			— noir ,	14	7	

C.

	G.	E.		G.	V.	E.
C Aille de Bengale ,	22	56	Chouchette ,	14	6	
Calandre ,	22	1	— (Petite)	14	6	
Carouge ,	19	22	Chouette ,	13	6	
— à tête jaune de Cayenne ,	19	27	— rouge ,	13	1	
— bleu ,	19	28	Chouette ,	14	6	
— de Cayenne ,	19	26	Chucas ,	14	6	
— de S. Domingue ,	19	25	Contra de Bengale ,	19	9	
— du Brésil ,	19	24	Coracias ,	13		
— du Cap de Bonne Espérance ,	19	30	—	13	1	
			— hupé ,	13	2	

	G. V. E.		E.		G. V. E.
Corbeau,	14				
—	14	I			
— blanc,	14	B. I		E Corcheur,	2I 4
— solitaire,	14	I		— à tête rouge,	2I 3
— varié,	14	A. I		— cendré, (Grand)	2I I
Corneille,	14	2		— de Madagascar,	2I 23
— apprivoisée,	14	6		— femelle, (Petit)	2I 3
— blanche,	14	B. 2		— (Petit)	2I 4
— cendrée de Royton,	14	4		— varié,	2I 5
— de bois des Cantons				Effraye,	29 I
Suisses,	13	2		Espec de Merle, (Autre)	22 40
— de Cornouaille,	13	I		— de Merle de l'Isle de S.	
— de la Jamaïque,	14	5		Thomas, (Autre)	19 26
— de mer,	13	2		— d'Hirondelle de riva-	
— emmantelée,	14	4		ge,	30 12
— mantelée,	14	4		— d'Hirondelle, (Mar-	
— moissonneuse,	14	3		tinet)	30 2
— ordinaire,	14	2		Estourneau,	26 I
— sauvage,	14	4		Etourneau,	26
— variée,	14	A. 2		—	26 I
Cotinga,	23			— à ailes rouges,	19 12
—	23	I		— à tête blanche,	26 C. I
— blanc,	23	10		— blanc,	26 A. I
— de Cayenne,	23	3		— blanc & noir,	26 B. I
— des Maynas,	23	2		— de la Chine,	22 2I
— du Mexique,	23	4		— de la Louisiane,	26 4
— gris,	23	8		— de la Nouvelle Espa-	
— gris-pourpre,	23	6		gne,	26 3
— pourpre,	23	5		— du Cap de Bonne Es-	
— rouge,	23	7		pérance,	26 2
— tacheté,	23	9		— gris,	26 D. I
Crapaud-volant,	29	I		— jaune de Bengale,	22 6I
Cul-blanc à la poitrine				— rouge-aîle,	19 12
jaune,	22	55			
— jaune,	19	I		F.	
— jaune, petite espe-					G. E.
ce,	19	14		FReux,	14 3
D.				Frezaye,	29 I
				G.	
	G. E.				G. E.
D Ame,	15	I		G Eai,	16 I
Demoiselle,	19	25		G Geay,	16 I
				—	16

DES NOMS FRANÇOIS.

	G. V. E.			G. E.	
Geay blanc,	16	A. 1	Gobe-mouche de l'Isle de		
— bleu,	16	4	Bourbon,	24	2
— bleu de Canada,	16	4	— mouche du Cap de		
— brun de Canada,	16	3	Bonne Espérance,	24	9
— de Bengale,	18	2	— mouche hupé de la		
— de Bohême,	22	63	Martinique,	24	3
— de Cayenne,	16	2	— mouche hupé de l'Isle		
Gobe-mouche,	24		de Bourbon,	24	32
—	24	1	— mouche hupé de Vir-		
— mouche à collier du			ginie,	24	28
Cap de Bonne Es-			— mouche hupé du Bré-		
pérance,	24	12	fil,	24	30
— mouche à collier du			— mouche hupé du Cap		
Sénégal,	24	8	de Bonne Espé-		
— mouche à longue			rance,	24	31
queue blanche de			— mouche hupé du Sé-		
Madagascar,	24	35	négal,	24	33
— mouche à longue			— mouche noir,	24	13
queue de Mada-			— mouche noir de		
gascar,	24	34	Cayenne, (Grand)	24	15
— mouche à poitrine noi-			— mouche noir hupé		
re du Sénégal,	24	11	de Madagascar,		
— mouche à poitrine			(Grand)	24	16
rouffe du Sénégal,	24	10	— mouche olive de Ca-		
— mouche blanc hupé			nada,	24	26
du Cap de Bonne			— mouche rouge de la		
Espérance,	24	29	Caroline,	24	37
— mouche brun de la Ca-			— mouche varié à lon-		
roline,	24	6	gue queue de Ma-		
— mouche brun de la			dagascar,	24	36
Martinique,	24	4	Grand Ecorcheur cendré,	21	1
— mouche brun de Vir-			— Gobe-mouche cendré		
ginie,	24	5	de Madagascar,	24	17
— mouche cendré de Ca-			— Gobe-mouche noir de		
nada,	24	25	Cayenne,	24	15
— mouche cendré de la			— Gobe-mouche noir hu-		
Caroline,	24	7	pé de Madagascar,	24	16
— mouche cendré de Ma-			— Mainate,	30	50
dagascar, (Grand)	24	17	— Martin,	30	11
— mouche d'Amérique,	24	14	— Martinet,	30	15
— mouche de Cayenne,	24	24	— (Martinet)	22	15
— mouche de la Jamaï-			— Merle,	29	1
que,	24	27	— Mino,	22	50

	G. V. E.			G. V. E.	
Grand Minor ,	22	50	Hérondelle ,	30	
— Moqueur ,	22	29	Hirondelle ,	30	1
— Tette-chèvre tacheté			—	30	2
du Brésil ,	29	7	—	30	3
Grande Alouette ,	22	15	—	30	6
— Grive ,	22	1	—	30	11
— Hirondelle ,	30	15	—	30	7
— (Hirondelle)	30	15	— (Autre)	30	A. 1
— Hirondelle d'Espa-			— blanche ,	30	9
gne ,	30	11	— d'Amérique ,	30	10
— Hirondelle du Pérou ,	30	7	—	30	4
— Pie du Mexique ,	15	4	— de Cayenne ,	30	1
— Pie-grièche ,	21	1	— de cheminée ,	30	9
— Pie-grièche grise ,	21	2	— de la Caroline ,	30	
— Pie - grièche verte de			— de la Martinique ,	30	8
Madagascar ,	21	24	— de mer ,	30	15
— Rouge-queue ,	22	13	— de rivage ,	30	12
Grive ,	22		— de rivage de la Co-		
—	22	1	chinchine ,	30	14
— à tête blanche, (Petite)	22	A. 2	— de rivage du Sénégal ,	30	13
— aux jambes rouges ,	22	40	— de rivage, (Espece d')	30	12
— blanche ,	22	A. 1	— de S. Domingue ,	30	3
— brune de passage ,	22	9	— d'Espagne, (Grande)	30	11
— de Canada ,	22	9	— domestique ,	30	1
— de la Caroline ,	22	8	— du Pérou ,	30	6
— de la Chine ,	22	7	— du Pérou, (Grande)	30	7
— de vigne ,	22	3	— du Sénégal ,	30	5
— (Grande)	22	1	— grande ,	30	15
— (Grosse)	22	1	— (Grande)	30	15
— hupée, (Petite)	22	B. 2	— (Martinet espece d')	30	2
— ordinaire ,	22	2	— (Petite)	30	1
— (Petite)	22	2	—	30	2
—	22	4	Hupe ,	27	
— rouge-aîle ,	22	3	—	27	1
— rouffe ,	22	8	Huppe ,	27	1
Grivette ,	22	3			
Grolle ,	14	3			
Grosse Grive ,	22	1			
H.			I.		
H alcion vocal ,	G. 22	E. 6	J aquette ,	G. 15	E. 1
Haleur ,	29	4	Jaseur de Bohême ,	22	63
Harondelle ,	30	1	— de la Caroline ,	22	64
			Jay ,	16	1
			Jayon ,	16	1
			Litorne ,		

DES NOMS FRANÇOIS.

xvij

			G. V. E.	
L.				
L	Itorne ,	22	5	
	— à tête blanche ,	22	A. 5	
	— tachetée ,	22	B. 5	
	Loriot ,	22	58	
	— à tête noire des Indes ,	22	61	
	— à tête rayée ,	22	62	
	— de Bengale ,	22	61	
	— de la Cochinchine ,	22	59	
	— des Indes ,	22	60	
	Lupege ,	27	1	
M.				
M	Ainate ,	22	49	
	— (Grand)	22	50	
	Manakin blue à poitrine			
	pourpre ,	23	1	
	Martelet ,	30	15	
	Martin , (Grand)	30	11	
	Martinet ,	30	2	
	—	30	15	
	— à cul blanc ,	30	2	
	— couleur de pourpre ,	30	17	
	— de la Caroline ,	30	17	
	— de rivage ,	30	12	
	— de S. Domingue ,	30	16	
	— Espece d'Hirondelle ,	30	2	
	— grand ,	30	15	
	— (Grand)	30	15	
	— noir ,	30	15	
	— petit ,	30	2	
	Mauvis ,	22	2	
	—	22	3	
	— de la Caroline ,	22	4	
	Merle ,	22	10	
	—	22	51	
	— à collier ,	22	12	
	— à collier d'Amérique ,	22	15	
	— à collier du Cap de			
	Bonne Espérance ,	22	46	
	— à tête blanche ,	22	A. 10	
	Merle au collier ,	22	12	
	— (Autre Espece de)	22	40	
	— blanc ,	22	C. 10	
	— bleu ,	22	37	
	— brun du Cap de Bon-			
	ne Espérance ,	22	24	
	— cendré d'Amérique ,	22	40	
	— cendré de Madagaf-			
	car ,	22	41	
	— cendré des Indes ,	22	39	
	— chauve des Philippi-			
	nes ,	22	36	
	— couleur de rose ,	22	20	
	— d'Amboine ,	22	16	
	— d'Amérique ,	22	51	
	— de Bengale ,	22	25	
	— de Canada ,	22	17	
	— de couleur de rose ,	22	20	
	— de couleur d'incar-			
	nat ,	22	20	
	— de la Chine ,	22	21	
	— de la Jamaïque ,	22	34	
	— de l'Isle de Bourbon ,	22	42	
	— de l'Isle de S. Thomas ,			
	(Autre espece de)	19	26	
	— de Madagascar ,	22	33	
	— de montagne ,	22	11	
	— de roche ,	22	13	
	— de roche , (Petit)	22	14	
	— de S. Domingue ,	22	38	
	— des Indes ,	22	19	
	— des Philippines ,	22	35	
	— doré de Madagascar ,	22	18	
	— du Cap de Bonne Ef-			
	pérance ,	22	52	
	— du Sénégal ,	22	26	
	— (Grand)	29	1	
	— hupé de la Chine ,	22	21	
	— hupé de la Chine ,			
	(Petit)	22	22	
	— hupé du Cap de Bon-			
	ne Espérance ,	22	23	
	— noir ,	22	10	

G. V. E.			G. V. E.		
Merle olive de S. Domin-			Oiseau rouge de Surinam,	23	7
gue,	22	44	— rouge d'Eté,	24	37
— olive des Indes,	22	45	Orio,	22	58
— olive du Cap de Bon-			P.		
ne Espérance,	22	43	G. V. E.		
— -Pie,	22	B. 10	P aille solitaire,	22	30
— varié,	22	B. 10	Palmiste,	22	47
— verd à longue queue			— à tête noire,	22	48
du Sénégal,	22	54	Petit Ecorcheur,	21	4
— verd à tête noire des			— Ecorcheur femelle,	21	3
Moluques,	22	57	— (Martinet)	30	2
— verd d'Angola,	22	53	— Merle de roche,	22	14
— verd de la Caroline,	22	55	— Merle hupé de la Chi-		
— verd des Moluques,	22	56	ne,	22	22
Mineur des Indes Orien-			— Mino,	22	49
tales,	29	49	— Minor,	22	49
Mino, (Grand)	22	50	— Mocqueur,	22	27
— (Petit)	22	49	— Oiseau-de-Paradis,	20	2
Minor, (Grand)	22	50	— Preneur de mouches		
— (Petit)	22	49	brun,	24	7
Mocqueur, (Petit)	22	27	— Rossignol de muraille		
Moineau solitaire,	22	37	de l'Amérique,	24	14
Moqueur,	22	27	— Tette-chèvre,	29	3
—	22	29	— Tyran de Cayenne,	24	22
— (Grand)	22	29	Petite Chouchette,	14	6
— varié,	22	28	— Grive,	22	2
Moucherolle à queue jau-			—	22	4
ne,	24	14	— Grive à tête blanche,	22	A. 2
— olive,	24	27	— Grive hupée,	22	B. 2
Moutardier,	30	15	— Hirondelle,	30	1
O.			—	30	2
G. E.			— Pie du Mexique,	15	5
O iseau-Baltimore,	19	19	— Pie-grièche,	21	4
— bleu,	22	37	— Pie-grièche de Mada-		
— Bonana minor,	19	23	gascar,	21	9
— (Chat-)	24	5	— Pie-grièche verte de		
— de Banana,	19	1	Madagascar,	21	25
— de Nerte,	22	5	Pie,	15	
— -de-Paradis,	20		—	15	1
—	20	1	— ancrouelle,	21	4
— de Paradis,	20	1	— blanche,	15	A. 1
— -de-Paradis, (Petit)	20	2	— de Brésil,	19	14
— jaune de Bengale,	22	58	— de la Jamaïque,	15	3

DES NOMS FRANÇOIS.

xix

	G. V. E.			G. V. E.	
Pie de l'Isle Papoe,	15	6	Pie - grièche rayée de		
— des Antilles,	18	6	Cayenne,	21	21
— des Indes à queue four-			— -grièche rouge du Sé-		
chue,	21	22	négal,	21	20
— du Mexique, (Grande)	15	4	— -grièche rousse,	21	3
— du Mexique, (Petite)	15	5	— -grièche rousse de		
— du Sénégal,	15	2	Bengale,	21	13
— Escrayere,	21	4	— -grièche rousse de Ma-		
— -grièche,	15	1	dagascar,	21	16
—	21		— -grièche rousse hupée,	21	13
—	21	4	— -grièche tachetée de		
— -grièche à queue four-			Cayenne,	21	7
chue de Bengale,	21	22	— -grièche verte de Ma-		
— -grièche blanche,	21	A. 1	dagascar, (Grande)	21	24
— -grièche bleue de Ma-			— -grièche verte de Ma-		
dagascar,	21	26	dagascar, (Petite)	21	25
— -grièche brune de Ben-			— grivelée,	17	1
gale,	21	14	— jaune & noire,	19	1
— -grièche de Bengale,	21	19	— (Merle)	22	B. 10
— -grièche de Canada,	21	12	— rouge,	15	3
— -grièche de la Loui-			— (Tourdelle)	22	B. 5
siane,	21	8	Pique-bœuf,	25	
— -grièche de Luçon,	21	11	—	25	1
— -grièche de Madagaf-			Preneur de mouches aux		
car, (Petite)	21	9	yeux rouges,	24	27
— -grièche de Manille,	21	17	— de mouches brun,		
— -grièche du Cap de			(Petit)	24	7
Bonne Espérance,	21	18	— de mouches huppé,	24	28
— -grièche, (Grande)	21	1	— de mouches noirâtre,	24	6
— -grièche grise,	21	1	— de mouches rouge,	24	37
— -grièche grise de			Promérops,	28	
Cayenne,	21	6	—	28	1
— -grièche grise du Sé-			— des Barbades,	28	4
négal,	21	10	— du Mexique,	28	2
— -grièche grise, (Gran-			— hupé des Indes,	28	3
de)	21	2	— jaune du Mexique,	28	5
— -grièche jaune de			Puput,	27	1
Cayenne,	21	15	Putput,	27	1
— -grièche noire de Ben-					
gale,	21	19			
— -grièche noire & blan-					
che,	21	21			
— -grièche, (Petite)	21	4			

R.


G. E.

R Ollier,
—
— d'Angola,

18
18
18
3

c ij

	G.	E.		G. V. E.
Rollier de la Chine ,	18	5	Tette - chèvre de Virgi-	
— de la Nouvelle Espa-			nie ,	29 3
gne ,	18	7	— chèvre du Brésil ,	29 5
— de Mindanao ,	18	2	— chèvre , (Petit)	29 3
— des Antilles ,	18	6	— chèvre tacheté du Bré-	
— des Indes ,	18	4	fil ,	29 6
— du Mexique ,	18	8	— chèvre tacheté du Bré-	
— hupé du Mexique ,	18	10	fil , (Grand)	29 7
— jaune du Mexique ,	18	9	Tire-arrache ,	22 6
Roffignol de muraille de			Tourdelle ,	22 5
l'Amérique ,	24	14	— grièche ,	22 B. 5
— de muraille de l'Amé-			— Pie ,	22 B. 5
rique , (Petit)	24	14	Touret ,	22 3
— de rivière ,	22	6	Trasle ,	22 3
Roucherolle ,	22	6	Troupiale ,	19
Rouge-queue de Bengale ,	21	14	—	19 1
— -queue , (Grande)	22	13	— à aîles rouges ,	19 12
Rousserolle ,	22	6	— à queue annelée ,	19 3
S.			— à queue fourchue ,	19 16
	G.	E.	— brun de la Nouvelle	
S Ansonnet ,	26	1	Espagne ,	19 17
S Schomburger , forte			— de Bengale ,	19 9
d'Alouette d'Amé-			— de la Guiane ,	19 18
rique ,	19	29	— de la Nouvelle Espa-	
Siffleur ,	19	21	gne ,	19 10
Siferre ,	22	1	— de Madraft ,	19 4
Solitaire ,	22	30	— du Brésil ,	19 8
— de Manille ,	22	31	— du Mexique ,	19 2
— des Philippines ,	22	32	— fauve de Madraft ,	19 6
Sorte d'Alouette d'Amé-			— gris de la Nouvelle Ef-	
rique , (Schombur-			pagne ,	19 11
ger)	19	29	— hupé de Madraft ,	19 7
T.			— noir ,	19 15
	G.	E.	— tacheté de Madraft ,	19 5
T Ete-chèvre ,	29	1	Tyran ,	24 18
Tette-chèvre ,	29		— à queue fourchue ,	24 20
—	29	1	— de Cayenne ,	24 21
— chèvre de la Caroline ,	29	2	— de Cayenne , (Petit)	24 22
— chèvre de la Jamaï-			— de S. Domingue ,	24 19
que ,	29	4	— du Brésil ,	24 23



INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum , Latinorum , Hebraicorum ,
Græcorum , &c.

*Littera G Genus designat ; Littera V , varietatem ; &
Littera S , Speciem.*

A.	G.	S.		G. V. S.
A Bubilla ,	27	1	Alauda magna ,	22 15
Acamuku , (Cuiriri)	24	30	Alcedo vocalis ,	22 6
Acolchichi ,	19	2	Alcyon vocalis , (Bello-	
—	19	12	nio)	22 6
— Mexicanorum ,	19	12	Α'λεκτρύονα γέλασος ,	27 1
Acototloquichitl ,	22	6	Αλεκτρυάν γέλασος ,	27 1
Adder-Bird ,	21	1	Algaster ,	15 1
—	21	4	Alia Atricapilla ,	24 13
Adfinis , (Fringillæ)	23	7	— Ficedula ,	24 13
Α'δωνις ,	30	1	Aliis Collurio ,	22 5
Aegerst ,	15	1	Aliud Laniorum genus	
Ægithalus ,	29	1	majus Ornitholo-	
Aegothelas , (Caprimul-			gi ,	21 2
gus)	29	1	— Monedulæ genus ,	14 A. 6
Aelcke ,	14	6	Αλκυών φονηεις ,	22 6
Aelke ,	14	6	All , (Schet)	24 34
Aelle-Kraoka ,	18	1	Aller-Groester ,	21 2
Aelster ,	15	1	Alouette d'Amérique ,	
— (Berg-)	21	2	(Schomburger, for-	
Aerter ,	15	1	te d')	19 29
Agace ,	15	1	— (Grande)	22 15
Agarte ,	15	1	Alp-Kachel ,	14 8
Agasse ,	15	1	— Rapp ,	14 8
Agelaster ,	15	1	— Rappe ,	13 2
Aglaster ,	15	1	Alt Rap ,	14 8
Α'γριοκόκορος ,	27	1	Alzarazir ,	26 1
Α'γριοκόρος ,	27	1	American Hang-Nest ,	19 22
Α'γριοπετινον ,	27	1	— Mock-Bird ,	22 27
Α'γριοπετινων ,	27	1	— Song-Thrush ,	22 29
Α'ιγοθήλας ,	29	1	Americanische Neun-	
Α'ιγοθηλης ,	29	1	Toder , (Kleine)	24 18
Ακάνθουλis , Arist.	29	1	Ampelis ,	22 63

	G. V. S.			G. S.	
Ampelis Aldrovandi ,	22	63	Apos Carolinensis , (Hi-		
— cœrulescens , &c.	21	1	rundo)	30	17
— dorso griseo , &c.	21	3	— Dominicensis , (Hi-		
—	21	4	rundo)	30	16
— remigibus , &c.	22	63	— (Hirundo)	30	15
Ampelides Aldrovandi ,	22	63	— Indica ,	20	1
Amfel ,	22	10	— major , (Hirundo)	30	15
— (Berg-)	22	11	Απουs ,	30	15
— (Birch-)	22	11	Α'πας ,	30	15
— (Birck-)	22	11	Apus ,	30	15
— (Birg-)	22	11	— (Hirundo)	30	15
—	22	12	Aquila minor , species		
— (Blau Kopfige Ro-			Corvi, Ytzquauht-		
the)	22	14	li dicta , ex Nova		
— (Blaw-Stein-)	22	37	Hispania ,	18	7
— (Hag-)	22	11	Arneat ,	21	1
— (Kurer-)	22	12	—	21	4
— (Meer-)	22	12	Aronde ,	30	1
— (Ring-)	22	12	Arquata fylvatica ni-		
— (Ringel-)	22	12	gra ,	13	2
— (Rofz-)	22	12	Arreaquo ,	30	15
— (Schnee-)	22	12	Arrexáquo ,	30	15
— (Schwartz-)	22	10	Arunde ,	30	1
— (Schwartz-)	22	10	Ash coloured Butcher-		
— (Schwartz-)	22	10	Bird ,	21	1
— (Stein-)	22	11	— -coloured Butcher-		
—	22	12	Bird , (Lesser)	21	3
— (Wald-)	22	12	Afs-Kraee ,	14	4
— (Weißgefcheckte-)	22	B. 10	Atricapilla , (Alia)	24	13
— (Weiß-)	22	C. 10	— fefe mutans ,	24	13
Amfzlen , (Birg-)	22	11	— tertia ,	24	13
— (Hag-)	22	11	Α'πιδόρα ,	30	1
Amzel , (Ring-)	22	12	Atzel ,	15	1
Amzell , (Berg-)	22	11	Atzle ,	15	1
Anapha ,	14	6	Ave de Verano ,	23	9
Andorinha ,	30	1	Avicula Amboinensis ca-		
—	30	10	nora ,	22	16
— Lusitanis Marcgravii ,			— (Currucis cognata)	24	1
(Hirundo Ameri-			— de Pipizton dicta ,	23	7
cana)	30	10	— (Ficedulis cognata)	24	1
Ani , Mexicana , caudâ			— &c. (Serino affinis)	24	14
longissimâ , (Avis)	28	2	Avis Americana cristata ,		
Apos ,	30	15	Xomotl dicta ,	22	63

ALPHABETICUS.

xxij

G. S.		G. S.	
Avis Americana de Acolchichi , nigro - lutea ,	19 2	Avis Paradisiaca , Manu-	
— Ani , Mexicana , caudâ longissimâ ,	28 2	codiata , cristata ,	
— Bellonii , (Cœrulea)	22 37	orientalis , rarissima ,	28 3
— de Ayoquantototl ,	19 23	— Paradisiaca , minor ,	
— de Ococolin dicta ,	23 3	Amboinensis ,	20 2
— florida ,	19 22	— Paradisiaca , Orientalis , &c.	15 6
—	28 5	— Polyglotta ,	22 27
— (Garrulus)	16 1	— regia , minor , Amboinensis ,	20 2
— incognita ,	22 20	— rubeorum humerorum ,	19 12
— (Junco)	22 6	— Saligna dicta ,	18 9
— majoris generis Clusii , (Paradisea)	20 1	Avium Paradisearum Clusii , (Rex)	20 2
— majoris generis Clusii , (Paradisea)	20 1	— Paradisearum majoris generis Clusii , (Rex)	20 2
— majoris generis , (Paradisea)	20 1	— Paradisearum majoris generis , (Rex)	20 2
— Ococolin ,	18 10	— Paradisearum majoris generis , (Rex)	20 2
— Ocotzinitzcan , Columbæ magnitudine ,	19 3	— Paradiseacarum majoris moduli , (Rex)	20 2
— pallida ,	19 10	Aurendola ,	30 1
— pallida Mexicana Hernandezii ,	19 10	— roquera ,	30 2
— Paradisea ,	20 1	Autre espece de Merle ,	22 40
— Paradisi ,	20 1	— Espece de Merle de l'Isle de S. Thomas ,	19 26
— (Paradisi)	20 1	— Hirondelle ,	30 7
— Paradisi altera Marcgravii ,	20 1	Ayoquantototl ,	19 23
— Paradisi Aroësica ,	20 1	— (Avis de)	19 23
— Paradisi , minor Amboinensis ,	20 2	— dictus , (Lanius)	19 23
— Paradisea ,	20 1		
— Paradiseaca ,	20 1	B.	
— Paradiseaca Americana , elegantissima ,	28 4		
— Paradiseaca Aroësica maxima subrubra ,	20 1	G. S.	
— Paradiseaca , Brasiliensis , cristata ,	24 30	Back-Swala ,	30 12
		Back-Swala ,	22 12
		Back-Swala ,	22 12
		Bali-Cassio ,	14 9
		Baltimore ,	19 19
		— bastard ,	19 20
		— (Bastard)	19 20
		— Bird ,	19 19

	G.	S.		G. V. S.
Baltimore, (Oiseau-)	19	19	Birch-Amsel,	22 11
— verd,	19	21	Birck-Amsel,	22 11
Banana-Bird,	19	22	— Heher,	18 1
— Bird from Jamaica,	19	1	Bird, (Adder-)	21 1
— Bird, (Large)	19	1	—	21 4
Banck-Marten,	30	12	— (American Mock-)	22 27
— Martin,	30	12	— (Ash Coloured But-	
Baniahbou de Bengale,	22	25	cher-)	21 1
Barbadoes Black-Bird,	15	3	— (Baltimore-)	19 19
Barbarotte,	30	15	— (Banana-)	19 22
Bastard Baltimore,	19	20	— (Barbadoes Black-)	15 3
Bat, (East India)	29	2	— (Black-)	22 10
Baum-Haetzel,	16	1	— (Back and White But-	
Bé, (Schet-)	21	16	cher-)	21 21
— (Tcha-Chert)	21	24	— (Butcher-)	21 1
Becco-frisone,	22	63	—	21 4
Becquafiga,	22	58	— (Cat-)	24 5
Becquafigo,	22	58	— (Clot-)	22 37
Beemer-Ziemer,	22	3	— (Dial-)	21 19
Beemerle,	22	63	— (French Mock-)	22 8
Beena,	14	6	— from Jamaica, (Ba-	
—	14	8	nana)	19 1
Beerhold,	22	58	— (Greater Butcher-)	21 1
Behemle,	22	3	— (Grey Mocking)	22 29
—	22	63	— (Indian Mock-)	22 29
Bellonio Alcyon vocalis,	22	6	—	22 37
Beniahbow,	22	25	— (Large Banana-)	19 1
Bemtere,	24	23	— (Lesser Ash-coloured	
— Lusitanis,	24	23	Butcher-)	21 3
Berg-Aelster,	21	2	— (Lesser Bonana)	19 23
— Amsel,	22	11	— (Lesser Butcher-)	21 4
— Amzell,	22	11	— (Lesser Red Backt	
— Doel,	14	8	Butcher-)	21 4
— Droffel,	22	3	— (Lesser variegated	
— Schwalb,	30	2	Butcher-)	21 5
— Troffel,	22	3	— (Miffel-)	22 1
— Tul,	14	8	— (Mifsle-)	22 1
Berolff, (Brouder-)	22	58	— (Mock-)	22 27
Berta,	16	1	—	22 29
Bertina,	16	1	— of Paradise,	20 1
Bicker, (Nufz-)	17	1	— of Paradise, (Pied)	19 7
Bierholt,	22	58	— (Pied Black-)	22 B. 10
Bierolff,	22	58	— (Rain-)	29 2

Bird,

ALPHABETICUS.

xxv

	G. V. S.			G. V. S.	
Bird, (Rare)	29	1	Boeres ,	20	1
— (Shore-)	30	12	Bohemian Chatterer ,	22	63
— (Singing-)	22	29	— Jay ,	22	63
— (Small Black-)	19	15	Bombycilla ,	22	63
— (Small Black and			— Bohemica ,	22	63
orange-coloured)	24	14	— Carolinenfis ,	22	64
— (Small yellow and			— Schwenckfeldii ,	22	63
brown)	19	8	Bonana Bird , (Lesser)	19	23
— (Summer Red-)	24	37	— minor , (Oiseau)	19	23
Birds of Paradise , (King			Bonte-Kraey ,	14	4
of)	20	2	Boulan , (Terat-)	22	19
Birg-Amsel ,	22	11	βαμολόχος ,	14	6
—	22	12	Breaker , (Nut-)	17	1
— Amszlen ,	22	11	Brecher , (Nusz-)	17	1
Bitter ,	22	3	Bretscher , (Nusz-)	17	1
Bivi ,	30	15	Brkoslaw ,	22	63
Black and orange-colou-			Broeckexter ,	16	1
red Bird , (Small)	24	14	Brouder-berolff ,	22	58
— and White Butcher-			Brown Fly-Catcher , (Lit-		
Bird ,	21	21	tle)	24	7
— -Bird ,	22	10	Bruia ,	21	9
— -Bird , (Barbadoes)	15	3	Brusola ,	22	58
— -Bird , (Pied)	22	B. 10	Buba ,	27	1
— -Bird , (Small)	19	15	Bubbola ,	27	1
— cap Fly-Catcher ,	24	6	Buferla ,	21	5
— -Martin ,	30	15	Buferlotto Maschio ,	21	4
— -Osel ,	22	10	Buferula ,	21	3
— -Ousle ,	22	10	Buff-Jay ,	19	6
Blao-Kraoka ,	18	1	Bundte-Kraee ,	14	4
Blau Kopfge Rothe Am-			Bunte Kraehe ,	14	A. 2
fel ,	22	14	Buphagus ,	25	
— -Vogel ,	22	37	—	25	1
Blave Racke ,	18	1	Bürstner ,	24	1
Blaw-Stein-Amsel ,	22	37	Busaroca ,	14	2
— Vogel ,	22	37	Butcher-Bird ;	21	1
— Ziemer ,	22	5	—	21	4
— Zimmer , (Klein)	22	37	— Bird , (Ash-coloured)	21	1
Blew-Jay ,	16	4	— Bird , (Black and		
Blue Jay ,	16	4	White)	21	21
— Manakin , (Purple-			— Bird , (Greater)	21	1
breasted)	23	1	— Bird , (Lesser)	21	4
Boemerle ,	22	3	— Bird , (Lesser Ash-		
Boemerlin ,	22	3	coloured)	21	3

	G.	S.		G.	S.
Butcher-Bird, (Lesser			Carouge,	19	22
Red-Backt)	21	4	— à tête jaune de Cayen-		
— Bird, (Lesser varie-			ne,	19	27
gated)	21	5	— bleu,	19	28
Byrolt,	22	58	— de Cayenne,	19	26
Bérta,	26	1	— de S. Domingue,	19	25
Börtes,	26	1	— du Brésil,	19	24
C.			— du Cap de Bonne Es-		
	G. V. S.		pérance,	19	30
C Abeçoté,	21	11	— du Mexique,	19	23
Cacalotl,	14	A. 1	— tacheté,	19	29
Cacao-Walk,	14	5	Carrion-Crow,	14	2
Caille de Bengale,	22	56	Caryocatactes,	17	1
Caio,	16	1	— Gesneri,	17	1
Calak,	14	1	— Ornithologi,	17	1
Calandre,	22	1	— Turneri,	17	1
Calcabotto,	29	1	Casse-noix,	17	
Cali-Calic,	21	9	—	17	1
Calic, (Cali-)	21	9	Cassicus luteus,	19	14
Caprimulga, (Hirun-			— ruber,	19	13
do)	29	1	Cassio, (Bali-)	14	9
Caprimulgi Species,	29	5	Cassique,	19	13
— Species, (Hirundo)	29	5	— jaune,	19	14
Caprimulgus,	29		— rouge,	19	13
—	29	1	Castrica,	21	1
—	29	4	— Palombina,	21	1
— Aegothelas,	29	1	Castriga,	21	1
— Aldrovandi,	29	1	Cat Bird,	24	5
— Americanus,	29	6	Catcher, (Black cap Fly-)	24	6
— Americanus, &c.	29	2	— (Crested Fly-)	24	28
— Brasiliensis,	29	5	— (Little brown Fly-)	24	7
— Brasiliensis major næ-			— (Olive Coloured Fly-)	24	27
vius,	29	7	— (Red Ey'd Fly-)	24	27
— Brasiliensis nævius,	29	6	— (Yellow-tailed Fly-)	24	14
— Carolinensis,	29	2	Catoen Diefje, (Het)	19	7
— griseus, &c.	29	1	Cau,	14	6
— Jamaicensis,	29	4	Caxcaxtorotl,	23	4
— Jamaycensis minor,	29	4	Caye, (Peach)	19	28
— minor Americanus,	29	3	Cencontlatolli,	22	27
— nostras vulgaris,	29	1	Cesila,	30	1
— Virginianus,	29	3	Charah,	21	13
Caquantototl,	22	64	— dictus, (Lanius Ben-		
Caracura,	22	6	galensis)	21	13

ALPHABETICUS.

xxvij

	G. V. S.			G. S.	
Chat-Oiseau ,	24	5	Choucas , (Gallorum)	13	1
— (Wood-)	21	3	— noir ,	14	7
— (Yellow breſted)	22	55	Chouchette ,	14	6
Chatterer ,	22	64	— (Petite)	14	6
— (Bohemian)	22	63	Chouette ,	13	1
— of Carolina ,	22	64	—	14	6
Chattering Crow ,	14	5	—	14	8
Chau ,	14	6	— (Gallorum)	13	1
Chawer-Schwalbe ,	30	15	— rouge ,	13	1
Check , (Stone-)	22	37	Chouëtte ,	14	6
Χελιδόν ,	30	1	Chough ,	14	7
Χελιδόνι ,	30	1	— (Cornish)	13	1
Χελιδονιδες ,	30	1	Chucas ,	14	6
Χελιδών ,	30	1	Chue ,	14	6
Χελιδών ,	30	1	Churn-Owl ,	29	1
Χελιδών θαλαττία ,	30	12	Ciagula ,	14	6
Χελιδάνη ,	30	1	Cinchli ,	22	6
Chert-Bé , (Tcha-)	21	24	Cinclus Turneri ,	22	6
— Dae , (Tcha-)	21	16	Cion ,	22	3
—	21	26	Cipper ,	22	3
— (Tcha-)	21	25	Cipfelus ,	30	15
Chimney-Swallow ,	30	1	Ciffa Americana , &c.	18	4
Choreus ,	22	58	— Americana nigra , &c.	19	1
Chloreus Aristotelis ,	22	58	—	19	14
Chlorio aliis ,	22	58	— atra , &c.	15	1
— Indicus ,	22	60	— nigra , &c.	19	14
— Indicus , (Picus)	22	60	— nigra cirrata , &c.	19	1
Chlorion ,	22	58	Claufz-Rapp ,	13	2
Χλωριών ,	22	58	Clot-Bird ,	22	37
Choquar ,	13	1	Coccothraustes Charle-		
—	14	8	tonis ,	17	1
Chouca ,	14	6	Cochitototl ,	28	5
— rouge ,	13	1	Cocis Alberti ,	14	3
Choucas ,	14	6	Codirosso maggiore ,	22	13
— à collier ,	14	A. 6	Cœrulea Avis Bellonii ,	22	37
— aux pieds & bec rouge ,	13	1	Cœruleo ,	22	37
— blanc ,	14	B. 6	Cœruleus ,	18	1
— couleur de pourpre ,	15	3	—	22	37
— de Cornouaille ,	13	1	— Indicus ,	22	37
— des Alpes ,	14	8	— Plinii ,	22	37
— des Philippines ,	14	9	Cognata Avicula , (Cur-		
— du Cap de Bonne Ef-			rucis)	24	1
pérance ,	14	10	— Avicula , (Ficedulis)	24	1

d ij

	G. V. S.			G. V. S.	
Cold-Finch,	24	13	Coracias,	18	1
— Finch Germanis,	24	13	— Aristotelis,	13	1
— Finch Germanis dicta,			— &c. (Graculus)	13	1
(Oenanthe)	24	13	— hupé,	13	2
Collurio,	21	1	Corax,	14	1
—	21	4	Corbeau,	14	
—	21	5	—	14	1
— (Aliis)	22	5	— blanc,	14	B. 1
— cinereus major,	21	1	— solitaire,	14	1
— (Lanius)	21	3	— varié,	14	A. 1
— Madagascariensis,	21	23	Corbei,	14	1
— major,	21	1	Corbo,	14	1
— mas Aldrovandi,	21	4	Cornacchia,	14	2
— totus albus,	21	A. 1	Cornacchio,	14	2
— varius,	21	5	Corneia,	14	2
Collurionis parvi primum			Corneille,	14	2
genus,	21	3	— apprivoisée,	14	6
— parvi secundum ge-			— blanche,	14	B. 2
nus,	21	5	— cendrée de Royston,	14	4
— parvi tertium genus,	21	4	— de bois des Cantons		
Collyrio,	21	1	Suisses,	13	2
— Turneri,	22	2	— de Cornouaille,	13	1
Columbina,	22	1	— de la Jamaïque,	14	5
Commendadoza,	19	12	— de mer,	13	2
Common-Crow,	14	2	— emmantelée,	14	4
— House-Swallow,	30	1	— mantelée,	14	4
— Swallow,	30	1	— moissonneuse,	14	3
Congener Aldrovandi,			— ordinaire,	14	2
(Merulæ)	22	11	— sauvage,	14	4
— alia Aldrovandi, (Me-			— variée,	14	A. 2
rulæ)	21	4	Cornice,	14	2
— Alia, (Merulæ)	21	4	Cornicula Americana fuf-		
— altera, (Merulæ)	21	4	ca,	22	51
— (Merulæ)	22	11	— Americana nigra,	22	51
Connilus nocturnus,	29	1	— Indiæ Orientalis,	22	49
Contra,	19	9	—	22	50
— de Bengale,	19	9	Cornish-Chough,	13	1
Coporal,	29	2	Cornix,	14	2
Coracia,	13		—	14	4
—	13	1	—	14	7
— cristata,	13	2	— aquatica,	14	4
Coracias,	13		— candida,	14	B. 2
—	13	1	— cinerea,	14	4

Cornix cinerea apud Re-			Corvi, Ytzquauhtli dic-		
centiores,	14	4	ta, ex Nova His-		
— cinerea Frugilega,	14	4	pania, (Aquila		
— cœrulea,	18	1	minor, species)	18	7
— cœrulea apud Mife-			Corvina, (Cornix)	18	7
nos,	18	1	Corvo,	14	1
— cœrulea Gefneri,	18	1	— marino,	13	2
— cœrulea Schwenckfel-			— felvatico,	13	2
dii,	18	1	— fpelato,	13	2
— corvina,	18	7	— fpilato,	13	2
— flava,	19	3	Corvus,	14	
— flava, &c.	18	9	—	14	1
— Frugilega,	14	3	—	14	A. 1
— Frugivora,	14	3	— albus,	14	B. 1
— Frugivora Aldrovan-			— Alpinus,	13	2
di,	14	3	— ater,	14	3
— garrula,	14	6	— ater, &c.	14	1
— hyberna,	14	4	— calvus nigricans,	14	3
— hyberna apud Recen-			— candidus,	14	B. 1
tiores,	14	4	— capite, &c.	14	4
— Jamaicensis,	14	5	— caudâ cuneiformi,	15	1
— marina,	14	4	— cinereus,	14	4
— marina apud Recen-			— cinereus, &c.	17	1
tiores,	14	4	— cristatus,	18	10
— nigra,	14	2	— dorso sanguineo, &c.	18	1
—	14	3	— fronte nigrâ, &c.	14	6
— nigra Aldrovandi,	14	3	— garrulus ater,	14	5
— nigra, Frugilega,	14	3	— major,	14	1
— nigra garrula,	14	5	— minor,	14	2
— nigra garrula Raji,			—	14	3
&c.	14	5	— niger,	14	1
— parva profundè nigra,	19	15	— niger, &c.	14	1
— picta,	18	1	— femicinerus,	14	4
— purpurea,	15	3	— simpliciter,	14	1
— rostro, pedibusque ru-			— Spermologus Frugi-		
bris,	13	1	vorus,	14	3
— varia,	14	A. 2	— subcœruleus,	14	2
—	14	4	— sylvaticus,	13	2
— varia apud Recentio-			— sylvaticus Aldrovan-		
res,	14	4	di,	13	2
Coroffolo,	22	13	— sylvaticus Gefneri,	13	2
Corp,	14	1	— sylvaticus nocturnus		
— calvo,	14	3	Schwenckfeldii,	13	2

	G. V. S.			G. S.	
Corvus variegatus, &c.	16	1	Crow, (Royston-)	14	4
— varius,	14	A. 1	— (Sea-)	14	4
— versicolor Feroensis,	14	A. 2	Cucala,	14	2
Cotinga,	23		Cucufa,	27	1
—	23	1	Cucupha,	27	1
— alba,	23	10	Cuervo,	14	1
— blanc,	23	10	Cuiriri Acamaku,	24	30
— Cayanensis,	23	3	Cuit,	18	2
— cinerea,	23	8	Cul-blanc à la poitrine		
— cinereo-purpurea,	23	6	jaune,	22	55
— de Cayenne,	23	3	— jaune,	19	1
— des Maynas,	23	2	— jaune, petite espe-		
— du Mexique,	23	4	ce,	19	14
— gris,	23	8	Cundoe Vanga Pandooe,	19	5
— gris-pourpre,	23	6	Curruca,	28	2
— Maynanensis,	23	2	—	28	3
— Mexicana,	23	4	— subfusca,	24	1
— nævia,	23	9	— tergo nigro,	24	13
— pourpre,	23	5	Currucis cognata Avicu-		
— purpurea,	23	5	la,	24	1
— rouge,	23	7	Cutta,	14	6
— rubra,	23	7	Cyanos,	22	37
— tacheté,	23	9	— Aristotelis,	22	37
Coturnix Capensis,	22	56	— Indica,	22	37
Couliavan,	22	59	Cyanus,	22	37
Coulin,	22	36	— Aristotelis,	22	37
Coztototl,	19	10	— Bellonii,	22	37
Cracker, (Nut-)	17	1			
Cramer,	22		D.		
Crapaud-volant,	29	1		G.	S.
Crave,	13	1	D Ach-Schwalben,	30	2
Crested Fly-Catcher,	24	28	Dae, (Tcha-Chert-)	21	16
Cristella,	27	1	—	21	26
Cronwall-Kae,	13	1	Dale,	14	6
Crofferon,	22	13	Dame,	15	1
Crow,	14	2	Dardanello,	30	12
— (Carrion-)	14	2	Dardano,	30	15
— (Chattering)	14	5	Daw,	14	6
— (Common-)	14	2	— (Helvetian)	14	6
— from Switzerland,			— (Jack-)	14	6
(Wood)	13	2	— (Purple Jack-)	15	3
— (Gabbeling)	14	5	Dedek,	27	1
— (Hooded)	14	4	Demoiselle,	19	25

ALPHABETICUS.

	G. V. S.			xxxj	
	G.	S.		G.	S.
Destolo Falconiero ,	21	1	Drozd mnieyffy ,	22	3
Deutscher Papagey ,	18	1	— naywiekszy ,	22	1
Dial-Bird ,	21	19	— Srzedni ,	22	5
Diefje , (Het Catoen)	19	7	Druschel , (Sang-)	22	2
Dini ,	30	15	— (Wein-)	22	3
Doel ,	14	6	Dudek ,	27	1
— (Berg-)	14	8	Dukiphat ,	27	1
Doer , (Neghen-)	21	1	Durftel ,	22	2
Dohle ,	14	6	D'zierzba ,	21	1
— (Grave)	14	6	Dzierzba ,	21	2
— (Schwartz)	14	7	E.		
Dole ,	14	6			
Dominus , (Sylvarum)	21	1	G. V. S.		
Dorn-traeher ,	21	4	E Aft India Bat ,	29	2
Drepanis ,	30	12	Ecorcheur ,	21	4
<i>Δρεπανίς</i> ,	30	12	— à tête rouge ,	21	3
Dres ,	22	5	— cendré , (Grand)	21	1
Dressa ,	22	1	— de Madagascar ,	21	23
Dresso ,	22	1	— femelle , (Petit)	21	3
Drexano ,	22	1	— (Petit)	21	4
Droeffel ,	22	2	— varié ,	21	5
Drongo ,	24	16	Eelvek ,	22	10
Drossel ,	22	1	Effraye ,	29	1
—	22	2	Egerfte ,	15	1
— (Berg-)	22	3	Eichen-Heher ,	16	1
— (Heide-)	22	3	Elfter ,	15	1
— (Kobel)	22	B. 2	— Eberi , (Heiden)	18	1
— (Pfeiff-)	22	3	— Eberi , (Kugel)	18	1
— (Pfieff-)	22	3	— Peuceri , (Heiden)	18	1
— (Rot-)	22	3	— Peuceri , (Kugel)	18	1
— (Stein-)	22	37	— Staar ,	26	B. 1
— (Wein-)	22	3	—	26	C. 1
— (Weiffe-)	22	2	— (Weiffe)	15	A. 1
— (Zier-)	22	2	Enganya Pastus ,	29	1
Drostel , (Mistel-)	22	1	Engel , (Wurg-)	21	1
— (Roth-)	22	3	<i>Εννεόκτονος</i> ,	21	1
— (Sing-)	22	2	Epops ,	27	1
— (Wacholder-)	22	5	<i>Ε΄ποψ</i> ,	27	1
— (Wein-)	22	3	Erd-Schwalbe ,	30	12
— (Weifs-)	22	2	Eſpece de Merle , (Autre)	22	40
— (Weiffe-)	22	A. 1	— de Merle de l'Île de S.		
Drozd ,	22		Thomas , (Autre)	19	26
—	22	2	— d'Hirondelle de riva-		
			ge ,	30	12

	G. V. S.			G. V. S.	
Espece d'Hirondelle ,			Fieldfare, (Pied-)	22	B. 5
(Martinet)	30	2	Filfar,	22	
Estornino ,	26	1	Finch, (Mistel-)	22	1
Estourneau ,	26	1	Finck, (Mistel-)	22	1
Etourneau ,	26		Fincken-Habicht ,	21	2
—	26	1	Fingah ,	21	22
— à ailes rouges ,	19	12	— dictus , (Lanius Ben-		
— à tête blanche ,	26	C. 1	galensis)	21	22
— blanc ,	26	A. 1	Flusher ,	21	4
— blanc & noir ,	26	B. 1	Fly-Catcher, (Black cap)	24	6
— de la Chine ,	22	21	— Catcher, (Crested)	24	28
— de la Louisiane ,	26	4	— Catcher , (Little		
— de la Nouvelle Espa-			brown)	24	7
gne ,	26	3	— Catcher , (Olive Co-		
— du Cap de Bonne Ef-			loured)	24	27
pérance ,	26	2	— Catcher , (Red Ey'd)	24	27
— gris ,	26	D. 1	— Catcher , (Yellow-		
— jaune de Bengale ,	22	61	tailed)	24	14
— rouge-aîle ,	19	12	Fogel, (Haer-)	27	1
Etpie ,	27	1	— (Krams-)	22	5
			— (Olycks-)	22	13
F.			— (Paradis)	20	1
			— (War-)	21	1
			Footed Swallow,		
			(Rough-)	30	2
FAlcinellus Mexica-			Fox coloured Thrush ,	22	8
nus ,	28	2	French Mock-Bird ,	22	8
Falconello ,	21	1	Frezaye ,	29	1
—	21	4	Freux ,	14	3
Falcula ,	30	12	Fringilla cristata , Xo-		
Falilla ,	30	12	motl dicta ,	22	63
Feel-Schwalm ,	30	12	— ex fusco , &c.	19	29
Feldefare ,	22		— nigra ,	21	19
—	22	5	— rubra ,	24	37
Felvek ,	22	10	Fringillæ adfinis ,	23	7
Fenster-Schwalbe ,	30	2	Frisone , (Becco-)	22	63
Fern-Owl ,	29	1	Frugilega ,	14	7
Ficedula , (Alia)	24	13	— (Cornix)	14	3
— secunda ,	24	13	— (Cornix cinerea)	14	4
— sese mutans ,	24	13	— (Cornix nigra)	14	3
— tertia Aldrovandi ,	24	13	Fullo Eberi ,	22	63
Ficedulis cognata Avi-			— Peuceri ,	22	63
cula ,	24	1	Fur nocturnus Plinii ,	29	1
Fieldfare ,	22				
—	22	5			
— of Carolina ,	22	9			

ALPHABETICUS.

xxxiiij

G. V. S.

G.

G. V. S.

G Abbeling Crow ,

14

5

Gacke ,

14

6

Gaey ,

14

6

Gaion ,

16

1

Gaitg ,

16

1

Galbedro ,

22

58

Galbula ,

22

58

— Aldrovandi ,

22

58

— Gefnero ,

22

58

— Juvenis ,

22

58

Galbulus Aldrovando ,

22

58

Galerita varia ,

22

63

Galgen-Regel ,

18

1

Galgulus ,

18

—

18

1

—

22

58

— Aldrovando ,

22

58

— Angolenfis ,

18

3

— Antillarum ,

18

6

— Bellonii ,

22

58

— Indicus ,

18

4

— Mexicanus ,

18

8

— Mexicanus cristatus ,

18

10

— Mexicanus luteus ,

18

9

— Mindanoensis ,

18

2

— Novæ Hispaniæ ,

18

7

— rostro nigro , &c.

16

1

— Sinenfis ,

18

5

Galletto de Magio ,

27

1

Galletto del bosco ,

22

63

— di Marzo ,

27

1

Gallinaceus stercorarius ,

27

1

Gallo del Paradiso ,

27

1

Gallorum Choucas ,

13

1

— Chouette ,

13

1

Gallulus sylvestris ,

22

63

Gallus lutosus ,

27

1

Gals-Kregel ,

18

1

Gantz weisser Staar ,

26

A. 1

Garatauk ,

22

1

Garbella ,

22

58

Gardenna ,

22

1

Garga ,

17

1

Garruli genus alterum ,

18

1

Garrulus ,

16

—

16

1

— albus ,

16

A. 1

— Argentoratenfis ,

18

1

— Argentoratenfis Al-

drovandi ,

18

1

— Avis ,

16

1

— Bohemicus ,

22

63

— Bohemicus Aldrovan-

di ,

22

63

— Bohemicus Gefneri ,

22

63

— Canadensis coeruleus ,

16

4

— Canadensis fuscus ,

16

3

— Carolinienfis , (Tur-

dus)

22

64

— Cayanenfis ,

16

2

— coeruleus ,

18

1

— Indicus , (Picus)

22

29

— qui circa Argentora-

tum Roller appel-

latur ,

18

1

— Recentioribus ,

16

1

Gafotto ,

22

1

Gawron ,

14

3

Gayo ,

16

1

Gaza Ghiandaia ,

16

1

— Ghiandara ,

16

1

— marina ,

21

1

—

21

4

— Sperviera ,

21

1

—

21

4

— verla ,

16

1

Gazera , (Passera)

21

1

—

21

4

Gazza ,

15

1

— di terra nova ,

19

14

Gazzara ,

15

1

Gazzola ,

15

1

Gazzuola ,

15

1

Geai ,

16

1

	G. V. S.		G.	S.
Geay ,	16	Gobe-mouche à collier		
—	16	du Sénégal ,	24	8
— blanc ,	16	— mouche à longue		
— bleu ,	16	queue blanche de		
— bleu de Canada ,	16	Madagascar ,	24	35
— brun de Canada ,	16	— mouche à longue		
— de Bengale ,	18	queue de Mada-		
— de Bohême ,	22	gascar ,	24	34
— de Cayenne ,	16	— mouche à poitrine noi-		
Geifz-Melcher ,	29	re du Sénégal ,	24	11
— Melcker ,	29	— mouche à poitrine		
Gelbling ,	22	rouffe du Sénégal ,	24	10
Gelondrina ,	30	— mouche blanc hupé		
Ger-Schwalb ,	30	du Cap de Bonne		
Gerabib ,	14	Espérance ,	24	29
Gerolff ,	22	— mouche brun de la Ca-		
Geubel-Schwalbe ,	30	roline ,	24	6
Geyer-Schwalbe ,	30	— mouche brun de la		
Geyr-Schwalb ,	30	Martinique ,	24	4
Gezegan ,	21	— mouche brun de Vir-		
Giaion ,	16	ginie ,	24	5
Gigenia ,	22	— mouche cendré de Ca-		
Gikawecz ,	22	nada ,	24	25
Girau ,	16	— mouche cendré de la		
Girerle ,	22	Caroline ,	24	7
Gixerle ,	22	— mouche cendré de Ma-		
Ghiandaia ,	16	dagascar, (Grand)	24	17
— (Gaza)	16	— mouche d'Amérique ,	24	14
Ghiandara ,	15	— mouche de Cayenne ,	24	24
— (Gaza)	16	— mouche de la Jamaï-		
Gluch ,	22	que ,	24	27
Γνάφαλος ,	22	— mouche de l'Isle de		
Gnaphalus ,	22	Bourbon ,	24	2
Goat-Sucker ,	29	— mouche du Cap de		
—	29	Bonne Espérance ,	24	9
— Sucker of Caroli-		— mouche hupé de la		
na ,	29	Martinique ,	24	3
— Sucking-Owl ,	29	— mouche hupé de l'Isle		
Gobe-mouche ,	24	de Bourbon ,	24	32
—	24	— mouche hupé de Vir-		
— mouche à collier du		ginie ,	24	28
Cap de Bonne Es-		— mouche hupé du Bré-		
pérance ,	24	fil ,	24	30

ALPHABETICUS.

xxxv

G. V. S.			G. S.		
Gobe-mouche hupé du			Grand Gobe-mouche cen-		
Cap de Bonne Espérance,	24	31	dré de Madagascar,	24	17
— mouche hupé du Sénégal,	24	33	— Gobe-mouche noir de		
— mouche noir,	24	13	Cayenne,	24	15
— mouche noir de			— Gobe-mouche noir hupé		
Cayenne, (Grand)	24	15	de Madagascar,	24	16
— mouche noir hupé			— Mainate,	22	50
de Madagascar,			— Martin,	30	11
(Grand)	24	16	— Martinet,	30	15
— mouche olive de Canada,	24	26	— (Martinet)	30	15
— mouche rouge de la			— Merle,	29	1
Caroline,	24	37	— Mino,	22	50
— mouche varié à longue			— Minor,	22	50
queue de Madagascar,	24	36	— Moqueur,	22	29
Gold-Meerle,	22	58	— Tette-chèvre tacheté		
— Merle,	22	58	du Brésil,	29	7
<i>Golus</i>	26	1	Grande Alouette,	22	15
Goltz-Kraje, (Wilde)	18	1	— Grive,	22	1
Gout-Merle,	22	58	— Hirondelle,	30	15
Graacke,	14	6	— (Hirondelle)	30	15
Grabolusk,	17	1	— Hirondelle d'Espa-		
Grabulusk,	17	1	gne,	30	11
Gracchia,	14	2	— Hirondelle du Pérou,	30	7
Graculi tertium genus,	13	1	— Pie du Mexique,	15	4
Graculus,	14	6	— Pie-grièche,	21	1
— Coracias, &c.	13	1	— Pie-grièche grise,	21	2
Graculi Alpini genus			— Pie-grièche verte de		
Turneri,	17	1	Madagascar,	21	24
— montani genus Tur-			— Rouge-queue,	22	13
neri,	17	1	Gras-mucke, (Schwartz		
Graculus,	14	6	rückige)	24	13
—	14	A. 6	Graffa,	15	1
—	16	1	Grave Dohle,	14	6
— Festi,	14	6	— -Kraehe,	14	4
Gracus Varronis,	14	6	Graula,	14	2
Graia,	14	6	Graye,	14	3
Graio,	14	6	Great-Swallow,	30	15
Gralla,	16	1	Greater Butcher-Bird,	21	1
Grand Ecorcheur cendré,	21	1	— Red Start,	22	13
			— Reed-Sparrow,	22	6
			Grey Mocking Bird,	22	29
			Grifola,	24	1
			— Aldrovandi,	24	1

G. V. S.			G.	S.
Grifola ex cinereo fusca			Guira-quearea Brasiliensis	
— Aldrovandi,	24	I	Marcgravii,	29 5
— vulgò dicta,	24	I	— querea Marcgravii,	29 5
Grive,	22		— Tangeima,	19 I
—	22	I	— Tangeima Brasiliensi-	
— à tête blanche, (Petite)	22	A. 2	bus,	19 I
— aux jambes rouges,	22	40	— Tangeima Brasilien-	
— blanche,	22	A. I	fium Marcgravii,	19 I
— brune de passage,	22	9	— Tangeima Brasilien-	
— de Canada,	22	9	fium Marcgravio,	19 I
— de la Caroline,	22	8	Guiraru Nheengeta,	23 8
— de la Chine,	22	7	— Nheengeta Brasilien-	
— de vigne,	22	3	sibus,	23 8
— (Grande)	22	I	— Nheengeta Brasilien-	
— (Grosse)	22	I	sibus dicta Marc-	
— hupée, (Petite)	22	B. 2	gravii, (Oenanthe	
— ordinaire,	22	2	Americana)	23 8
— (Petite)	22	2	— Nheengeta Brasilien-	
—	22	4	sis Marcgravii,	23 8
— rouge-aîle,	22	3		
— rousse,	22	8	H.	
— Sisalle,	22	I		
Grivette,	22	3		
Grolle,	14	3	H Aan, (Kat-)	27 I
Groester, (Aller-)	21	2	Habicht, (Fincken-)	21 2
Gros-Ziemer,	22	5	Hacker, (Nusz-)	17 I
Grosse Grive,	22	I	Haecher,	16 I
Grossere Neun-Toder,	21	2	— (Nusz-)	17 I
Groste-Schwalbe,	30	15	Haer,	16 I
Grzébiélucha,	30	12	— Fogel,	27 I
Guacu Brasiliensibus			— (Nusz-)	16 I
Marcgravii, (Pi-			— (Wald-)	21 I
tanga-)	24	23	Haerzel,	16 I
— Brasiliensibus, (Pi-			— (Baum-)	16 I
tanga-)	24	23	Haetzler,	16 I
— (Pitanga-)	24	23	Hag-Amsel,	22 II
Guira-panga,	23	10	— Amszlen,	22 II
— punga,	23	9	Halcedo minor,	22 6
— punga Brasiliensibus,	23	9	— vocalis,	22 6
— punga Brasiliensibus			Halcion vocal,	22 6
Marcgravii,	23	9	Halck-Regel,	18 I
— querea,	29	5	Haleur,	29 4
— querea Brasiliensibus,	29	5	Halk-Regel,	18 I
			Han, (Kat-)	27 I

ALPHABETICUS.

xxxviij

	G. V. S.			G. V. S.	
Han , (Kot-)	27	1	Hirondelle de la Martini-		
Hang-Nest , (American)	19	22	que ,	30	8
— Nest of America ,	19	22	— de mer ,	30	15
Hannekin ,	14	6	— de rivage ,	30	12
Harondelle ,	30	1	— de rivage de la Co-		
Hauf-Schwalbe ,	30	1	chinchine ,	30	14
—	30	2	— de rivage du Sénégal ,	30	13
Hauß-Kraee ,	14	2	— de rivage , (Espece d')	30	12
— Schwalm ,	30	1	— de S. Domingue ,	30	3
Hawran ,	14	1	— d'Espagne , (Grande)	30	11
Hecker , (Nusz-)	16	1	— domestique ,	30	1
Heher , (Birck-)	18	1	— du Pérou ,	30	6
— (Eichen-)	16	1	— du Pérou , (Grande)	30	7
— (Nusz-)	16	1	— du Sénégal ,	30	5
— (Tannen-)	17	1	— grande ,	30	15
Heide-Drossel ,	22	3	— (Grande) ,	30	15
— Ziemer ,	22	3	— (Martinet espece d')	30	2
Heiden Elster Eberi ,	18	1	— (Petite)	30	1
— Elster Peuceri ,	18	1	—	30	2
Helvetian Daw ,	14	A. 6	Hirundo ,	29	1
Hérondelle ,	30	10	—	30	
Herr , (Wald-)	21	1	—	30	1
— (Waldd-)	21	1	— agrestis ,	30	2
Herren-Vogel ,	16	1	— agrestis Plinii ,	30	2
Het Catoen Diefje ,	19	7	— agrestis Plinio dicta ,	30	2
Hetz , (Stein-)	14	8	— alba ,	30	A. 1
Hippomanucodiata ,	20	1	— Ambram griseam re-		
— dicta , (Manucodiata			dolens ,	30	13
tertia Aldrovan-			— Americana ,	30	10
di)	20	1	— Americana , Andorin-		
Hirondelle ,	30		ha Lusitanis Marc-		
—	30	1	gravii ,	30	10
—	30	2	— Americana , aterrima ,		
—	30	3	&c.	30	4
—	30	6	— Americana Brasiliën-		
—	30	11	fibus Tapera dicta ,	30	10
— (Autre)	30	7	— Americana Tapera di-		
— blanche ,	30	A. 1	cta , Raji ,	30	10
— d'Amérique ,	30	9	— Apos ,	30	15
—	30	10	— Apos Carolinenfis ,	30	17
— de Cayenne ,	30	4	— Apos Dominicensis ,	30	16
— de cheminée ,	30	1	— Apos major ,	30	15
— de la Caroline ,	30	9	— Apos minor ,	30	2

	G. V. S.			G. V. S.	
Hirundo Apus ,	30	15	Hirundo prima ,	30	1
— Brasiliensibus Ibijau			— prorsus candida ,	30 A.	1
dicta ,	29	6	— quarta ,	30	15
— brevicauda , &c. .	30	12	— rectricibus , &c.	30	1
— candida ,	30	A. 1	— riparia ,	30	12
— cantu Alaudam refe-			— riparia Aldrovandi ,	30	12
rens ,	30	3	— riparia Cochinsinen-		
— Caprimulga ,	29	1	sis ,	30	14
— Caprimulgi species ,	29	5	— riparia Schwenckfel-		
— Carolinensis ,	30	9	dii ,	30	12
— caudâ , &c.	30	9	— riparia Senegalensis ,	30	13
— caudâ integrâ , &c.	29	1	— rustica ,	30	1
— Cayanensis ,	30	4	—	30	2
— cinerea , &c.	30	12	— rustica Frischii ,	30	1
— domestica ,	30	1	— rustica Plinii ,	30	2
—	30	2	— rustica Plinio dicta ,	30	2
— Dominicanensis ,	30	3	— saxatilis ,	30	2
— dorso nigro , &c.	30	2	—	30	15
— Jamaicensis , &c.	29	4	— saxatilis Schwenckfel-		
— Lusitanis Noitiba dic-			dii ,	30	15
ta ,	29	6	— secunda ,	30	2
— major Hispanica ,	30	11	— Senegalensis ,	30	5
— major subfusca , &c.	29	2	— Sinensis , nido eduli		
— marina indigena ,	30	13	Bontii ,	30	14
— Martinicana ,	30	8	— Sinensis , nido eduli		
— maxima Freti Hercu-			Bontii , Raji ,	30	14
lei ,	30	11	— speluncaria ,	30	2
— maxima Peruviana ,			— speluncaris Schwenck-		
&c.	30	7	feldii ,	30	15
— media minor , &c.	30	2	— subtus alba , &c.	30	1
— minima ,	30	12	— subtus fulva , &c.	30	2
— minima Peruviana ,			— sylvestris ,	30	2
&c.	30	6	—	30	12
— minor ,	30	2	— templorum , (Turne-		
— muraria ,	30	15	ro)	30	15
— muraria Schwenckfel-			— tertia ,	30	12
dii ,	30	15	— tota cœrulescens , &c.	30	15
— nido eduli ,	30	14	— Urbica ,	30	2
— nigra media , &c.	30	15	— uropygio albo ,	30	2
— nigra tota , &c.	30	15	— vulgaris ,	30	4
— peregrina ,	30	1	Hoamy ,	22	7
— Peruviana ,	30	6	Hocher ,	16	1
— Peruviana major ,	30	7	Hocitzanatl ,	15	4

ALPHABETICUS.

xxxix

	G.	S.		G.	S.
Hoecker ,	16	I	Jag-Schlaffer ,	29	I
Hoehner , (Wald-)	21	I	Jala , (Sau-)	22	18
— (Waldd-)	21	I	Jamacaui ,	19	24
Hoexotototl ,	18	9	— Brasiliensibus ,	19	24
Holtz-Krae ,	18	I	— Brasiliensibus Marc-		
— Krae , (Wilde)	18	I	gravii ,	19	24
— Schreier ,	16	I	Japacani ,	19	8
— Schreyer ,	16	I	— Brasiliensibus ,	19	8
— Schreyer , (Turckif-			— Brasiliensibus Marc-		
cher)	17	I	gravii ,	19	8
Hooded-Crow ,	14	4	— Brasiliensis ,	19	8
Hoop ,	27	I	— dicta , Marcgravii ,		
Hoope ,	27	I	(Muscicapa Bra-		
Hoopoe ,	27	I	siliensis)	19	8
Hoopoop ,	27	I	Japan Pie ,	18	6
Hopf , (Wide-)	27	I	Japu ,	19	14
— (Wied-)	27	I	— Brasiliensibus ,	19	14
Hopff , (Wid-)	27	I	— Brasiliensium Marc-		
— (Wide-)	27	I	gravii ,	19	14
Hopffe , (Wide-)	27	I	Jaquette ,	15	I
— (Wiede-)	27	I	Jarr , (Night-)	29	I
Hoppe , (Wede-)	27	I	Jaseur de Bohême ,	22	63
Horfe-Marten ,	30	15	— de la Caroline ,	22	64
Houfe-Swallow ,	30	I	Jaskolká ,	30	I
—	30	2	Jay ,	16	I
— Swallow , (Common)	30	I	— (Blew-)	16	4
Hueitzanatl ,	23	4	— (Blue-)	16	4
Huheron ,	27	I	— (Bohemian)	22	63
Hupe ,	27		— (Buff-)	19	6
—	27	I	— (Madras-)	22	56
Hupetup ,	27	I	— (Motled-)	19	5
Hupka ,	27	I	— (Small blew)	19	28
Huppe ,	27	I	— (Yellow-)	19	4
— (Wide-)	27	I	Jayon ,	16	I
Hus-Swala ,	30	2	Ibijau ,	29	6
Hufs-Schwalm ,	30	I	—	29	7
I.			— Brasiliensibus ,	29	6
	G.	S.	— dicta , (Hirundo Bra-		
J Acapu ,	24	15	siliensibus)	29	6
— Brasiliensibus ,	24	15	— major Marcgravii ,	29	7
Jack-Daw ,	14	6	— minor Marcgravii ,	29	6
— Daw , (Purple)	15	3	— species magnitudine		
Jaeck ,	16	I	Noctuae ,	29	7

	G.	S.		G.	S.
Ibík ,	27	1	Ἰλιάς , (Κίχλα)	22	3
Ἰχλα ,	22		Ἰλιάδα ,	22	3
Icterus ,	19		Illas ,	22	3
—	19	1	— Aldrovandi , (Tur-		
— Bengalensis ,	19	9	dus)	22	3
— Brasiliensis ,	19	8	— Gazæ ,	22	3
— caudâ annulatâ ,	19	3	— (Turdus)	22	3
— caudâ bifidâ ,	19	16	Ἰλλίς ,	22	3
— cinereus Novæ Hispa-			Incendiaria Nonnullo-		
niæ ,	19	11	rum ,	22	63
— ex auro , &c. (Turdus)	19	19	Incineraria ,	22	63
— fuscus Novæ Hispaniæ ,	19	17	Indian Mock-Bird ,	22	29
— Guianensis ,	19	18	—	22	37
— Maderaspatanus ,	19	4	— Stare ,	22	49
— Maderaspatanus cris-			Junco ,	22	6
tatus ,	19	7	— Aldrovandi ,	22	6
— Maderaspatanus ful-			— Avis ,	22	6
vus ,	19	6	— prima Aldrovandi ,	22	6
— Maderaspatanus næ-			Jupujuba ,	19	14
vius ,	19	5	— Brasiliensibus ,	19	14
— Mexicanus ,	19	2	— Brasiliensium Marc-		
— minor ,	19	19	gravii ,	19	14
— minor nidum suspen-			Ἰξιδόρος ,	22	1
dens ,	19	22	Ἰξιφάγος ,	22	1
— minor nidum suspen-			Ἰξοβόρος ,	22	1
dens alter ,	19	22	Ἰξοφάγος ,	22	1
— minor spurius ,	19	20	Izanatl ,	15	3
— minor viridis ,	19	21			
— niger ,	19	15			
— Novæ Hispaniæ ,	19	10			
— Plinii ,	22	58			
— pterophœniceus ,	19	12			
Jedwabniczka ,	22	63			
Jemiolucha ,	22				
—	22	1			
—	22	63			
Jérzyk ,	30	15			
Ἰκτερος ,	22	58			
Iliacus Turdus Hermo-					
lao ,	22	3			
Ἰλιάδα ,	22	3			
Ἰλιάδα , (Κίχλα)	22	3			
Ἰλιάς ,	22	3			

	G.	S.
K A ,	14	6
K Kachel , (Alp-)	14	8
Kae ,	14	6
— (Cronwall.)	13	1
Kaeyke ,	14	6
Kaja ,	14	6
Kajabulbul ,	22	30
Καρακαξ ,	16	1
Καρακαξίς ,	16	1
Καρυοκαλαμῆς ,	17	1
Kat-Haan ,	27	1
— Han ,	27	1
Kaw ,	14	6
Kawa ,	14	6
Kawka ,		

ALPHABETICUS.

xlj

	G.	S.		G. V. S.
Kawka ,	14	6	Knacker , (Nufs-)	17 F
Kaycke ,	14	6	Kobel Droffel ,	22 B. 2
Κεῖσσα ,	15	1	Kohl-Traft ,	22 10
Κεκρόπις ,	30	1	Kol-Rabe ,	14 F
Kelly , (Whip-Tom-)	24	27	Kolck-Raben ,	14 F
Kengel , (War-)	21	1	Κολιος ,	22 58
—	21	2	Kolk-Raben ,	14 F
— (Wer-)	21	1	Κολλυριων ,	21 F
—	21	2	—	21 4
Kerfenrife ,	22	58	Κολοίς ,	14 6
Kiaerrgylta ,	29	1	Κομβει ,	14 2
Κίχλα ,	22		Koore-Kraey ,	14 3
—	22	1	Κοψικος ,	22 10
—	22	5	Κόψυχος ,	22 10
—ιλιάδα ,	22	3	Κόρακας ,	14 F
—ιλιάς ,	22	3	Κορακίας ,	13 F
—τρίχας ,	22	5	Κόραξ ,	14 F
Κιχλας ἰξοβόρος ,	22	1	Korn-Skrika ,	16 F
Κίχλη ,	22		Κοράνη ,	14 2
—	22	1	— Φοινικόρυγκος ,	13 F
Κίγλα ,	22	2	— σπερματολόγος ,	14 3
Killegreuw ,	13	1	— σπερμόλογος ,	14 3
King of Birds of Paradi-			— σποδοειδης ,	14 4
se ,	20	2	Korp ,	14 F
Kinki-mauou ,	24	17	Kos ,	22 10
Kirch-Schwalb ,	30	2	Kostohryz ,	17 F
— Schwalben ,	30	2	Κόσσυφος ,	22 10
Kirchen-Schwalbe ,	30	15	Κοσσύφος μελας ,	22 10
Kirschholdt ,	22	58	Κόσσυφος ,	22 10
Κισσα ,	15	1	Kot-Han ,	27 F
Κίασα ,	15	1	Κοτιλλη ,	30 F
Κίτλα ,	15	1	Κότσυφος ,	22 10
Klaedra ,	22	3	Κοττιφος ,	22 10
Klein Blaw-Zimmer ,	22	37	Κόττυφος ,	22 10
— Wahn-Krengel ,	21	4	— (Βαίος)	22 12
— Ziemer ,	22	3	— ἑκλευκος ,	22 C. 10
Kleine Americanische			— (Φαίος)	22 11
Neun-Toder ,	24	18	Κοττύφος μελας ,	22 10
Kleiner bundter War-			Κότζυφος ,	22 10
Krengel ,	21	4	Κουρώννα ,	14 2
— Neun-Moerder ,	21	4	Kozodoy ,	29 F
Klera ,	22	3	Κερακα ,	14 2
Klesk ,	17	1	Κερώννα ,	14 2

f

ALPHABETICUS.

xlīij

	G. V. S.			G.	S.
Lanius albus,	21	A. 1	Lanius Madagascariensis		
— alius,	21	5	— minor viridis,	21	25
— Arundinum,	21	5	— Madagascariensis ru-		
— Ayoquantototl dic-			— fus,	21	16
— tus,	19	23	— major,	21	1
— Bengalensis caudâ bi-			—	21	2
— furcâ,	21	22	— major Gefnero,	21	2
— Bengalensis, Charah			— Manillensis,	21	17
— dictus,	21	13	— medius,	21	1
— Bengalensis, Fingah			— minor,	21	1
— dictus,	21	22	—	21	3
— Bengalensis fuscus,	21	14	—	21	4
— Bengalensis niger,	21	19	—	21	5
— Bengalensis rufus,	21	13	— minor, &c.	21	5
— Canadensis,	21	12	— minor cinerascens,		
— Capitis Bonæ Spei,	21	18	— &c.	21	3
— Cayanensis cinereus,	21	6	— minor cinerascens Ra-		
— Cayanensis luteus,	21	15	— ji,	21	3
— Cayanensis nævius,	21	7	— minor cinerascens		
— Cayanensis striatus,	21	21	— Willughbeyi,	21	3
— cinereus,	21	1	— minor primo, &c.	21	4
— cinereus, foemina,	21	1	— minor primus Aldro-		
— cinereus major,	21	1	— vandi,	21	3
—	21	2	— minor rufo-cinereus		
—	21	3	— Raji,	21	3
— cinereus major Wil-			— minor rufus,	21	4
— lughbeyi,	21	1	— minor rutilus,	21	3
— cinereus maximus Gef-			— minor rutilus Schwen-		
— neri,	21	2	— ckfeldii,	21	3
— cinereus maximus Wil-			— minor varius,	21	4
— lughbeyi,	21	2	— minor varius Schwen-		
— cinereus mediæ ma-			— ckfeldii,	21	4
— gnitudinis,	21	1	— Ococolin dictus,	23	3
— Collurio,	21	3	— parvus rubeus Schwen-		
— foemina,	21	3	— ckfeldii,	21	3
— Lucionensis,	21	11	— pectore, &c.	21	3
— Ludovicianus,	21	8	— rufus,	21	3
— Madagascariensis cœ-			— secundus,	21	1
— ruleus,	21	26	— Senegalensis cinereus,	21	10
— Madagascariensis ma-			— Senegalensis ruber,	21	20
— jor viridis,	21	24	— similis secundo Aldro-		
— Madagascariensis mi-			— vandi,	21	3
— nor,	21	9	— tertius,	21	3

fij

ALPHABETICUS.

xlv

	G.	S.		G. V. S.
Manucodiata prima ,	20	I	Martinet ,	30 2
— prima Aldrovandi ,	20	I	—	30 15
— prima species ,	20	I	— à cul blanc ,	30 2
— quarta ,	20	I	— couleur de pourpre ,	30 17
— quarta Aldrovandi ,	20	I	— de la Caroline ,	30 17
— quarta species ,	20	I	— de rivage ,	30 12
— quinta ,	20	I	— de S. Domingue ,	30 16
— quinta Aldrovandi ,	20	I	— Espece d'Hirondelle ,	30 2
— Rex ,	20	2	— grand ,	30 15
— Rex Clusii ,	20	2	— (Grand)	30 13
— Rex Marcgravii ,	20	I	— noir ,	30 15
— Rex Marcgravii, Wil-			— petit ,	30 2
lughbeji ,	20	I	Martlet ,	30 2
— tertia Aldrovandi ,	20	I	Maschio , (Buferlotto)	21 4
— tertia Aldrovandi ,			Matagasse ,	21 1
Hippomanucodia-			—	21 4
ta dicta ,	20	I	Mattagasse ,	21 1
— tertia species ,	20	I	Mattages ,	21 1
— ultima species ,	20	I	Maver-Schwalbe ,	30 15
— (Upupa)	28	3	Mavis ,	22 2
— vulgaris Aldrovan-			Mauou , (Kinki-)	24 17
di ,	20	I	Mauvis ,	22 2
— vulgaris Gefneri ,	20	I	—	22 3
— Wormii ,	20	I	— de la Caroline ,	22 4
— Zeilanica , &c.	19	7	Meer-Amsel ,	22 12
Manucodiata quarta spe-			Meerel ,	22 10
cies ,	20	I	Meerle ,	22 10
— species , (Quinta)	20	I	— (Gold-)	22 58
— species , (Tertia)	20	I	Melcher , (Geifz-)	29 1
— species vulgaris ,	20	I	Melcker , (Geifz)	29 1
Marcolfus ,	16	I	Melroa ,	22 10
Marggraff ,	16	I	Melziozallo ,	22 58
Martelet ,	30	15	Mercolfus ,	18 1
Marten , (Banck-)	30	12	Merl ,	22 10
— (Horfe-)	30	15	Merla ,	22 10
Martin ,	22	21	Merlaer ,	22 10
—	30	2	Merle ,	22 10
— (Banck-)	30	12	—	22 51
— (Black-)	30	15	— à collier ,	22 12
— (Grand)	30	11	— à collier d'Amérique ,	22 15
— (Purple-)	30	17	— à collier du Cap de	
— (Sand-)	30	12	Bonne Espérance ,	22 46
— -Swallow ,	30	15	— à tête blanche ,	22 A. 10

	G. V. S.			G. V. S.	
Merle Alpadie ,	17	1	Merle hupé du Cap de		
— au collier ,	22	12	Bonne Espérance ,	22	23
— (Autre Espece de)	22	40	— (Kramets-)	22	12
— blanc ,	22	C. 10	— noir ,	22	10
— bleu ,	22	37	— (Oli-)	22	58
— brun du Cap de Bon-			— olive de S. Domin-		
ne Espérance ,	22	24	gue ,	22	44
— cendré d'Amérique ,	22	40	— olive des Indes ,	22	45
— cendré de Madagaf-			— olive du Cap de Bon-		
car ,	22	41	ne Espérance ,	22	43
— cendré des Indes ,	22	39	— -Pie ,	22	B. 10
— chauve des Philippi-			— varié ,	22	B. 10
nes ,	22	36	— verd à longue queue		
— couleur de rose ,	22	20	du Sénégal ,	22	54
— d'Amboine ,	22	16	— verd à tête noire des		
— d'Amérique ,	22	51	Moluques ,	22	57
— de Bengale ,	22	25	— verd d'Angola ,	22	53
— de Canada ,	22	17	— verd de la Caroline ,	22	55
— de couleur de rose ,	22	20	— verd des Moluques ,	22	56
— de couleur d'incar-			Merlo ,	22	10
nat ,	22	20	— biavo ,	22	37
— de la Chine ,	22	21	— chiappa ,	22	30
— de la Jamaïque ,	22	34	— negro ,	22	10
— de l'Isle de Bourbon ,	22	42	Μέρολα ,	22	30
— de l'Isle de S. Thomas ,			Merops niger , &c.	15	3
(Autre espece de)	19	26	Merula ,	22	10
— de Madagascar ,	22	33	—	22	12
— de montagne ,	22	11	— alba ,	22	C. 10
— de roche ,	22	13	— alba & nigra ,	22	B. 10
— de roche , (Petit)	22	14	— albo & nigro colore		
— de S. Domingue ,	22	38	varia ,	22	B. 10
— des Indes ,	22	19	— Alpina ,	22	11
— des Philippines ,	22	35	— Alpina Schwenckfel-		
— doré de Madagascar ,	22	18	dii ,	22	11
— du Cap de Bonne Ef-			— Amboinenfis ,	22	16
pérance ,	22	52	— Americana ,	22	51
— du Sénégal ,	22	26	— Americana cinerea ,	22	40
— (Gold-)	22	58	— Americana torquata ,	22	15
— (Gout-)	22	58	— Bengalenfis ,	22	25
— (Grand)	29	1	— bicolor ,	22	62
— hupé de la Chine ,	22	21	— bicolor Aldrovandi ,	22	62
— hupé de la Chine ,			— Borbonica ,	22	42
(Petit)	22	22	— calva Philippenfis ,	22	36

ALPHABETICUS.

xlviij

	G. V. S.			G. V. S.	
Merula Canadensis,	22	17	Merula Palmarum,	22	47
— candida,	22	C. 10	— Palmarum, atricapil-		
— candida tota,	22	C. 10	— la,	22	48
— Capitis Bonæ Spei,	22	52	— Philippenfis,	22	35
— cœrulea,	22	37	— rosea,	22	20
— colore albo,	22	C. 10	— rosea Aldrovandi,	22	20
— cristata Capitis Bonæ			— faxatilis,	17	I
Spei,	22	23	—	22	II
— Dominicanfis,	22	38	—	22	13
— fusca,	22	34	— faxatilis Aldrovandi,	17	I
— fusca Capitis Bonæ			—	22	13
Spei,	22	24	— faxatilis Gefneri,	22	II
— fusca Eberi,	22	12	— faxatilis minor,	22	14
— Jamaicenfis,	22	34	— faxatilis Ornithologi,	17	I
— Indica,	22	19	— Senegalenfis,	22	26
— Indica cinerea,	22	39	— Sinenfis cristata,	22	2I
— Indica, pectore cin-			— Sinenfis cristata mi-		
nabarino,	19	18	nor,	22	22
— leucocephalos,	22	A. 10	— folitaria,	22	30
— leucocephalus,	22	A. 10	— folitaria Manillenfis,	22	3I
— Madagascarienfis,	22	33	— folitaria Philippenfis,	22	32
— Madagascarienfis au-			— tertia Aristotelis Al-		
rea,	22	18	drovando,	22	30
— Madagascarienfis ci-			— tertia Aristotelis Gef-		
nerea,	22	4I	nero,	22	30
— Mexicana,	18	8	— tertii generis,	22	II
— Mexicana, (Pica)	18	8	— torquata,	22	12
— montana,	22	II	— torquata Capitis Bo-		
—	22	12	næ Spei,	22	46
— montana Aldrovandi,	22	II	— varia,	22	B. 10
— montana Germano-			— viridis Angolenfis,	22	53
rum,	22	II	— viridis atricapilla Mo-		
— montana Germano-			luccenfis,	22	57
rum Aldrovandi,	22	II	— viridis Carolinenfis,	22	55
— montana Gefneri,	22	II	— viridis longicauda Se-		
— nigra,	22	10	negalenfis,	22	54
— nigra Schwenckfel-			— viridis Moluccenfis,	22	56
dii,	22	10	— vulgaris,	22	10
— olivacea Capitis Bonæ			— vulgaris Schwenckfel-		
Spei,	22	43	dii,	22	10
— olivacea Dominican-			Merulæ Congener,	22	II
fis,	22	44	— Congener Aldrovan-		
— olivacea Indica,	22	45	di,	22	II

	G.	S.		G. V. S.
Merulæ Congener alia ,	21	4	Moerder , (Neun-)	21 2
— Congener alia Aldro-			— (Nun-)	21 1
vandi ,	21	4	Moineau folitaire ,	22 37
— Congener altera ,	21	4	Mollicepe Gazæ ,	16 1
Merulo ,	22	10	Monacchia ,	14 4
— Alpeftro ,	22	12	—	14 6
— faxatili ,	22	30	Monedula ,	14 6
— folitario ,	22	30	—	24 30
— ftercorofa ,	22	30	— Aldrovandi ,	14 6
Microphœnix Fabri ,	22	63	— altera ,	14 A. 6
— Paduani ,	22	63	— candida ,	14 B. 6
Mierla ,	22	10	— Capitis Bonæ Spei ,	14 10
Mimus ,	22	27	— Gefneri ,	14 6
—	22	29	— Indiæ Orientalis ,	22 49
— major ,	22	29	—	22 50
— varius ,	22	28	— nigra ,	14 7
Mineur des indes Orien-			— Philippenfis ,	14 9
tales ,	22	49	— purpurea ,	15 3
Mino , (Grand)	22	50	— torquata ,	14 A. 6
— (Petit)	22	49	— tota nigra ,	19 15
Minor from Eaft India ,	22	49	Monedulæ genus, (Aliud)	14 A. 6
Minor , (Grand)	22	50	Moqueur ,	22 27
— (Petit)	22	49	—	22 29
Miffetoe Thrufh ,	22	1	— (Grand)	22 29
Miffel-Bird ,	22	1	— varié ,	22 28
Mifile-Bird ,	22	1	Motacilla remigibus, &c.	24 13
Miftel-Droftel ,	22	1	Motled-Jay ,	19 5
— Finch ,	22	1	Moucherolle à queue jau-	
— Finck ,	22	1	ne ,	24 14
— Ziemer ,	22	1	— olive ,	24 27
Miftler ,	22	1	Mountain-Owl ,	29 5
Mitlere Neun-Toder ,	21	1	Moutardier ,	30 15
Mituporanga ,	23	9	Mucke , (Schwartz rüc-	
Mock-Bird ,	22	27	kige Gras-)	24 13
—	22	29	Mulacchia ,	14 4
— Bird , (American)	22	27	Munacchia ,	14 4
— Bird , (French)	22	8	Münfter-Spyr ,	30 2
— Bird , (Indian)	22	29	Munyacabres ,	29 1
—	22	37	Mur-Schwalb ,	30 2
Mocking Bird , (Grey)	22	29	— Spyf ,	30 2
Mocqueur , (Petit)	22	27	—	30 15
Moerder, (Kleiner Neun-)	21	4	Mufcicapa ,	24
— (Neun-)	21	1	—	24 1

Mufcicapa

ALPHABETICUS.

xlix

	G.	S.		G.	S.
Muscicapa Americana ,	24	14	Muscicapa torquata Ca-		
— Borbonica ,	24	2	pitis Bonæ Spei ,	24	12
— Borbonica cristata ,	24	32	— Virginiana cristata ,	24	28
— Brasiliensis cristata ,	24	30	— Virginiana fusca ,	24	5
— Brasiliensis Japacani			<i>Μυρτοπικλος</i> ,	22	1
dicta, Marcgravii, 19		8		N.	
— Canadensis cinerea ,	24	25		G.	S.
— Canadensis olivacea ,	24	26	N Abel-Kraye ,	14	4
— Capitis Bonæ Spei ,	24	9	Nacht-Rabe ,	13	2
— Carolinensis cinerea ,	24	7	—	29	1
— Carolinensis fusca ,	24	6	— Raeblein ,	29	1
— Carolinensis rubra ,	24	37	— Raebliu ,	29	1
— Cayanensis ,	24	24	— Schade ,	29	1
— Cayanensis nigra ma-			— Schwalbe ,	29	1
jor ,	24	15	— vogel ,	29	1
— cristata alba Capitis			Naebel-Kraee ,	14	4
Bonæ Spei ,	24	29	Narry , (Tella Yeaco)	19	7
— cristata Capitis Bonæ			Natt-Skiaerra ,	29	1
Spei ,	24	31	— Skraefwa ,	29	1
— è fusco & luteo varia ,	19	8	Nebel Krae ,	14	4
— fusca , (Luscinia)	24	7	— -Kraehe ,	14	4
— Jamaicensis ,	24	27	Nectergal , (Sten-)	22	30
— Madagascariensis al-			Neghen-Doer ,	21	1
bicilla longicauda ,	24	35	Nest , (American Hang-)	19	22
— Madagascariensis ci-			— of America , (Hang-)	19	22
nerea major ,	24	17	Neun-Moerder ,	21	1
— Madagascariensis lon-			—	21	2
gicauda ,	24	34	— Moerder , (Kleiner)	21	4
— Madagascariensis ni-			— Toder , (Grossere)	21	2
gra major cristata ,	24	16	— Toder , (Kleine Ame-		
— Madagascariensis va-			ricanische)	24	18
ria longicauda ,	24	36	— Toder , (Mitlere)	21	1
— Martinicana cristata ,	24	3	Nheengeta Brasiliensibus		
— Martinicana fusca ,	24	4	dicta Marcgravii ,		
— nigra ,	24	13	(Oenanthe-Ame-		
— oculis rubris , (Lusci-			ricana Guiraru)	23	8
nia)	24	27	— Brasiliensibus , (Gui-		
— Senegalensis cristata ,	24	33	raru)	23	8
— Senegalensis pectore			— Brasiliensis Marcgra-		
nigro ,	24	11	vii , (Guiraru)	23	8
— Senegalensis pectore			— (Guiraru)	23	8
rufo ,	24	10	Night-jarr ,	29	1
— Senegalensis torquata ,	24	8	Nightingale ,	22	27

	G.	S.		G.	S.
Nightingale ,	22	29	Ococolin , (Avis)	18	10
— (Spanish-)	19	22	Ocotzinitzcan Colum-		
Nigretus Gefneri ,	22	10	bæ magnitudine ,		
Nocny , (Kruk)	13	2	(Avis)	19	3
Noctua minor , &c.	29	4	Oenanthe Americana		
— sylvatica Jamaicensis			Guiraru Nheenge-		
minor ,	29	4	ta Brasiliensibus		
Noet-Kraka ,	17	1	dicta Marcgravii ,	23	8
— Skrika ,	16	1	— Cold-Finch Germa-		
— Wecka ,	17	1	nis dicta ,	24	13
Noitiba dicta , (Hirundo			— monticola ,	24	13
Lusitanis)	29	6	— nostra quarta ,	24	13
Noitibo ,	29	6	Oiseau-Baltimore ,	19	19
—	29	7	— bleu ,	22	37
— Lusitanis ,	29	6	— Bonana minor ,	19	23
— major Marcgravii ,	29	7	— (Chat-)	24	5
— minor Marcgravii ,	29	6	— de Banana ,	19	1
Nonnullis Tylas ,	22	3	— de Nerte ,	22	5
Nucifraga ,	17		— -de-Paradis ,	20	
—	17	1	—	20	1
— aliis ,	17	1	— de Paradis ,	20	1
— (Pica)	17	1	— -de-Paradis , (Petit)	20	2
— Schwenckfeldii ,	17	1	— jaune de Bengale ,	22	58
Nun-Moerder ,	21	1	— rouge de Surinam ,	23	7
— Toeder ,	21	1	— rouge d'Eté ,	24	37
Nus-Haer ,	16	1	Oli-Merle ,	22	58
Nufs-Bretscher ,	17	1	Olive-coloured Fly-Cat-		
— Haehel ,	17	1	cher ,	24	27
— Heher ,	16	1	Ο'λολυγόννα ,	30	1
— Knacker ,	17	1	Olycks-Fogel ,	22	13
Nufz-Bicker ,	17	1	Oreb ,	14	1
— Brecher ,	17	1	—	14	2
— Hacker ,	17	1	Oresto ,	21	1
— Hecker ,	16	1	Orio ,	22	58
— Krahe ,	17	1	Oriol ,	22	58
Nut-Breaker ,	17	1	Oriolo ,	22	58
— Cracker ,	17	1	Oriolus ,	22	58
Nycticorax ,	29	1	— aliis ,	22	58
—	29	6	— apud Recentiores		
			quosdam ,	22	58
	G.	S.	— Bengalenfis ,	22	61
O	19	11	— capite striato ,	22	62
Coocolin ,	23	3	— Cochinsinensis ,	22	59

ALPHABETICUS.

	G. V. S.			G. S.		lj
Oriolus Gefneri ,	22	58	Paradisæa minoris gene-			
— Indicus,	22	60	ris Clusii ,	20	I	
— subolivaceus, &c.	24	27	Paradisea ,	20	I	
Oroneta ,	30	I	— (Avis)	20	I	
Oropendola ,	22	58	— Avis majoris generis,	20	I	
Oroyéndola ,	22	58	— Avis majoris generis			
Ofel , (Black-)	22	10	Clusii ,	20	I	
Osobny , (Wrobel)	22	30	— lutea , &c.	20	I	
Ossifragus Gefneri ,	17	I	Paradisearum Clusii, (Rex			
— Gefnero ,	17	I	Avium)	20	2	
Ourovang ,	22	41	— majoris generis clusii ,			
Ousle , (Black-)	22	10	(Rex Avium)	20	2	
— (White-headed)	22	A. 10	— majoris generis, (Rex			
Owl , (Churn-)	29	I	Avium)	20	2	
— (Fern-)	29	I	Paradisi Avis ,	20	I	
— (Goat-Sucking-)	29	I	Paradisfa , (Avis)	20	I	
— (Mountain-)	29	5	Paradisfiaca , Americana ,			
— (Screech-)	29	4	elegantissima , (A-			
— (Small Wood-)	29	4	vis)	28	4	
— (Wood-)	29	5	— Aroëfica, maxima sub-			
Ouzel , (Ring-)	22	12	rubra , (Avis)	20	I	
— (Rock-)	22	11	— (Avis)	20	I	
Ouzell , (Ring-)	22	12	— Brasiliensis cristata ,			
Οζοφάρος μέγας ,	22	I	(Avis)	24	30	
P.			— Manucodiata cristata,			
	G.	S.	Orientalis rarissi-			
P Aïsse solitaire ,	22	30	ma , (Avis)	28	3	
Palmiste ,	22	47	— minor, Amboinensis ,			
— à teste noire ,	22	48	(Avis)	20	2	
Pandoe , (Cundoe Van-			— Orientalis, &c. (Avis)	15	6	
ga)	19	5	Paradisfiacarum majoris			
— Pedda , (Vanga)	19	4	moduli , (Rex			
— (Vanga)	19	6	Avium)	20	2	
Panga , (Guira-)	23	10	Paradys , (Rex)	20	2	
Papagey , (Deutscher)	18	I	Paradyfs-Vogel ,	20	I	
Papegoje , (Trosche-)	18	I	Parus niger , &c.	22	30	
Papilion di montagna ,	30	12	Pafon ,	13	I	
Pappagey , (Teutscher)	18	I	—	14	8	
Paput ,	27	I	Passaros de fol ,	20	I	
Paradis Fogel ,	20	I	Passer aquaticus ,	22	6	
Paradisæa ,	20	I	— Serino affinis , &c.	24	14	
— Avis majoris generis			— solitari ,	22	30	
Clusii ,	20	I	— solitarius ,	22	30	

	G. V. S.			G. V. S.	
Passer solitarius à Recen-			Petite Hirondelle ;	30	2
tioribus ,	22	30	— Pie du Mexique ,	15	5
— solitarius Bellonii ,	22	30	— Pie-grièche ,	21	4
— solitarius congener ,	22	37	— Pie-grièche de Ma-		
— solitarius dictus ,	22	30	dagascar ,	21	9
Passera Gazera ,	21	1	— Pie-grièche verte de		
—	21	4	Madagascar ,	21	25
— solitaria ,	22	30	Πετροκορραυφος	22	13
—	30	15	—	22	37
Passere d'Acqua ,	22	6	Pfaff Eberi ,	29	1
Passeri solitario conge-			— Peuceri ,	29	1
ner ,	22	37	Pfeiff-Drossel ,	22	3
— solitario congener Al-			Pfeiff-Drossel ,	22	3
drovandi ,	22	37	Φαίος Κέρλυρος ,	22	11
Pastus , (Enganya)	29	1	Phalacrocorax Aldrovan-		
Paviota ,	30	15	di ,	13	2
Peach Caye ,	19	28	— ex Illyrio missus ,	13	2
Pedda , (Vanga Pandooe)	19	4	Phoenix ,	20	1
Pega ,	15	1	Pianet ,	15	1
Perdix montana Mexica-			Pica ,	15	
na ,	18	10	—	15	1
Petit Ecorcheur ,	21	4	— Abietum nigra , &c.	17	1
— Ecorcheur femelle ,	21	3	— alba ,	15	A. 1
— (Martinet)	30	2	— Americana cristata ,	24	18
— Merle de roche ,	22	14	— Antillarum ,	18	6
— Merle hupé de la Chi-			— Argentoratensis Al-		
ne ,	22	22	drovandi ,	18	1
— Mino ,	22	49	— candida ,	15	A. 1
— Minor ,	22	49	— caudata ,	15	1
— Mocqueur ,	22	27	— caudata Aldrovandi ,	15	1
— Oiseau-de-Paradis ,	20	2	— caudata Japonensis		
— Preneur de mouches			Aldrovandi ,	18	6
brun ,	24	7	— caudata Indica ,	18	6
— Rossignol de muraille			— caudata Indica Al-		
de l'Amérique ,	24	14	drovandi ,	18	6
— Tette-chèvre ,	29	3	— cinerea ,	21	2
— Tyran de Cayenne ,	24	22	— cœrulea ,	18	1
Petite Chouchette ,	14	6	— ex albo & nigro va-		
— Grive ,	22	2	ria , &c.	15	6
—	22	4	— ex luteo & nigro varia ,	19	1
— Grive à teste blanche ,	22	A. 2	— glandaria ,	16	1
— Grive hupée ,	22	B. 2	— glandaria cristata pur-		
— Hirondelle ,	30	1	pureo cœrulea ,	16	4

ALPHABETICUS.

liij

	G.	S.		G. V. S.
Pica glandaria Gefneri ,	16	1	Picus Americanus ater ,	
— glandaria Willugh-			&c.	19 14
beyi ,	16	1	— Americanus , major ,	
— Jamaicensis ,	15	3	pullus , &c.	19 1
— Indica ,	22	49	— Americanus nidum	
— Indica vulgaris ,	22	56	suspendens ,	19 1
— luteo-nigra varia ,	19	1	— ater , &c.	19 14
— Maderaspatana , &c.	19	5	— Chlorio Indicus ,	22 60
— Maderaspatana flavi-			— Garrulus Indicus ,	22 29
cans ,	19	4	— major , pullus , &c.	19 1
— Maderaspatana fulva ,			— minor ater , &c.	19 14
&c.	19	6	— nidum suspendens ,	19 1
— Maderaspatana mini-			—	22 58
ma , &c.	19	28	— nidum suspendens Al-	
— marina ,	18	1	drovandi ,	22 58
— mediæ magnitudinis ,	21	1	— nidum suspendens	
— , Merula Mexicana ,	18	8	aliis ,	22 58
— Mexicana Hernande-			— pullus cirratus , &c.	19 1
zii ,	15	5	Pie ,	15
— Mexicana major ,	15	4	—	15 1
— Mexicana minor ,	15	5	— ancrouelle ,	21 4
— minima ,	21	3	— blanche ,	15 A. 1
— Nucifraga ,	17	1	— de Brésil ,	19 14
— Papoensis ,	15	6	— de la Jamaïque ,	15 3
— Persica ,	19	14	— de l'Isle Papoe ,	15 6
— Persica Aldrovandi ,	19	14	— des Antilles ,	18 6
— Rusticorum ,	15	1	— des Indes à queue four-	
— Senegalensis ,	15	2	chue ,	21 22
— varia ,	15	1	— du Mexique , (Grande)	15 4
— varia Aldrovandi ,	15	1	— du Mexique , (Petite)	15 5
— varia caudata ,	15	1	— du Sénégal ,	15 2
— varia & caudata ,	15	1	— Escrayere ,	21 4
— vulgaris ,	15	1	— -grièche ,	15 1
Picæ glandariæ genus ,	22	63	—	21
— glandariæ genus alte-			—	21 4
rum ,	18	1	— -grièche à queue four-	
— glandariæ genus ter-			chue de Bengale ,	21 22
tium ,	22	63	— -grièche blanche ,	21 A. 1
— glandariæ species alia ,	18	1	— -grièche bleue de Ma-	
Picata ,	15	1	dagascar ,	21 26
Picha ,	15	1	— -grièche brune de Ben-	
Pici , (Species)	23	3	gale ,	21 14
Picket , (Watchy)	19	22	— -grièche de Bengale ,	21 19

	G.	S.		G. V. S.
Pie-grièche de Canada ,	21	12	Pie , (Merle)	22 B. 10
— -grièche de la Loui- siane ,	21	8	— rouge ,	15 3
— -grièche de Luçon ,	21	11	— (Tourdelle)	22 B. 5
— -grièche de Madagaf- car , (Petite)	21	9	— (Yellow and black)	19 1
— -grièche de Manille ,	21	17	Pied Bird of Paradise ,	19 7
— -grièche du Cap de Bonne Espérance ,	21	18	— Black-Bird ,	22 B. 10
— -grièche , (Grande)	21	1	— Fieldfare ,	22 B. 5
— -grièche grise ,	21	1	Pigaza ,	15 1
— -grièche grise de			Pigazza ,	15 1
Cayenne ,	21	6	Pipe , (Swine-)	22 3
— -grièche grise du Sé- négal ,	21	10	Pipiry ,	24 19
— -grièche grise , (Gran- de)	21	2	Pipizton ,	23 7
— -grièche jaune de			Pique-bœuf ,	25
Cayenne ,	21	15	—	25 1
— -grièche noire de Ben- gale ,	21	19	Pitanga-guacu ,	24 23
— -grièche noire & blan- che ,	21	21	— guacu Brasiliensibus ,	24 23
— -grièche , (Petite)	21	4	— guacu Brasiliensibus Marcgravii ,	24 23
— -grièche rayée de			Pitta , (Ponnunky)	22 56
Cayenne ,	21	21	Ποικιλίς ,	15 1
— -grièche rouge du Sé- négal ,	21	20	Pola ,	14 6
— -grièche rousse ,	21	3	Polyglotta ,	22 27
— -grièche rousse de			— (Avis)	22 27
Bengale ,	21	13	Ponnandutty ,	22 56
— -grièche rousse de Ma- dagascar ,	21	16	Ponnunky pitta ,	22 56
— -grièche rousse hupée ,	21	13	Poor-Will , (Whip-)	29 3
— -grièche tachetée de			Pópa ,	27 1
Cayenne ,	21	7	Popp ,	27 1
— -grièche verte de Ma- dagascar , (Grande)	21	24	Poput ,	27 1
— -grièche verte de Ma- dagascar , (Petite)	21	25	Preneur de mouches aux yeux rouges ,	24 27
— grivelée ,	17	1	— de mouches brun ,	24 7
— (Japan)	18	9	(Petit)	24 7
— jaune & noire ,	19	1	— de mouches huppé ,	24 28
			— de mouches noirâtre ,	24 6
			— de mouches rouge ,	24 37
			Promerops ,	28
			—	28 1
			— Barbadenfis ,	28 4
			— Indicus cristatus ,	28 3
			— Mexicanus ,	28 2
			— Mexicanus luteus ,	28 5
			Promérops ,	28

ALPHABETICUS.

lv

	G.	S.		G.	S.
Promérops ,	28	1	Querea Brasiliensis Marc-		
— des Barbades ,	28	4	gravii , (Guira-)	29	5
— du Mexique ,	28	2	— (Guira-)	29	5
— hupé des Indes ,	28	3	— Marcgravii , (Guira-)	29	5
— jaune du Mexique ,	28	5	Quereiva ,	23	3
Prskawecz ,	22	1	Quinta Manucodiatae		
Ψάρ ,	26	1	species ,	20	1
Ψάρος ,	26	1	Quiquiry ,	24	19
Ψεάρ ,	26	1	Quiscula Gelenio ,	22	5
Ψήρ ,	26	1			
Pfittacus Germanicus ,	18	1	R.		
Ψόλμυς ,	26	1			
Pterophœnicus India-				G. V. S.	
rum ,	19	12	R Ab ,	14	1
— Indiarum , (Sturnus)	19	12	Rabe ,	14	1
Pubula ,	27	1	— (Kol-)	14	1
Pundter-Kraee ,	14	4	— (Nacht-)	13	2
Punga Brasiliensibus ,			—	29	1
(Guira-)	23	9	— (Stein-)	13	2
— Brasiliensibus Marc-			— (Wald-)	13	2
gravii , (Guira-)	23	9	— (Weiffer-)	14	B. 1
— (Guira-)	23	9	Raben , (Kolck-)	14	1
Puppula ,	27	1	— (Kolk-)	14	1
Pupulla ,	27	1	Rache ,	18	1
Puput ,	27	1	Racher ,	18	1
Purple-breasted Blue Ma-			Racke , (Blave)	18	1
nakin ,	23	1	Raeblein , (Nacht-)	29	1
— Jack-Daw ,	15	3	Raeblin , (Nacht-)	29	1
— Martin ,	30	17	Ragazza ,	15	1
Putput ,	27	1	Ragazzola ,	21	1
Putta ,	15	1	Rain-Bird ,	29	2
Pyrold ,	22	58	Rap , (Alt)	14	8
Pyrhocorax ,	13	1	Rapp ,	14	1
—	14	8	— (Alp-)	14	8
—	15	6	— (Claufz-)	13	2
— alius ,	14	6	— (Stein-)	13	2
Πυρροκοράξ ,	14	8	— (Wald-)	13	2
			Rappe ,	14	1
			— (Alp-)	13	2
			— (Wald-)	13	2
			Rare Bird ,	29	1
			Rauch-Schwalbe ,	30	1
			Rave ,	14	1
			Raven ,	14	1

Q.

Quadringentæ lin-
guæ , 22 27
Querea Brasiliensibus ,
 (Guira-) 29 5

	G.	S.		G.	S.
Reckolter-Vogel ,	22	5	Ring-Ouzel ,	22	12
Red-Backt Butcher-Bird,			— Ouzell ,	22	12
(Laffer)	21	4	— Swala ,	30	15
— Bird , (Summer)	24	37	Ringel-Amsel ,	22	12
— Ey'd Fly-Catcher ,	24	27	Riparia ,	30	12
— Leg'd Thrush ,	22	40	— Aldrovandi , (Hirun-		
— Start ,	24	14	do)	30	12
— Start , (Greater)	22	13	— Cochinsinensis , (Hi-		
— Wing ,	22	3	rundo)	30	14
— Wing'd Starling ,	19	12	— (Hirundo)	30	12
Reed-Sparrow , (Grea-			— Schwenckfeldii , (Hi-		
ter)	22	6	rundo)	30	12
Regalbulo ,	22	58	— Senegalenfis , (Hirun-		
Regel , (Galgen-)	18	1	do)	30	13
— (Halck-)	18	1	Ripariola ,	30	12
— (Halk-)	18	1	Rock-Ouzel ,	22	11
Regeftola ,	21	1	Roech ,	14	3
— Falconiera ,	21	1	Roeck ,	14	3
—	21	4	Roetele , (Stein-)	22	13
Reigalbero ,	22	58	—	22	37
Rein-Schwalbe ,	30	12	Roka ,	14	3
Reitling , (Stein-)	22	13	Roller ,	18	1
Rendena ,	30	1	Rollier ,	18	
Rex Avium Paradisearum			—	18	1
Clusii ,	20	2	— d'Angola ,	18	3
— Avium Paradisearum			— de la Chine ,	18	5
majoris generis ,	20	2	— de la Nouvelle Espa-		
— Avium Paradisearum			gne ,	18	7
majoris generis			— de Mindanao ,	18	2
Clusii ,	20	2	— des Antilles ,	18	6
— Avium Paradisiaca-			— des Indes ,	18	4
rum majoris mo-			— du Mexique ,	18	8
duli ,	20	2	— hupé du Mexique ,	18	10
— Clusii , (Manucodia-			— jaune du Mexique ,	18	9
ta)	20	2	Rondena ,	30	1
— Paradys ,	20	2	Rondina ,	30	1
Rhyn-Voegele ,	30	12	Rondine ,	30	1
Rhyndace ,	28	4	Rondinella ,	30	1
Richau ,	16	1	Rondone ,	30	15
Rigeyo ,	22	58	— felvatico ,	30	2
Rinder-Staar ,	26	1	Rooche ,	14	3
Ring-Amsel ,	22	12	Roocke ,	14	3
— Amzel ,	22	12	Rook ,	14	3

Rorayg ,

ALPHABETICUS.

Ivij

	G.	S.		G. V. S.
Rorayg,	30	15	Sarfir,	26 1
Roreick,	30	15	Sau-Jala,	22 18
Rossignol de muraille de			Schade, (Nacht-)	29 1
l'Amérique,	24	14	Scheckige Kraehe,	14 A. 2
— de muraille de l'Amé-			Schet,	24 36
rique, (Petit)	24	14	— -All,	24 34
— de riviere,	22	6	— -bé,	21 16
Rofz-Amsel,	22	12	— Vouloulou,	24 35
Rot-Droffel,	22	3	Schilt-Kraee,	14 4
— Trostel,	22	3	— Krahe,	14 4
Rotele, (Stein-)	22	37	Schiron,	22 5
Roth-Droffel,	22	3	Schlaeffer, (Tage-)	29 1
Rothe Amsel, (Blau			Schlaffer, (Jag-)	29 1
Kopfige)	22	14	Schnarre,	22 1
Rouch,	14	3	Schnee-Amsel,	22 12
Roucherolle,	22	6	— Lefchke,	22 63
— Gallis dicta ; quam			— Vogel,	22 63
Bellonius Alcyo-			Schnerre,	22 1
nem vocalem vo-			Schnerrer,	22 1
cat,	22	6	Schomburger, forte d'A-	
— Gallorum,	22	6	louette d'Améri-	
Rouge-queue de Bengale,	21	14	que,	19 29
— queue, (Grande)	22	13	Schreier, (Holtz-)	16 1
Rough-Footed Swallow,	30	2	Schreyer, (Holtz-)	16 1
Roufferolle,	22	6	— (Turckischer Holtz-)	17 1
— Gallis dicta ; quam			Schwalb,	30 1
Bellonius Alcyo-			— (Berg-)	30 2
nem vocalem vo-			— (Ger-)	30 15
cat,	22	6	— (Geyr-)	30 15
— Gallorum,	22	6	— (Kirch-)	30 2
Royston-Crow,	14	4	— (Mur-)	30 2
Rubecula faxatilis,	22	13	— (Spyr-)	30 15
Rubicilla major faxatilis,	22	37	Schwalbe,	30 1
Ryn-Schwalbe,	30	12	— (Chawer-)	30 15
— Schwalme,	30	12	— (Erd-)	30 12
			— (Fenster-)	30 2
			— (Geubel-)	30 1
			— (Geyer-)	30 15
			— (Grofte-)	30 15
			— (Hauf-)	30 1
			—	30 2
			— (Kirchen-)	30 15
			— (Leim-)	30 2

S.

G.

S.

S Aligna dicta, (Avis)	18	9
Sand-Martin,	30	12
— Schwalbe,	30	12
Sang-Druschel,	22	2
Sanfonnet,	26	1

	G.	S.		G.	S.
Schwalbe, (Maver-)	30	15	Siffleur,	19	21
— (Nacht-)	29	1	Silk-Tail,	22	63
— (Rauch-)	30	1	Sing-Droftel,	22	2
— (Rein-)	30	12	Singing-Bird,	22	29
— (Ryn-)	30	12	Siferre,	22	1
— (Sand-)	30	12	Sitta Eberi,	16	1
— (Spyr-)	30	15	— Peuceri,	16	1
— (Uber-)	30	12	Σιττα,	15	1
— (Ufer-)	30	12	Skara,	15	1
— (Waffer-)	30	12	Skiaerra, (Natt-)	29	1
Schwalben, (Dach-)	30	2	Skorzek,	26	1
— (Kirch-)	30	2	Σκωραπελα,	13	1
— (Lauben-)	30	2	Skraefwa, (Natt-)	29	1
— (Leim-)	30	2	Skrika, (Korn-)	16	1
Schwalm,	30	1	— (Noet-)	16	1
— (Feel-)	30	12	Σκυνοπαλλος	22	1
— (Haufs-)	30	1	Small black and orange-		
— (Hufs-)	30	1	coloured Bird,	24	14
Schwalme, (Ryn-)	30	12	— Black-Bird,	19	15
— (Waffer-)	30	12	— blew Jay,	19	28
Schwantz, (Seide-)	22	63	— Wood-Owl,	29	4
— (Seyden-)	22	63	— Yellow and brown		
— Schwartz-Amsel,	22	10	Bird,	19	8
— Kraee,	14	2	Smatch,	22	37
— rückige Graf-mucke,	24	13	Solitaire,	22	30
Schwartze-Amsel,	22	10	— de Manille,	22	31
— Dohle,	14	7	— des Philippines,	22	32
— Kraehe,	14	3	Solitaria, (Passera)	30	15
— Kraye,	14	3	Solitary Sparrow,	22	30
Schwartzer-Amsel,	22	10	Soliviar,	22	30
Screech-Owl,	29	4	Song-Thrush,	22	2
Sea-Crow,	14	4	— Thrush, (Ameri-		
Seide-Schwantz,	22	63	can)	22	29
Serino affinis Avicula,			Sorte d'Alouette d'Amé-		
&c.	24	14	rique, (Schombur-		
— affinis, &c.	24	14	ger)	19	29
— affinis, &c. (Passer)	24	14	Soyka,	16	1
Seyden-Schwantz,	22	63	Spanish-Nightingale,	19	22
Shore-Bird,	30	12	Spansk Kraoka,	18	1
Shreitch,	22	1	Sparrow, (Greater		
Shrite,	22	1	Reed-)	22	6
Siden-Swantz,	22	63	— (Solitary)	22	30
Σιήτη,	27	1	Spatzek,	26	1

ALPHABETICUS.

G. V. S.

lix

				G.	S.
Species Corvi , Ytz-			Stare ,	26	1
quauhtli dicta , ex			— (Indian)	22	49
Nova Hispania ,			Starling ,	26	1
(Aquila minor)	18	7	— from Bengall , (Yel-		
— Pici ,	23	3	low)	22	61
Spelvier ,	13	1	— (Red Wing'd)	19	12
—	14	8	Starll ,	26	1
Σπερματολόγος ,	14	3	Starn ,	26	1
— (Κορώνη)	14	3	Start , (Greater Red)	22	13
Σπερμολόγος ,	14	3	— (Red-)	24	14
Σπερμολόγος , (Κορώνη)	14	3	Steen-Swalem ,	30	15
Spermologus ,	14	7	Stein-Amsel ,	22	11
— Frugivorus ,	14	3	—	22	12
— Frugivorus , (Cor-			— Amsel , (Blaw)	22	37
vus)	14	3	— Droffel ,	22	37
Spinitorquus ,	21	1	— Hetz ,	14	8
— minor ,	21	4	— Kraee ,	13	1
Spraeuwe ,	26	1	— Rabe ,	13	2
Spreche ,	26	1	— Rapp ,	13	2
Sprehe ,	26	1	— Reitling ,	22	13
Spreuwe ,	26	1	— Roetele ,	22	13
Sprue ,	26	1	—	22	37
Spyr ,	30	15	— Rotele ,	22	37
— (Münfter-)	30	2	— Tahen ,	13	1
— (Mur-)	30	2	— Troestel ,	22	13
—	30	15	— Tulen ,	13	1
— -Schwalb ,	30	15	Sten-Nectergal ,	22	30
— -Schwalbe ,	30	15	Stoer ,	26	1
— (Wyffer-)	30	2	Stone-Check ,	22	37
Sroka ,	15	1	Stoparola Aldrovandi ,	24	1
— biala ,	15	A. 1	Stoparolæ similis Aldro-		
Srokos ,	21	2	vandi ,	24	1
— mniefly pstry ,	21	4	Stornell ,	26	1
— naywiekfzy popielaf-			Stornello ,	26	1
ty ,	21	2	Stornino ,	26	1
— wiekfzy ,	21	1	Storno ,	26	1
Sfpacziek ,	26	1	— marino ,	22	20
Staar ,	26	1	Stragazzina ,	21	1
— (Elfter)	26	B. 1	Strakavel ,	15	1
— (Gantz Weiffer)	26	A. 1	Strand-Swala ,	30	12
— (Rinder-)	26	1	Strix capite levi , &c.	29	4
Staer ,	26	1	— rufescens , &c.	29	5
Stahr ,	26	1	— sylvatica, major, pulla,	29	4

h ij

	G. V. S.			G. S.	
Strix varia minor,	29	2	Sturnus vulgaris,	26	I
Sturnello,	26	I	— vulgaris, &c.	26	I
Sturnellus Nonnullis,	26	I	Stücker, (Goat-)	29	I
Sturnino,	26	I	—	29	5
Sturnus,	26		— of Carolina, (Goat-)	29	2
—	26	I	Sucking-Owl, (Goat-)	29	I
— albus,	26	A. I	Suger, (Wilch-)	29	I
— Aldrovandi,	26	I	Summer Red-Bird,	24	37
— aliorum,	26	I	Swala, (Back-)	30	12
— alter,	26	C. I	— (Huf-)	30	2
— candidus,	26	A. I	— (Ladu-)	30	I
— capite albo,	26	C. I	— (Ring-)	30	15
— capite albo Jonstoni,	26	C. I	— (Strand-)	30	12
— capite atro, &c.	26	B. I	Swale,	30	I
— Capitis Bonæ Spei,	26	2	Swalem,	30	I
— caudâ divisâ,	19	16	— (Steen-)	30	15
— cinereus,	26	D. I	Swallow,	30	I
— cinereus Jonstoni,	26	D. I	—	30	10
— crinibus cinereis, &c.	22	21	— (Chimney-)	30	I
— Indicus,	22	49	— (Common)	30	I
— Indicus Bontii,	22	49	— (Common House-)	30	I
— Junceti,	26	3	— (Great-)	30	15
— leucocephalus,	26	C. I	— (House-)	30	I
— leucomelas,	26	B. I	—	30	2
— Ludovicianus,	26	4	— (Martin-)	30	15
— (Magnus)	15	4	— (Rough-footed)	30	2
— marinus,	22	20	Swalwe,	30	I
— Mexicanus humeris			Swantz, (Siden-)	22	63
rubeis Hernande-			Swift,	30	15
zii,	19	12	Swine-Pipe,	22	3
— niger, &c.	19	12	Συκφάρος,	22	58
— Novæ Hispaniæ,	26	3	Sylvarum Dominus,	21	I
— pratorum,	26	I	Sylvia gulâ coeruleâ, &c.	22	37
— Pterophœnicus India-			— internè ex albo cine-		
rum,	19	12	rea, &c.	22	27
— pullus,	26	I	— pestilentialis,	24	I
— pullus Jonstoni,	26	I	Szpak,	26	I
— rostro flavescente,					
&c.	26	I			
— Schwenckfeldii,	26	I			
— tertius,	26	D. I			
— totus albus,	26	A. I			
—, ut Pica, varius,	26	B. I			

T.

T Accola,

—

Tage-Schlaeffer,

ALPHABETICUS.

	G. V. S.			G.	lxj S.
Taha ,	13	1	Tete-chèvre ,	29	1
—	14	8	Tette-chèvre ,	29	
Tahe ,	14	6	—	29	1
Tahen ,	14	8	— chèvre de la Caroline,	29	2
— (Stein-)	13	1	— chèvre de la Jamaï-		
Tail , (Silk-)	22	63	que ,	29	4
Tale , (Weisse)	14	B. 6	— chèvre de Virginie ,	29	3
Talhe ,	14	6	— chèvre du Brésil ,	29	5
Tamatia ,	22	4	— chèvre , (Petit)	29	3
— Brasiliensibus ,	22	4	— chèvre tacheté du Bré-		
— Brasiliensibus Marc-			fil ,	29	6
gravii ,	22	4	— chèvre tacheté du Bré-		
Tanaombé ,	22	33	fil , (Grand)	29	7
Tangeima Brasiliensibus ,			Teutscher Pappagey ,	18	1
(Guira-)	19	1	Thale ,	14	6
— Brasiliensium Marc-			Thorn-Kretzer ,	21	1
gravii , (Guira-)	19	1	— traer ,	21	1
— Brasiliensium Marc-			Throstle ,	22	2
gravio , (Guira-)	19	1	Thrush ,	22	2
— (Guira-)	19	1	—	22	34
Tannen-Heher ,	17	1	— (American Song-)	22	29
Tapera ,	30	10	— (Fox Coloured)	22	8
— Brasiliensibus ,	30	10	— (Little)	22	4
— Brasiliensibus Marc-			— (Mistletoe-)	22	1
gravii ,	30	10	— (Red Leg'd)	22	40
— dicta , (Hirundo Ame-			— (Song-)	22	2
ricana , Brasilien-			— (Wind-)	22	3
fibus)	30	10	Tilli ,	22	40
— dicta , Raji , (Hirun-			Tire-arrache ,	22	6
do Americana)	30	10	Toder , (Grossere Neun-)	21	2
Targanas de la Testo			— (Kleine Americanif-		
roujho ,	21	3	che Neun-)	24	18
Tatula ,	13	1	— (Mitlere Neun-)	21	1
—	14	6	Toeder , (Nun-)	21	1
Tcha-Chert ,	21	25	Tole ,	14	6
— Chert-Bé ,	21	24	Tolocatzanatl ,	26	3
— Chert-Dae ,	21	16	Tom-Kelly , (Whip-)	24	27
—	21	26	Tordela ,	22	1
Tectec ,	24	2	Tordo ,	22	
Tella Yeaco narry ,	19	7	—	22	1
Terat-boulan ,	22	19	—	22	2
Tertia Manucodiatae			—	22	5
species ,	20	1	— marino ,	22	13

	G. V. S.			G. V. S.	
Tordo Mezzano ,	22	2	Troupiale fauve de Ma-		
— Saffello ,	22	3	— draft ,	19	6
Tordos ,	19	2	— gris de la Nouvelle Ef-		
—	22	20	— pagne ,	19	11
Tort ,	22	1	— hupé de Madraft ,	19	7
— ala roitg ,	22	3	— noir ,	19	15
Tourdelle ,	22	5	— tacheté de Madraft ,	19	5
— grièche ,	22	B. 5	Tschauka ,	14	6
— Pie ,	22	B. 5	Trufel ,	22	2
Touret ,	22	3	Tul ,	14	6
Traeer , (Thorn-)	21	1	— (Berg)	14	8
Traeher , (Dorn-)	21	4	— (Wilde-)	14	8
Trasle ,	22	3	Tule ,	14	6
Traft ,	22	10	Tulen , (Stein-)	13	1
— (Kohl-)	22	10	Tuordo ,	22	2
Trichas ,	22	5	Turckischer Holtz-		
Τριχάς ,	22	5	— Schreyer ,	17	1
Τρίχας , (Κίχλα)	22	5	Turdela ,	22	1
Troestel , (Stein-)	22	13	—	22	5
Trosche-Papegoje ,	18	1	— Ifidori ,	22	1
Troffel ,	22	2	— Ifidoro ,	22	5
Trostel ,	22	2	— montana ,	22	3
— (Berg-)	22	3	— quibusdam Recentio-		
— (Rot-)	22	3	— ribus ,	22	1
— vocitant , (Turdus mi-			— faxatilis Aldrovandi ,	17	1
— nor alter , quem			— fylvestris ,	22	3
— Nostri)	22	2	Turdo ,	22	2
— (Wyn-)	22	3	Turdus ,	22	
— (Wyfz-)	22	2	—	22	5
Troupiale ,	19		—	22	10
—	19	1	—	22	58
— à aîles rouges ,	19	12	— albo capite ,	22	A. 2
— à queue annelée ,	19	3	— albus ,	22	A. 1
— à queue fourchue ,	19	16	— alis subtus ferrugineis ,		
— brun de la Nouvelle			— &c. ,	22	3
— Espagne ,	19	17	— Americanus minor ,		
— de Bengale ,	19	9	— &c. ,	22	29
— de la Guiane ,	19	18	— arundinaceus ,	22	6
— de la Nouvelle Espa-			— ater , &c. ,	22	10
— gne ,	19	10	— aureus ,	22	58
— de Madraft ,	19	4	— baccivorus aliis ,	22	1
— du Brésil ,	19	8	— Bengalensis ,	22	25
— du Mexique ,	19	2	— Bohemicus ,	22	63

ALPHABETICUS.

lxij

	G. V. S.			G. V. S.	
Turdus Canadensis,	22	9	Turdus minor alter Gef-		
— candidus,	22	A. 1	neri,	22	2
— Carolinensis,	22	8	— minor alter, quem		
— cinereus, &c.	22	1	Itali Turdum fim-		
—	22	3	pliciter vocitant,	22	2
—	22	5	— minor alter, quem		
— colore cinereo, &c.	22	2	Nostri Trostel vo-		
— coronâ rubrâ,	24	18	citant,	22	2
— cristatus,	22	63	— minor cinereo-albus,		
—	24	28	&c.	22	29
—	24	30	— minor cœruleo-albus,		
— cristatus, &c.	22	63	&c.	22	29
— dorso fusco, &c.	22	27	— minor cristatus,	22	B. 2
— ex nigro, &c.	22	62	— minor Gesnero,	22	3
— flavus, &c.	22	58	— minor gutture nigro,	19	20
— fuscus,	22	34	— minor leucocephalus,	22	A. 2
— Garrulus Carolinien-			— minor, quem Illadem		
fis,	22	64	cognominant,	22	3
— Hermolao, (Iliacus)	22	3	— minor, quem Tyladem		
— Icterus ex auro, &c.	19	19	cognominant,	22	3
— Iliacus,	22	3	— minor Schwenckfel-		
— Iliacus Carolinensis,	22	4	dii,	22	3
— Illas,	22	3	— minor varius,	19	22
— Illas Aldrovandi,	22	3	— musicus,	22	2
— leucocephalos,	22	A. 2	— musicus Arundinum,	22	6
— luteo-niger, &c.	19	1	— musicus Carolinensis,	22	9
— luteus,	22	58	— musicus cristatus,	22	B. 2
— major,	22	1	— musicus Dumetorum,	22	6
— major Gesnero,	22	1	— musicus palustris,	22	6
— maximus,	22	1	— musicus Schwenck-		
— mediæ magnitudinis,	22	5	feldii,	22	2
— mediæ magnitudinis			— niger,	22	10
Gesnero,	22	5	—	22	B. 10
— medius,	22	5	— niger Mexicanus,	19	16
— medius pedibus ni-			— nigricans, &c.	22	11
gris,	22	5	—	22	12
— medius Schwenckfel-			— oculis cœruleis,	19	1
dii,	22	5	— Passer solitarius dic-		
— minimus,	22	3	tus,	22	30
—	22	4	— pectore cinnabarino,	19	18
— minimus nostras,	22	2	— pectore luteo,	22	55
— minor,	22	2	— Pilaris,	22	5
—	22	3	— Pilaris Aldrovandi,	22	5

	G.	V.	S.		G.	S.
Turdus Pilaris Gazæ ,	22	5		Tylas , (Turdus)	22	3
— Pilaris Gesneri ,	22	5		Τυλάς ,	22	3
— Pilaris leucocephalus ,	22	A. 5		Tyran ,	24	18
— Pilaris maculis , &c.	22	B. 5		— à queue fourchue ,	24	20
— Pilaris nævius ,	22	B. 5		— de Cayenne ,	24	21
— quem Pilarem Gaza				— de Cayenne , (Petit)	24	22
nominat ,	22	5		— de S. Domingue ,	24	19
— rectricibus nigris , &c.	22	5		— du Brésil ,	24	23
— rectricibus rufis , &c.	22	13		Tyrannus ,	24	18
— roseus , &c.	22	20		— Brasiliensis ,	24	23
— ruber , cyaneo capite ,	22	14		— caudâ bifurcâ ,	24	20
— rufus ,	22	8		— Cayanensis ,	24	21
— saxatilis ,	22	13		— Cayanensis minor ,	24	22
— simpliciter ,	22	5		— Dominicanensis ,	24	19
— simpliciter dictus ,	22	2		Tyrant ,	24	18
—	22	5		Tyrolt ,	22	58
— simpliciter dictus , Al-				Tzanahoei ,	15	5
drovandi ,	22	2		Tzaupan ,	22	28
— Sinensis ,	22	7		Tzonpan ,	22	28
— solitarius ,	22	30			V.	
— subcastaneus monta-					G.	S.
nus ,	22	11		V Anga ,	21	23
— torquatus ,	22	12		— Pandooe ,	19	6
— totus ruber ,	23	7		— Pandooe , (Cundoe)	19	5
— Tylas ,	22	3		— Pandooe Pedda ,	19	4
— Tylas Aldrovandi ,	22	3		Variegated Butcher-Bird ,		
— viscivorus ,	22	1		(Lesser)	21	5
—	22	3		Uber-Schwalbe ,	30	12
— viscivorus Gesnero ,	22	1		Uccello del mondo no-		
— viscivorus major ,	22	1		vo ,	22	63
— viscivorus major Al-				Vencéio ,	30	15
drovandi ,	22	1		Verla ,	21	1
— viscivorus major Jon-				— (Gaza)	16	1
stoni ,	22	1		Verle ,	21	5
— viscivorus maximus ,	22	1		Ufer-Schwalbe ,	30	12
— viscivorus minor ,	22	2		Vireo aliis ,	22	58
— viscivorus plumbeus ,	22	40		— Bellonii ,	22	58
Turnero Hirundo tem-				Viscada ,	22	5
plorum ,	30	15		Viscardo ,	22	5
Tylas Aldrovandi , (Tur-				Ulula Americana , &c.	29	4
dus)	22	3		Voegele , (Rhyn-)	30	12
— Gazæ ,	22	3		Vogel , (Blau-)	22	37
— (Nonnullis)	22	3		— (Blaw-)	22	37
				Vogel ,		

ALPHABETICUS.

1xv

	G.	S.		G. V. S.
Vogel, (Herren-)	16	1	Walluhora,	19 7
— (Krambs-)	22	1	Waluhora,	19 7
— (Kramefz-)	22	5	Wan-Krengel,	21 1
— (Kramet-)	22		War-Fogel,	21 1
—	22	5	— Kengel,	21 1
— (Krammets-)	22	5	—	21 2
— (Kranwit-)	22	5	— Krengel,	21 1
— (Lufft-)	20	1	— Krengel, (Kleiner	
— (Nacht-)	29	1	bundter)	21 4
— (Paradyfs-)	20	1	Wardioe,	15 6
— (Reckolter-)	22	5	Waffer-Schwalbe,	30 12
— (Schnee-)	22	63	— Schwalme,	30 12
— (Wachholter-)	22	5	Watchy Picket,	19 22
— (Weckholter-)	22		Waygehoe,	15 6
— (Weingraf-)	22	3	Wecholder-Ziemer,	22 5
Voghel, (Lijfter)	22		Wecka, (Noet-)	17 1
Vouloulou, (Schet)	24	35	Weckholter-Vogel,	22
Upega,	27	1	Wede-Hoppe,	27 1
Uperga,	27	1	Wedewael,	22 58
Upupa,	27		Weidwal,	22 58
—	27	1	Wein-Droffel,	22 3
— Aldrovandi,	27	1	— Droffel,	22 3
— Gefneri,	27	1	— Drufchel,	22 3
— Manucodiata,	28	3	Weingraf-Vogel,	22 3
— montana,	13	2	Weifgeschheckte-Amsel,	22 B. 10
— Plinii,	27	1	Weifs-Droffel,	22 2
— simpliciter,	27	1	Weiffe-Amsel,	22 C. 10
— varia, &c.	27	1	— Droffel,	22 1
Ureba,	14	1	— Droffel,	22 A. 1
Wachholter-Vogel,	22	5	— Elfter,	15 A. 1
Wacholder-Droffel,	22	5	— Krahe,	14 B. 2
Wachtel,	14	6	— Tale,	14 B. 6
Wahn-Krengel, (Klein)	21	4	Weiffer-Rabe,	14 B. 1
Wald-Amsel,	22	12	— Staar, (Gantz)	26 A. 1
— Haer,	21	1	Wer-Kengel,	21 1
— Herr,	21	1	—	21 2
— Hoher,	21	1	Wereangel,	21 1
— Rabe,	13	2	Western,	30 12
— Rapp,	13	2	Whip-poor-will,	29 3
— Rappe,	13	2	— Tom-Kelly,	24 27
Waldt-Herr,	21	1	White-headed Oufle,	22 A. 10
— Hoher,	21	1	Wid-Hopff,	27 1
Walk, (Cacao-)	14	5	Widdewal,	22 58

	G.	S.		G.	S.
Wide-Hopf,	27	1	Wyfz-Trostel,	22	2
— Hopff,	27	1	Wywielgá,	22	58
— Hopffe,	27	1		X.	
— Huppe,	27	1		G.	S.
Widewal,	22	58	X Anthornus,	19	22
Widwal,	22	58	— Brasiliensis,	19	24
Widwol,	22	58	— Capitis Bonæ Spei,	19	30
Wied-Hopf,	27	1	— Cayanensis,	19	26
Wiede-Hopffe,	27	1	— cœruleus,	19	28
Wierangel,	21	1	— Dominicanensis,	19	25
Wilch-Suger,	29	1	— icterocephalus Caya-		
Wilde Goltz-Kraje,	18	1	nensis,	19	27
— Holtz-Krae,	18	1	— major, nigro varius,	19	1
— -Tul,	14	8	— Mexicanus,	19	23
Wilgá,	22	58	— minor, nigro varius,	19	22
Will, (Whip-poor-)	29	3	— nævius,	19	29
Wind-Thrush,	22	3	Xochitototl,	19	10
Wing; (Red-)	22	3	—	19	22
Winfel,	22	3	— altera,	19	22
Winfela Gefneri,	22	3	Xomotl,	22	63
Winter-Kraey,	14	4	Xuclacabres,	29	1
— Krahe,	14	4		Y.	
Wintze,	22	3		G.	S.
Wintzel,	22	3	Y Apou,	19	1
Winzel,	22	3	Yeaco narry, (Tella)	19	7
Wipstertz,	22	63	Yellow and black Pie,	19	1
Wittewal,	22	58	— brested Chat,	22	55
Wittewalch,	22	58	— -Jay,	19	4
Wittewale,	22	58	— Starling from Ben-		
Witwol,	22	58	gall,	22	61
Wlastowige,	30	1	— -tailed Fly-Catcher,	24	14
Wood-chat,	21	3	— Woodpecker,	19	1
— Crow from Switzer-			Ytzquauhtli dicta, ex No-		
land,	13	2	va Hispania, (A-		
— Owl,	29	5	quila minor, spe-		
— Owl, (Small)	29	4	cies Corvi)	18	7
Woodpecker, (Yellow)	19	1	Yxtlaoltzanatl,	15	3
Wrana,	14	2		Z.	
Wrobel ofobny,	22	30		G.	S.
Wrona,	14	4			
Wurg-Engel,	21	1	Z Alla di terra nova,	19	14
Wyn-Trostel,	22	3	Zegzolka,	14	6
Wyffer-Spyr,	30	2	Zerrer,	22	1

ALPHABETICUS.

					lxvij
	G.	S.		G.	S.
ζιχα ,	22		Ziering ,	22	1
Ziemer ,	22		Zimmer , (Klein Blaw-)	22	37
—	22	5	Zinzerelle ,	22	63
— (Beemer-)	22	3	Zinzirella ,	22	63
— (Blaw-)	22	5	Zifila ,	30	1
— (Gros-)	22	5	Zorl ,	13	1
— (Heide-)	22	3	—	14	8
— (Klein)	22	3	Zorzol ,	22	
— (Miftel-)	22	1	—	22	5
— (Wecholter)	22	5	Zwiczol ,	22	5
Zier-Droffel ,	22	2			



AVIS AU RELIEUR.

Les Planches doivent être placées de manière qu'en s'ouvrant elles puissent sortir du livre, & se voir à droite dans l'ordre qui suit.

Page	34. Planches I & II.
	46. III.
	58. IV.
	84. V, VI & VII.
	128. VIII, IX, X, XI & XII.
	138. XIII.
	200. XIV, XV, XVI, XVII, XVIII & XIX.
	338. XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII & XXXIII.
	360. XXXIV & XXXV.
	434. XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX & XL.
	452. XLI & XLII.
	468. XLIII.
	484. XLIV.
	516. XLV & XLVI.

ERRATA.

Pagina	21	linea	20.	donantu rcinereis <i>lege</i> donantur cinereis
	31		3.	distant, alæ <i>lege</i> distant; alæ
	90		1.	son jaunes <i>lisez</i> sont jaunes
	133		35.	futuratissimo <i>lege</i> saturatissimo
	170		5.	rayées <i>lisez</i> rayés
	202		9.	MISSETOE <i>lisez</i> MISLETOE
	219		34.	minor. <i>Bellonii. lege</i> minor <i>Bellonii.</i>
	225		9.	dinalibus, fuscis <i>lege</i> dinalibus fuscis
	243		26.	<i>Perdris. lisez Perdrix.</i>
	273.		1.	plées, <i>lisez</i> pliées,
	314		33.	<i>Andanfon. lege</i> <i>Adanfon.</i>
	338		11.	Avis aut illas <i>lege</i> Avis, aut illas
	347		23.	CONTINGA <i>lege</i> COTINGA
	354		24.	Superat <i>lege</i> superat
	363		31.	<i>l'Abbe lisez l'Abbé</i>
	451		2.	côte <i>lisez</i> côté
	490		10.	Uropygio <i>lege</i> uropygio
	xxj		7.	Acamuku, <i>lege</i> Acamaku,
	xxj		18.	<i>dele</i> (Caprimulgus)
	xxvj		25.	<i>dele</i> — Aegothelas, 29 I
	xxxj		29.	<i>dele</i> — 26 C. I

